



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 181

Rozeslána dne 29. prosince 2005

Cena Kč 141,-

O B S A H:

532. Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

532**VYHLÁŠKA**

ze dne 16. prosince 2005,

o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Tato vyhláška stanoví:

- a) léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“), uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek naležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- d) výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,
- e) omezení a symboly stanovující podmínky přede-

pisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Zrušuje se:

- 1. Vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.
- 2. Vyhláška č. 225/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.
- 3. Vyhláška č. 337/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb.

Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely

| Číslo řádku vyhlášky | Označení ATC a V06XX | Název léčivé látky | Cesta podání | Množství | Název jedn. | Úhrada v Kč | Omezení |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Stomatologika |
|---|----------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 1.1 | A01AA01 | fluorid sodný | p.o. | 1.10 | MG | 0.88 | |
|-----|---------|---------------|------|------|----|------|--|

46265 ZYMAFLUOR 1/4 MG portblnob200x0.25mg FAJ I

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 1.2 | A01AB10 | natamycin | lok. | 20.00 | MG | 7.48 | |
|-----|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|------|----------|----|--------|---|
| 1.3 | A01AB03 | chlorhexidin | lok. | 1 000.00 | ML | 178.70 | H |
|-----|---------|--------------|------|----------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|------|------|----|-------|----------------|
| 1.4 | A01AC01 | triamcinolon | lok. | 1.00 | GM | 13.69 | L/DER,STO, ORL |
|-----|---------|--------------|------|------|----|-------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------|------|----|-------|----------------|
| 1.5 | A01AC02 | dexametason | lok. | 1.00 | GM | 11.68 | L/DER,STO, ORL |
|-----|---------|-------------|------|------|----|-------|----------------|

| | |
|---|--|
| 2 | adsobční anatacidia a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání |
|---|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------|----|------|--|
| 2.1 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3.10 | |
|-----|-------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|-------|----|------|--|
| 2.2 | A02AD | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3.10 | |
|-----|-------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 2.3 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3.10 | |
|-----|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 2.4 | A02AD01 | kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3.10 | |
|-----|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 2.5 | A02AD04 | hydrotalcit (pevné lékové formy) | p.o. | 10.00 | DF | 3.10 | |
|-----|---------|----------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 2.6 | A02AD04 | hydrotalcit (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | ML | 3.10 | |
|-----|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 2.7 | A02BA01 | cimetidin | p.o. | 0.80 | GM | 3.10 | |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 2.8 | A02BA02 | ranitidin nad 75 mg v 1tbl | p.o. | 0.30 | GM | 3.10 | |
|-----|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

12346 HISTAC 150 tbl obd 20x150mg RXY IND

14664 HISTAC 150 por tbl flm20x150mg IRI IRL

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 2.9 | A02BA03 | famotidin 20 mg a výše v 1 tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 3.10 | |
|-----|---------|------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 2.10 | A02BA04 | nizatidin | p.o. | 0.30 | GM | 3.10 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 2.11 | A02BA06 | roxatidin | p.o. | 0.15 | GM | 3.10 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|-------|--|
| 2.12 | A02BA07 | ranitidin bismut citrát | p.o. | 0.80 | GM | 28.50 | |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 3.1 | A02BA01 | cimetidin | parent. | 0.80 | GM | 32.06 | H |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 3.2 | A02BA02 | ranitidin | parent. | 0.30 | GM | 68.43 | H |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|
| 3.3 | A02BA03 | famotidin | parent. | 40.00 | MG | 68.43 | H |
|-----|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 3.4 | A02BB01 | misoprostol | p.o. | 0.80 | MG | 47.36 | Z |
|-----|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|
| 3.5 | A02BC01 | omeprazol | parent. | 20.00 | MG | 170.00 | H |
|-----|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 3.6 | A02BC01 | omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 13.95 | |
|-----|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 3.7 | A02BC01 | omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce) | p.o. | 20.00 | MG | 8.35 | |
|-----|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|--|

60160 ULTOP cps 14x20mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------|-------|----|------|--|
| 3.8 | A02BC02 | pantoprazol | p.o. | 40.00 | MG | 8.35 | |
|-----|---------|-------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|
| 3.9 | A02BC02 | pantoprazol | parent. | 40.00 | MG | 170.00 | H |
|-----|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|-------|----|------|--|
| 3.10 | A02BC03 | lansoprazol | p.o. | 30.00 | MG | 8.35 | |
|------|---------|-------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|
| 3.11 | A02BC05 | esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 30.00 | MG | 18.00 | L/GIT,INT,GER |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|
| 3.12 | A02BC05 | esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce) | p.o. | 30.00 | MG | 10.00 | L/GIT,INT,GER |
|------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|-------|--|
| 3.13 | A02BX | ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat) | p.o. | 3.00 | DF | 22.29 | |
|------|-------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 3.14 | A02BX02 | sukralfát | p.o. | 4.00 | GM | 8.35 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 3.15 | A02BX03 | pirenzepin | p.o. | 0.10 | GM | 8.55 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|
| 3.16 | A02BX03 | pirenzepin | parent. | 20.00 | MG | 105.58 | H |
|------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------|------|------|----|-------|--|
| 3.17 | A02BX05 | zásaditý citronan bismutity | p.o. | 0.48 | GM | 23.07 | |
|------|---------|-----------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | spasmolytika, perorální podání | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 4.1 | A03AA04 | mebeverin | p.o. | 0.30 | GM | 4.94 | |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 4.2 | A03AA05 | trimebutin | p.o. | 0.30 | GM | 4.94 | |
|-----|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------|------|-------|----|------|--|
| 4.3 | A03AB03 | oxyfenon | p.o. | 25.00 | MG | 2.30 | |
|-----|---------|----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------------|------|------|----|-------|--|
| 4.4 | A03AB06 | otilonium bromid | p.o. | 0.12 | GM | 12.42 | |
|-----|---------|------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|------|-------|----|------|--|
| 4.5 | A03AB11 | poldin | p.o. | 12.00 | MG | 2.30 | |
|-----|---------|--------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 4.6 | A03AD01 | papaverin | p.o. | 0.10 | GM | 0.68 | |
|-----|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 4.7 | A03AD02 | drotaverin | p.o. | 0.10 | GM | 4.88 | |
|-----|---------|------------|------|------|----|------|--|

17933 NO-SPA FORTE

tbl 10x80mg

CPW H

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|------|------|----|------|--|
| 4.8 | A03BA01 | atropin | p.o. | 1.50 | MG | 0.49 | |
|-----|---------|---------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|------|-------|----|-------|--|
| 4.9 | A03BB01 | butylskopolamin | p.o. | 60.00 | MG | 14.21 | |
|-----|---------|-----------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 5 | spasmolytika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|--|
| 5.1 | A03AD01 | papaverin | parent. | 0.10 | GM | 17.94 | |
|-----|---------|-----------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|---------|------|----|-------|--|
| 5.2 | A03AD02 | drotaverin | parent. | 0.10 | GM | 25.55 | |
|-----|---------|------------|---------|------|----|-------|--|

02552 NO-SPA

inj 5x2ml/40mg

CHN H

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|--|
| 5.3 | A03BA01 | atropin (1 mg a více v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 8.11 | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 5.4 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 15.15 | |
|-----|---------|-----------------------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|--|
| 5.5 | A03BB01 | butylskopolamin | p.rect. | 60.00 | MG | 14.66 | |
|-----|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|--|
| 5.6 | A03BB01 | butylskopolamin | parent. | 60.00 | MG | 37.62 | |
|-----|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 6 | anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 6.1 | A03DA | syntetická anticholinergika v komb. | p.o. | 2.00 | DF | 3.96 | |
|-----|-------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 6.2 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | p.rect. | 2.00 | DF | 13.60 | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|--|

91517 ALGIFEN SUP

rct sup 5

LEX CZ

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 6.3 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky | parent. | 2.00 | DF | 44.25 | |
|-----|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|------|----|------|--|
| 6.4 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | DF | 4.11 | |
|-----|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|------|------|----|------|--|
| 6.5 | A03DA02 | pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 5.82 | |
|-----|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|------|----|-------|--|
| 6.6 | A03EA | antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb. | p.rect. | 2.00 | DF | 12.72 | |
|-----|-------|---|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 7 | prokinetika, antiflatulencia, perorální podání | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|
| 7.1 | A03AE02 | tegaserod | p.o. | 12.00 | MG | 30.00 | |
|-----|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 7.2 | A03AX13 | silikony (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 10.91 | |
|-----|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 7.3 | A03AX13 | silikony (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 18.57 | |
|-----|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

93500 SAB SIMPLEX

sus 1x30ml

PDA D

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 7.4 | A03AX58 | alverin (kombinace se silikony) | p.o. | 0.18 | GM | 7.90 | |
|-----|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------|------|----|-------|-----------------|
| 7.5 | A03FA | itoprid | p.o. | 0.15 | GM | 26.60 | L/GIT, INT, PED |
|-----|-------|---------|------|------|----|-------|-----------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------|------|-------|----|------|--|
| 7.6 | A03FA01 | metoclopramid hydrochlorid | p.o. | 30.00 | MG | 3.96 | |
|-----|---------|----------------------------|------|-------|----|------|--|

56695 MCP HEXAL 10

tbl 50x10mg

SFS D

56696 MCP HEXAL 10

tbl 100x10mg

SFS D

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|-------|---------------------------|
| 7.7 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 22.50 | L/GIT, INT, PED, PSY, GER |
| 7.8 | A03FA02 | cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 30.00 | MG | 26.00 | L/GIT, INT, PED, PSY, GER |
| 7.9 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy dělené sáčky) | p.o. | 30.00 | MG | 26.00 | L/GIT, INT, PED, PSY, GER |
| 7.10 | A03FA02 | cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml | p.o. | 30.00 | MG | 57.18 | L/GIT, INT, PED, PSY, GER |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 7.11 | A03FA03 | domperidon | p.o. | 30.00 | MG | 3.96 | |
| 7.12 | A03FA05 | alizaprid | p.o. | 0.15 | GM | 3.96 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 8 | prokinetika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|--|
| 8.1 | A03FA01 | metoclopramid | p.rect. | 30.00 | MG | 41.50 | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|---|
| 8.2 | A03FA01 | metoclopramid | parent. | 30.00 | MG | 21.28 | O |
|-----|---------|---------------|---------|-------|----|-------|---|

93105 DEGAN inj 50x2ml/10mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 8.3 | A03FA02 | cisaprid | p.rect. | 30.00 | MG | 47.57 | |
| 8.4 | A03FA03 | domperidon | p.rect. | 0.12 | GM | 41.50 | |
| 8.5 | A03FA05 | alizaprid | parent. | 0.15 | GM | 16.47 | O |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 9 | antiemetika, perorální podání | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|--------|---|
| 9.1 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 16.00 | MG | 481.95 | P |
|-----|---------|---|------|-------|----|--------|---|

15829 EMESET- 4 por tbl flm 6x4mg SDD CZ

15830 EMESET- 4 por tbl flm 60x4mg SDD CZ

84744 EMESET- 4 tbl obd 6x4mg CIA IND

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|------|-------|----|--------|---|
| 9.2 | A04AA01 | ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 16.00 | MG | 357.20 | P |
|-----|---------|---|------|-------|----|--------|---|

15831 EMESET- 8 por tbl flm 6x8mg SDD CZ

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------------|------|-------|----|--------|---|
| 9.3 | A04AA01 | ondansetron (tekuté lékové formy) | p.o. | 16.00 | MG | 754.65 | P |
|-----|---------|-----------------------------------|------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------------|------|------|----|--------|---|
| 9.4 | A04AA02 | graniisetron | p.o. | 2.00 | MG | 357.20 | P |
|-----|---------|--------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------|------|----|--------|---|
| 9.5 | A04AA03 | tropisetron | p.o. | 5.00 | MG | 357.20 | P |
|-----|---------|-------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|------|--------|----|--------|---|
| 9.6 | A04AA04 | dolasetron | p.o. | 200.00 | MG | 357.20 | P |
|-----|---------|------------|------|--------|----|--------|---|

Ondansetron, graniisetron, tropisetron a dolasetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 9.7 | A04AD | různá antiemetika (meklozin) | p.o. | 50.00 | MG | 3.31 | |
|-----|-------|------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------|----|------|--|
| 9.8 | A04AD | různá antiemetika (theoklát embraminu) | p.o. | 50.00 | MG | 3.31 | |
|-----|-------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|------|----|------|--|
| 9.9 | A04AD | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.o. | 0.10 | GM | 3.31 | |
|-----|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10 | antiemetika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|---------|---|----|---------|---|
| 10.1 | A04AA | palonosetron | parent. | 1 | DF | 2900.00 | P |
|------|-------|--------------|---------|---|----|---------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 10.2 | A04AA01 | ondansetron (léková forma čípků) | p.rect. | 16.00 | MG | 584.00 | P |
|------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 10.3 | A04AA01 | ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli) včetně | parent. | 16.00 | MG | 806.13 | P |
|------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|

15827 EMESET inj sol 5x2ml/4mg SDD CZ
 84441 EMESET inj 5x2ml/4mg CIA IND

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 10.4 | A04AA01 | ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli) | parent. | 16.00 | MG | 650.16 | P |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|

15828 EMESET inj sol 5x4ml/8mg SDD CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 10.5 | A04AA02 | granišetron | parent. | 3.00 | MG | 426.80 | P |
|------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 10.6 | A04AA03 | tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 734.58 | P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 10.7 | A04AA03 | tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 5.00 | MG | 426.80 | P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|--------|----|--------|---|
| 10.8 | A04AA04 | dolasetron | parent. | 100.00 | MG | 426.80 | P |
|------|---------|------------|---------|--------|----|--------|---|

Ondansetron, granišetron, tropisetron, dolasetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, tj. navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 10.9 | A04AD01 | různá antiemetika (theoklát moxastinu) | p.rect. | 0.10 | GM | 9.38 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 11 | hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 11.1 | A05AA01 | kyselina chenodeoxycholová | p.o. | 1.00 | GM | 21.46 | L/GIT,INF |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 11.2 | A05AA02 | kyselina ursodeoxycholová | p.o. | 0.75 | GM | 23.74 | L/GIT,INF |
|------|---------|---------------------------|------|------|----|-------|-----------|

13808 URSOSAN por cpsdur100x250mg PMP CZ

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 11.3 | A05AX | jiná léčiva onemocnění žlučníku | p.o. | 3.00 | DF | 1.62 | |
|------|-------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 11.4 | A05AX02 | hymekromon | p.o. | 1.20 | GM | 5.96 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 11.5 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | p.o. | 4.00 | DF | 11.73 | |
|------|-------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 11.6 | A05BA | léčiva onemocnění jater (fosfolipidy) | parent. | 1.00 | DF | 42.72 | H |
|------|-------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 11.7 | A05BA | léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci) | p.o. | 0.21 | GM | 5.51 | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 11.8 | A05BA03 | silymarin | parent. | 0.35 | GM | 2 345.13 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 11.9 | A05BA03 | silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 5.51 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 11.10 | A05BA03 | silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.21 | GM | 4.40 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 12 | laxativa a další léčiva k očištění střeva | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|--------|--|
| 12.1 | A06AD10 | kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku) | p.o. | 4.00 | DF | 242.70 | |
|------|---------|--|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|----------------------------|
| 12.2 | A06AD11 | laktulóza | p.o. | 6.70 | GM | 4.50 | L/GIT,INT,GER,PED,CHI, ONK |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|----------------------------|

42547 LACTULOSE AL SIRUP por sir 1x500ml APA D
81456 DUPHALAC por sir 1x500ml-hdp SOO NL

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|-------|----|------|-------------------|
| 12.3 | A06AD12 | laktitol | p.o. | 10.00 | GM | 3.71 | L/GIT,INT,GER,CHI |
|------|---------|----------|------|-------|----|------|-------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|--------|--|
| 12.4 | A06AD15 | macrogol | p.o. | 4.00 | DF | 242.70 | |
|------|---------|----------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|--|
| 12.5 | A06AG10 | sorbitol v kombinaci s kont. laxativem | p.rect. | 2.00 | DF | 174.01 | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|--|

92489 YAL sol 10x67.5ml TRM D

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 13 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|--------|---|
| 13.1 | A07AA01 | neomycin | p.o. | 5.00 | GM | 609.91 | H |
|------|---------|----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 13.2 | A07AA02 | nystatin | p.o. | 1.50 | MU | 5.96 | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 13.3 | A07AA03 | natamycin | p.o. | 0.30 | GM | 41.01 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|-------|---|
| 13.4 | A07AA11 | rifaximin | p.o. | 0.80 | GM | 85.00 | P |
|------|---------|-----------|------|------|----|-------|---|

Rifaximin je indikován v těchto případech:

- 1) hepatální encefalopatie,
- 2) profylaxe v kolorektální chirurgii,
- 3) pseudomembranosní kolitida,
- 4) bakteriální infekce provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin,
- 5) prokázaná divertikulitida tračníku citlivá na rifaximin.

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|------|------------|
| 13.5 | A07BC05 | diosmectit (plv. susp.) | p.o. | 1.00 | DF | 3.86 | L/PED, INF |
|------|---------|-------------------------|------|------|----|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 13.6 | A07EA06 | budesonid | p.o. | 9.00 | MG | 103.80 | P |
|------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

Léčbu perorálním budesonidem předepisuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

64786 BUDENOFALK cps ent 50x3mg FAK D

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|------|--------|----|-------|---|
| 13.7 | A07EB01 | natrium kromoglykát | p.o. | 800.00 | MG | 73.58 | P |
|------|---------|---------------------|------|--------|----|-------|---|

Léčbu natrium kromoglykátem předepisuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protíláték a při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------------------|
| 13.8 | A07EC01 | sulfasalazin | p.o. | 2.00 | GM | 15.14 | L/GIT,INT,REV,GER |
|------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 13.9 | A07EC02 | mesalazin (léková forma - sáčky) | p.o. | 1.50 | GM | 44.12 | P |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|

Mesalazin per os – léková forma-sáčky: je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u dětí do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku; zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátn.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|---------------|
| 13.10 | A07EC02 | mesalazin (potahované tablety) | p.o. | 1.50 | GM | 23.08 | L/GIT,INT,GER |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|---------------|

15533 ASACOL 400 por tblfilm 100x400mg MBO CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 13.11 | A07EC02 | mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním) | p.o. | 1.50 | GM | 41.90 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním: je aminosalicylátém první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávícího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátém první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|---|
| 13.12 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek | p.o. | 2.00 | DF | 25.14 | P |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|---|

Přípravek je hrazen v udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů.

66065 MUTAFLOR 20MG cps ent 20x20mg ARP D

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|------------|
| 13.13 | A07FA | protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy | p.o. | 1.00 | DF | 43.99 | L/PED, INF |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--------------------|
| 13.14 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy | p.o. | 4.00 | DF | 3.86 | L/PED,GIT,GER, INF |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--------------------|
| 13.15 | A07FA01 | organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy | p.o. | 2.00 | ML | 3.55 | L/PED,GIT,GER, INF |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--------------------|

09159 HYLAK FORTE sol 1x100ml MCK D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|---|
| 13.16 | A07FA02 | saccharomyces boulardii sicatus | p.o. | 1.00 | DF | 5.50 | P |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|---|

Přípravky s obsahem saccharomyces boulardii sic. jsou indikovány u infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živěných gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 14 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---------------|
| 14.1 | A07EA06 | budesonid | p.rect. | 2.00 | MG | 250.00 | L/GIT,INT,GER |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---------------|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 14.2 | A07EC | paraaminosalicylát sodný | p.rect. | 2.00 | GM | 46.20 | L/GIT |
|------|-------|--------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 14.3 | A07EC02 | mesalazin (čípky do 250 mg včetně) | p.rect. | 1.50 | GM | 111.30 | L/GIT |
|------|---------|------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 14.4 | A07EC02 | mesalazin (čípky nad 250 mg) | p.rect. | 1.50 | GM | 96.05 | L/GIT |
|------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 14.5 | A07EC02 | mesalazin (enm.) | p.rect. | 1.50 | GM | 68.28 | L/GIT |
|------|---------|------------------|---------|------|----|-------|-------|

15535 ASACOL ENEMA 4 G sus rec 1x100ml/4gm MBO CZ

15536 ASACOL ENEMA 4 G sus rec 7x100ml/4gm MBO CZ

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 15 | digestiva včetně enzymových přípravků | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|----------|---|------|--|
| 15.1 | A09AA | enzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|-------|--|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|----------|---|------|---|
| 15.2 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000 U včetně v jedné tabletě nebo kapslí) | p.o. | 5 000.00 | U | 1.47 | P |
|------|---------|---|------|----------|---|------|---|

Multienzymy s obsahem lipázy do 10 000 U v jedné tabletě jsou indikovány pro dětské pacienty do 10-ti kg jejich tělesné hmotnosti s diagnózou cystická fibróza.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|----------|---|------|--|
| 15.3 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|---------|---|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|----------|---|------|---|
| 15.4 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 1.41 | P |
|------|---------|---|------|----------|---|------|---|

Multienzymy ve formě enterosolventních tablet s obsahem lipázy 20 000U v jedné tabletě jsou indikovány u pacientů s prokázanou algickou formou chronické pankreatidy pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekčních pankreatu.

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-----|-----|
| 40378 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 30 | KRK | SLO |
| 40379 | PANZYNORM FORTE-N | por tbl flm 100 | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|---|
| 15.5 | A09AA02 | multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) – formy mikropelet | p.o. | 5 000.00 | U | 1.95 | P |
|------|---------|--|------|----------|---|------|---|

Multienzymy ve formě mikropelet jsou indikovány u pacientů s cystickou fibrózou a prokázanou chronickou pankreatitidou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekčních pankreatu..

| | | | | |
|-------|--------------|----------------|-----|---|
| 14811 | KREON 25 000 | por cps dur 50 | SVP | D |
|-------|--------------|----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|--|
| 15.6 | A09AA02 | multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě) | p.o. | 5 000.00 | U | 0.10 | |
|------|---------|--|------|----------|---|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|
| 15.7 | A09AC01 | pepsin a kyselinotvorné látky | p.o. | 2.00 | DF | 0.10 | |
|------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|

16 insuliny krátkodobě působící

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|
| 16.1 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|---|
| 16.2 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26.60 | P |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|---|

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí a prokazatelně nemůže v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 16.3 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | |
|-------|--------------|----------------|-----|----|
| 40876 | INSULIN-HM R | inj 1x10ml/1ku | ZEH | CZ |
|-------|--------------|----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 16.4 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující - cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 16.5 | A10AB03 | insulin vepřový rychle účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.48 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

17 insuliny střednědobě působící včetně kombinací

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|
| 17.1 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge | parent. | 40.00 | U | 21.60 | L/DIA |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|--|
| 17.2 | A10AC02 | insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv. | parent. | 40.00 | U | 11.99 | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 17.3 | A10AC03 | insulin vepřový středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12.64 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 17.4 | A10AC30 | insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující | parent. | 40.00 | U | 12.64 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 17.5 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 17.6 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26.60 | P |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí a prokazatelně nemůže v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 17.7 | A10AD01 | insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

40878 INSULIN-HM MIX 30 inj 1x10ml/1ku ZEH CZ

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 18 | insuliny dlouhodobě působící | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 18.1 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 18.2 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoru | parent. | 40.00 | U | 26.60 | P |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem – pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí a prokazatelně nemůže v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 18.3 | A10AC01 | insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv. | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

40875 INSULIN-HM NPH inj 1x10ml/1ku ZEH CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|---------|-------|---|-------|--|
| 18.4 | A10AE01 | insulin lidský dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 16.67 | |
|------|---------|--------------------------------------|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 18.5 | A10AE02 | insulin hovězí dlouhodobě účinkující -lahv. | parent. | 40.00 | U | 11.99 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|
| 18.6 | A10AE30 | insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující | parent. | 40.00 | U | 12.64 | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | analogu insulinu a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 19.1 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 28.96 | P |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|---|-------|--|
| 19.2 | A10AB04 | insulin-lispro krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 28.28 | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 19.3 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 28.96 | P |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|---|-------|--|
| 19.4 | A10AB05 | insulin-aspart krátce působící, lahv. | parent. | 40.00 | U | 28.28 | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-------|---|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|---------|-------|---|-------|---|
| 19.5 | A10AB06 | insulin glulisin, cartridge 100U/ML | parent. | 40.00 | U | 28.96 | P |
|------|---------|-------------------------------------|---------|-------|---|-------|---|

Insulinová analogu (insulin aspart, insulin lispro, insulin glulisin) jsou indikována u pacientů, kde vedou k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu v porovnání s klasickými humánními insuliny, tj. kde podmiňují pokles průměrné hodnoty HbA1c aspoň o 10 % a vedou tudíž i ke zlepšení glykemických profilů včetně snížení frekvence hypoglykémie.

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|
| 19.6 | A10AB01 | insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump | parent. | 40.00 | U | 28.24 | L/DIA |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|-------|

28001 VELOSULIN 100 IU/ML inj sol 1x10ml/1ku NOO DK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|---|
| 19.7 | A10AD05 | insulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridge | parent. | 40.00 | U | 28.96 | P |
|------|---------|--|---------|-------|---|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|
| 19.8 | A10AE04 | insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv. | parent. | 40.00 | U | 22.00 | L/DIA |
|------|---------|---|---------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 19.9 | A10AE04 | insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridge | parent. | 40.00 | U | 46.55 | P |
| 19.10 | A10AE05 | insulin detemir, dlouhodobě účinný, cartridge | parent. | 40.00 | U | 46.55 | P |

Analogu inzulinů s dlouhodobým účinkem jsou předepisována jen u nemocných léčených v diabetologických centrech nebo ambulantními diabetology na doporučení diabetologického centra, u nichž je indikována léčba inzulínovou pumpou (opakované hypoglykémie, rozkolísaný diabetes s neuspokojivou kompenzací, nutnost podávat dlouhodobě účinný inzulín vícekrát denně).

| | |
|----|--|
| 20 | perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů |
|----|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|------|------|----|------|--|
| 20.1 | A10BA02 | metformin hydrochlorid | p.o. | 2.00 | GM | 6.12 | |
|------|---------|------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|------------------|----------------------|-----|----|
| 06668 | METFIREX 500 MG | por tbl flm60x500mg | CHN | H |
| 23228 | METFIREX 1 G | por tbflflm60x1000mg | CPW | H |
| 30294 | ADIMET | tbl obd 60x850mg | MCK | D |
| 30343 | METFORMIN AL 500 | por tbl flm30x500mg | APA | D |
| 30356 | METFORMIN AL 500 | por tbl flm60x500mg | APA | D |
| 30361 | METFORMIN AL 500 | por tbflflm120x500mg | APA | D |
| 40001 | METFORMIN AL 850 | por tbl flm30x850mg | APA | D |
| 40155 | METFORMIN AL 850 | por tbl flm60x850mg | APA | D |
| 40174 | METFORMIN AL 850 | por tbflflm120x850mg | APA | D |
| 41506 | METFIREX 850 MG | por tbflflm120x850mg | CHN | H |
| 41507 | METFIREX 500 MG | por tbflflm120x500mg | CHN | H |
| 58122 | DIAPHAGE 850 | por tbl flm50x850mg | SVS | CZ |
| 58123 | DIAPHAGE 850 | por tbflflm100x850mg | SVS | CZ |
| 58124 | DIAPHAGE 500 | por tbflflm100x500mg | SVS | CZ |
| 58125 | DIAPHAGE 500 | por tbl flm50x500mg | SVS | CZ |
| 64641 | ADIMET | tbl obd 30x850mg | MCK | D |
| 64642 | ADIMET | tbl obd 120x850mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|
| 20.2 | A10BA03 | buformin | p.o. | 0.20 | GM | 3.47 | |
|------|---------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 20.3 | A10BD02 | metformin a glibenklamid - kombinace | p.o. | 3.00 | DF | 4.95 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 20.4 | A10BD03 | metformin a rosiglitazon v kombinaci 500 mg a 1 mg | p.o. | 1.00 | DF | 10.25 | P |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 20.5 | A10BD03 | metformin a rosiglitazon v kombinaci 500 mg a 2 mg | p.o. | 1.00 | DF | 19.00 | P |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 20.6 | A10BD03 | metformin a rosiglitazon v kombinaci 1000 mg a 2 mg | p.o. | 1.00 | DF | 20.50 | P |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|

Metformin a rosiglitazon v kombinaci je indikován pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu a nadváhou (BMI vyšší než 25 kg/m²) a nedostatečnou kompenzací dosavadní léčbou metforminem v dávce alespoň 2g denně (HbA1c vyšší než 6,0 %/dle IFCC).

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 20.7 | A10BF01 | akarboza | p.o. | 0.30 | GM | 10.26 | |
|------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 20.8 | A10BG02 | rosiglitason s obsahem 4 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 35.00 | P |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 20.9 | A10BG03 | pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 35.00 | P |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 20.10 | A10BG03 | pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 41.60 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

Deriváty thiazolidindionů předepisuje diabetolog pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu a nadváhou či obezitou (BMI vyšší než 25 kg/m²) s vyjádřenou inzulínovou rezistencí za podmínek opakovaně prokázané nedostatečné kompenzace dosavadní léčbou

(HbA_{1c} vyšší než 6,0% /dle IFCC). Indikovaná denní dávka je 1tbl s obsahem 4 mg rosiglitazonu, nebo 1tbl s obsahem 15 mg nebo 1tableta s obsahem 30mg pioglitazonu.

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|------|-------|----|------|--|
| 21 | perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika | | | | | | |
| 21.1 | A10BB01 | glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 2.30 | |
| 21.2 | A10BB01 | glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.86 | |
| 21.3 | A10BB01 | glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 7.00 | MG | 1.37 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 21.4 | A10BB01 | glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě) | p.o. | 7.00 | MG | 0.86 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

94525 GLUCOBENE 3.5 MG
tbl 120x3.5mg MCK P

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 21.5 | A10BB02 | chlorpropamid | p.o. | 0.37 | GM | 0.78 | |
| 21.6 | A10BB03 | tolbutamid | p.o. | 1.50 | GM | 2.32 | |
| 21.7 | A10BB04 | glibornurid | p.o. | 38.00 | MG | 4.79 | |
| 21.8 | A10BB05 | tolazamid | p.o. | 1.00 | GM | 2.49 | |
| 21.9 | A10BB07 | glipizid | p.o. | 10.00 | MG | 3.80 | |
| 21.10 | A10BB08 | gliquidon | p.o. | 60.00 | MG | 5.65 | |
| 21.11 | A10BB09 | gliklazid | p.o. | 0.16 | GM | 5.90 | |

31897 GLICIREX por tbl nob 60x80mg RTT D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|-------|
| 21.12 | A10BB09 | gluklazid, retardované lékové formy | p.o. | 2.00 | DF | 5.90 | |
| 21.13 | A10BB12 | glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | MG | 5.90 | |
| 21.14 | A10BB12 | glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.00 | MG | 4.90 | |
| 21.15 | A10BX02 | repaglinid | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | L/DIA |
| 21.16 | A10BX03 | nateglinid | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | L/DIA |

22 vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání

22.1 A11CA01 retinol (vitamin A) p.o. 50.00 KU 1.12

22.2 A11CC01 ergocalciferol (pevné lékové formy) p.o. 6.00 KU 0.54

00353 VITAMIN D SLOVAKOFARMA cps 1x300ku SLO SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 22.3 | A11CC01 | ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně) | p.o. | 6.00 | KU | 13.10 | |
| 22.4 | A11CC01 | ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml) | p.o. | 6.00 | KU | 0.78 | |

00716 INFADIN gtt 1x10ml /100mg SLO SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 22.5 | A11CC02 | dihydrotachysterol | p.o. | 1.00 | MG | 17.13 | |
| 22.6 | A11CC03 | alfakalcidol do 0,50 rg včetně | p.o. | 1.00 | RG | 15.80 | P |
| 22.7 | A11CC03 | alfakalcidol nad 0,50 rg | p.o. | 1.00 | RG | 14.90 | P |
| 22.8 | A11CC04 | kalcitriol | p.o. | 1.00 | RG | 29.83 | P |

Léčbu p.o. alfakalcidolem a kalcitriolem předepisuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. S osteoporózou:

- a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,
- b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,
- c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. K léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. S křivicí rezistentní na vitamin D.

4. S osteomalacií rezistentní na vitamin D.

5. S hypoparathyreózou nebo pseudohypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 22.9 | A11CC05 | cholekalcirol - pevné lékové formy | p.o. | 0.50 | MG | 1.04 | |
| 22.10 | A11CC05 | cholekalcirol – tekuté lékové formy | p.o. | 0.50 | MG | 3.84 | |

12023 VIGANTOL

por gtt sol 1x10ml

MEC D

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|---------|-------|----|--------|-----|
| 23.1 | A11CA01 | retinol (vitamin A) | parent. | 50.00 | KU | 10.40 | |
| 23.2 | A11CC | paricalcitolum | parent. | 2.50 | RG | 385.00 | O/P |

Léčba paricalcitem je indikována pokud:

- a) je koncentrace PHT v séru vyšší než 400pg/ml i přes léčbu kalcitriolem, trvající 3 měsíce,
- b) selhává léčba kalcitriolem (hyperkalcémie při léčbě kalcitriolem – vyšší než 2,7 mmol/l a hyperfosfatémie vyšší než 2,5 mmol/l; fosfokalciový součin je vyšší než 6,5),
- c) extraoseální kalcifikace při pokročilé hyperparathyreóze).

Podmínkou léčby je:

- a) sonograficky prokázaná zvětšená příštítá tělíska,
- b) ověřená účinnost hemodialýzy (Kt/V vyšší než 1,2),
- c) compliance pacienta s opatřeními regulujícími koncentraci fosforu v séru (dietoterapie, účinná dialýza, preskripcie vazačů fosfátů v GIT).

16881 ZEMPLAR 5 MCG/ML

inj sol 5x2ml

ABB I

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------|---------|------|----|--------|---|
| 23.3 | A11CC01 | ergokalciferol | parent. | 6.00 | KU | 0.72 | |
| 23.4 | A11CC04 | kalcitriol | parent. | 1.00 | RG | 174.20 | P |

Léčbu parenterálním kalcitriolem předepisuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. S osteoporózou:

- a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,
- b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,
- c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. K léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. S křivicí rezistentní na vitamin D.

4. S osteomalacií rezistentní na vitamin D.

5. S hypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|---------|------|----|------|--|
| 23.5 | A11CC05 | cholekalcirol | parent. | 1.00 | KU | 0.94 | |
|------|---------|---------------|---------|------|----|------|--|

11093 VIGANTOL 50000

inj 5x1ml/1.25mg

MEC D

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|------|------|----|------|--|
| 24 | soli vápníku, perorální podání | | | | | | |
| 24.1 | A12AA03 | glukonát vápenatý (na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 0.59 | |
| 24.2 | A12AA04 | uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tablety | p.o. | 0.50 | GM | 2.34 | |

70536 TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM portblnob1000x0.5gm MVM CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 24.3 | A12AA04 | uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tablety | p.o. | 0.50 | GM | 2.34 | |
| 24.4 | A12AA04 | uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma prášky | p.o. | 0.50 | GM | 2.34 | |
| 24.5 | A12AA07 | chlorid vápenatý (na obsah vápníku), tekuté lékové formy, | p.o. | 0.20 | GM | 0.64 | |
| 24.6 | A12AA12 | octan vápenatý (na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|------|----|------|-----------------------|--|
| 25 | kombinace solí vápníku, perorální podání | | | | | | | |
| 25.1 | A12AA20 | vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 2.54 | | |
| 25.2 | A12AX | uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce včetně | sp.o. | 1.00 | DF | 3.26 | | |
| 25.3 | A12AX | uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce | sp.o. | 1.00 | DF | 4.00 | | |
| 25.4 | A12AX | uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 600 mg vápníku v 1 dávce | sp.o. | 1.00 | DF | 6.51 | | |
| 25.5 | A12AX | vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný) | p.o. | 1.00 | DF | 5.38 | L/INT,GYN,ORT,REV,GER | |
| 25.6 | A12AX | vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat) | p.o. | 1.00 | DF | 4.01 | L/INT,GYN,ORT,REV,GER | |
| 25.7 | A12CX | jiné minerální produkty (na obsah vápníku) | p.o. | 0.50 | GM | 1.19 | | |

99808 BIOMIN H plv 60x3gm(sÁČky) BMN SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 27.1 | A12BA | draslík (na obsah draslíku) | p.o. | 1.50 | GM | 2.44 | |
| 27.2 | A12BA | draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku) | p.o. | 1.00 | GM | 9.78 | |
| 27.3 | A12BA01 | chlorid draselný (na obsah chloridu draselného) | p.o. | 3.00 | GM | 2.37 | |

13715 KALNORMIN por tbl pro 30x1gm ICN H

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 28 | soli draslíku, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 28.1 | A12BA | draslík v kombinaci s hořčíkem | parent. | 1.00 | DF | 13.20 | O |
|------|-------|--------------------------------|---------|------|----|-------|---|

02132 CARDILAN inj 10x10ml HBS SK

| | | | | | | | |
|------|-------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 28.2 | A12BA | draslík v kombinaci s hořčíkem, léková forma infuzí | parent. | 250.00 | ML | 86.00 | O |
|------|-------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 28.3 | A12BA01 | chlorid draselný (na obsah chloridu draselného) | parent. | 3.00 | GM | 53.45 | O |
|------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

02486 KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% ZEH CZ

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 29 | soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 29.1 | A12CC03 | glukonat hořčenatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY,GYN,GER |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 29.2 | A12CC04 | citronan hořčenatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY,GYN,GER |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 29.3 | A12CC05 | aspartat hořčenatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY,GYN,GER |
|------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 29.4 | A12CC06 | mléčnan hořčenatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY,GYN,GER |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 29.5 | A12CC09 | orotat hořčenatý (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY,GYN,GER |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|-----------------------|
| 29.6 | A12CC30 | kombinace hořčenatých solí (na obsah hořčíku) | p.o. | 1.00 | GM | 11.38 | L/INT,NEU,PSY,GYN,GER |
|------|---------|---|------|------|----|-------|-----------------------|

18774 MAGNESIUM 250 MG PHARMAVIT por tbl eff 20 BSQ F

99891 MAGNESIUM 250 MG PHARMAVIT por tbl eff 20 CPW H

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 30 | soli hořčíku, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 30.1 | A12CC02 | síran hořčenatý (koncentrace do 10 % včetně) | parent. | 1.00 | GM | 19.72 | O |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 30.2 | A12CC02 | síran hořčenatý (koncentrace nad 10%) | parent. | 1.00 | GM | 9.28 | O |
|------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|------|---|

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.20% inj 5x10ml 20% HBS SK

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 31 | soli fluoru, perorální podání | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 31.1 | A12CD01 | fluorid sodný | p.o. | 88.00 | MG | 5.28 | |
|------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|

91080 FLUOSSEN

por tbl ent 30x15mg

ICN

PL

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 32 | ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 32.1 | A08AA10 | sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 15.00 | MG | 50.00 | P |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 32.2 | A08AA10 | sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletě | p.o. | 15.00 | MG | 37.70 | P |
|------|---------|--|------|-------|----|-------|---|

Sibutramin předepisuje diabetolog pacientům s nedostatečně kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu (glykohemoglobin vyšší než 6% /dle IFCC) a současně s BMI vyšším než 35 kg/m², u nichž je diagnostikována diabetická dyslipidémie vyžadující farmakologickou léčbu. Kontraindikací je ICHS nebo krevní tlak vyšší než 145/90. Sibutramin lze předepsat pouze těm pacientům, kteří sníží svou hmotnost o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance musí být vyhodnocena každých 14 dnů od zahájení léčby (krevní tlak a tepová frekvence) po dobu 3 měsíců, účinnost po 3 měsících léčby sibutraminem. Kritériem účinnosti léčby sibutraminem je pokles hmotnosti nejméně o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie nalačno nebo pokles HbA1c o alespoň 0,5%). Není – li léčba účinná, je podávání sibutraminu po 3 měsících ukončeno. Léčba sibutraminem je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|--------|----|-------|---|
| 32.3 | A08AB01 | orlistat | p.o. | 360.00 | MG | 37.70 | P |
|------|---------|----------|------|--------|----|-------|---|

Diabetolog předepisuje orlistat k léčbě obézních pacientů s diabetem 2. typu a BMI nad 35 kg/m² se současně diagnostikovanou arteriální hypertenzí a/nebo dyslipidémií a/nebo ischemickou chorobou srdeční, u nichž není diabetes uspokojivě kompenzován (HbA1c vyšší než 6,0% /IFCC) při stávající antidiabetické medikaci. Orlistat lze předepsat pouze těm pacientům, kteří sníží svou hmotnost o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Účinnost terapie orlistatem je kontrolovaná po 3 měsících, kritériem je zlepšení kompenzace diabetu (glykémie nalačno anebo pokles HbA1c o alespoň 0,5% v absolutním vyjádření) a pokles hmotnosti nejméně o 5% původní tělesné hmotnosti. Není – li léčba účinná, je podávání orlistatu po 3 měsících ukončeno. Léčba je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 32.4 | A11GA01 | kyselina askorbová (vitamin C) | parent. | 0.20 | GM | 3.32 | H |
| 32.5 | A14AB01 | nandrolon phenpropionát | parent. | 2.00 | MG | 3.11 | |
| 32.6 | A16AA01 | levokarnitin | parent. | 2.00 | GM | 356.82 | O |
| 32.7 | A16AA02 | ademetionin | p.o. | 1.00 | GM | 59.83 | Z |
| 32.8 | A16AA02 | ademetionin | parent. | 0.50 | GM | 94.66 | Z |

12319 TRANSMETIL 500 MG INJEKCE inj pso lqf 5x500mg HOL I

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|--------|---|-----------|---|
| 32.9 | A16AB02 | imiglucerasa | parent. | 200.00 | U | 40 341.80 | Z |
|------|---------|--------------|---------|--------|---|-----------|---|

28018 CEREZYME inf plv sol 1x200ut GZE NL

28020 CEREZYME inf plv sol 1x400ut GZE NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|
| 32.10 | A16AB03 | agalsidáza alfa | parent. | 1.00 | MG | 17 700.00 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|
| 32.11 | A16AB04 | agalsidáza beta | parent. | 5.00 | MG | 17 700.00 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-----------|---|
| 32.12 | A16AB05 | laronidáza | parent. | 1.00 | DF | 33 264.00 | Z |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-----------|---|

13206 ALDURAZYME inf cnc sol 1x5ml GBZ GB

13207 ALDURAZYME inf cnc sol 10x5ml GBZ GB

13208 ALDURAZYME inf cnc sol 25x5ml GBZ GB

26354 ALDURAZYME inf cnc sol 1x5ml GZE NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|------|----|-------|---|
| 32.13 | A16AX01 | kyselina tioktová | parent. | 0.20 | GM | 81.09 | O |
|-------|---------|-------------------|---------|------|----|-------|---|

55381 THIOGAMMA 600 INJECT inj 500x20ml/600mg SLH D

84380 THIOGAMMA 600 INJECT inj 50x20ml/600mg SLH D

84381 THIOGAMMA 600 INJECT inj 100x20ml/600mg SLH D

84382 THIOGAMMA 600 INJECT inj 1000x20ml/600mg SLH D

32.14 A16AX06 miglustat p.o. 0.30 GM 9 734.00 Z

33 antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K

33.1 B01AA03 warfarin p.o. 7.50 MG 3.22

33.2 B01AA08 ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně) p.o. 0.60 GM 3.60

33.3 B01AA08 ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě) p.o. 0.60 GM 4.30

34 antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III

34.1 B01AB01 heparin parent. 10.00 KU 13.32 O

342 B01AB02 antithrombin parent. 2.10 KU 24 250.00 U

93174 ANTITHROMBIN III IMMUNO ini psq lgf 1x1ku BXG A

35 antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů

35.1 B01AB certoparin parent 3.00 KU 76.79 IP

31316 TROPARIN AMPOULE inj 10x0.5ml/32mg BCA A

35.2 B01AB04 dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli parent. 3.00 KU 64.45 P

| | | | | | | |
|------|---------|--|------|----|-------|---|
| 35.3 | BO1AB04 | dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| | | v jedné ampuli | | | | |

35.4 B01AB04 dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli parent. 3.00 KU 49.60 P

35.5 B01AB05 enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli parent. 3.00 KU 64.45 P

| | | | | | | |
|------|---------|--|------|----|-------|---|
| 35.6 | B01AB05 | exoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| | | v jedné ampuli | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 35.7 | BO1AB05 | exoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 59.74 | P |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

35.8 B01AB05 enoxaparin nad 80 mg do 100 mg v jedné ampuli včetně parent. 3.00 KU 49.60 P

35 9 B01AB05 lenoxaparin nad 100 mg v jedné ampuli parent 3 00 KU 39 60 P

35.10 B01AB06 nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné parent. 3,00 KU 64,45 P

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|-------------------------------|------|----|-------|---|
| 35.11 | B01AB06 | nadroparin nad v jedné ampuli | 2,85 do 3,8 KU včetně parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
|-------|---------|----------------------------------|-------------------------------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 35.12 | B01AB06 | nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 59.74 | P |
| 35.13 | B01AB06 | nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně | parent. | 3.00 | KU | 49.60 | P |
| 35.14 | B01AB06 | nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 39.60 | P |
| 35.15 | B01AB07 | parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.16 | B01AB07 | parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |
| 35.17 | B01AB07 | parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 59.74 | P |
| 35.18 | B01AB08 | reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.45 | P |
| 35.19 | B01AB08 | reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli | parent. | 3.00 | KU | 64.40 | P |

Nízkomolekulární hepariny pro ambulantní péči lze předepisovat na recept pouze:

- 1) v indikaci léčby hluboké žilní trombosy potvrzené doplerovským vyšetřením (dalteparin, enoxaparin, nadroparin, reviparin, parnaparin)
- 2) prevence srážení krve v mimotělním oběhu, zejm. při hemodialýze a hemofiltraci (dalteparin, enoxaparin, nadroparin, reviparin)
- 3) v profylaxi tromboembolie v perioperačním období, zejm. při nutnosti ambulanterního převedení z perorálních antikoagulancí na nízkomolekulární hepariny (dalteparin, enoxaparin, nadroparin, parnaparin, reviparin) na dobu maxim. 5 dnů
- 4) pro léčbu stavů vyžadujících antikoagulační léčbu v průběhu gravidity či před plánovanou srdeční transplantací (dalteparin, enoxaparin, nadroparin)
- 5) prevenci a léčbu hluboké žilní trombosy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat požadované snížení koagulačních faktorů perorálními antikoagulancii či při nemožnosti tato antikoagulancia podat (dalteparin, enoxaparin, nadroparin)

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|--------|---|-------|---------------------------|
| 35.20 | B01AB11 | sulodexid | parent. | 600.00 | U | 63.44 | O |
| 35.21 | B01AB11 | sulodexid | p.o. | 250.00 | U | 10.60 | L/OPH, INT, NEU, DIA, GER |

| 36 antiagregancia kromě heparinu | | | | | | | |
|---|---------|--|------|-------|----|-------|---|
| 36.1 | B01AC | lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce) | p.o. | 1.00 | DF | 0.68 | |
| 36.2 | B01AC | lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce) | p.o. | 1.00 | DF | 0.64 | |
| 36.3 | B01AC04 | klopidoget | p.o. | 75.00 | MG | 49.00 | P |

Léčbu klopidogetem předepisuje internista nebo kardiolog:

- a) v prevenci recidivy koronární přihody u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevace ST (nestabilní angina pectoris či infarkt myokardu bez elevace ST) po dobu 6 měsíců,
- b) po intravaskulárních intervencích s vysokým rizikem trombózy (implantace stentu, rotablace, aterektomie, přímá koronární angioplastika) obvykle v kombinaci s k. acetylsalicylovou po dobu jednoho měsíce či u tzv. „potahovaných“ stentů uvolňujících sirolimus či paclitaxel po dobu 3 měsíců.

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|-------|---|
| 36.4 | B01AC05 | ticlopidin | p.o. | 0.50 | GM | 20.70 | P |
|------|---------|------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu ticlopidinem předepisuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) u alergie a prokazatelné intolerance k. acetylsalicylové či při necitlivosti na k. acetylsalicylovou prokázanou agregometricky v indikaci snížení rizika kardiovaskulárních přihod u nemocných po ischemické mozkové přihodě (včetně TIA), u nemocných s ischemickou chorobou srdeční či s ischemickou chorobou dolních končetin,
- b) v prevenci recidivy mozkové přihody u nemocných po ischemické mozkové přihodě (včetně TIA), která se objevila při léčbě kys. acetylsalicylovou,
- c) v prevenci opakující se trombózy v arterio-venózní spojce u hemodialyzovaných nemocných při léčbě k. acetylsalicylovou

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 02973 | TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG | tbl obd 30x250mg | MCK | D |
| 02974 | TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG | tbl obd 90x250mg | MCK | D |
| 02984 | APO-TIC | por tbl obd30x250mg | APT | CND |
| 02985 | APO-TIC | por tblobd100x250mg | APT | CND |
| 15320 | APO-TIC | por tbl flm30x250mg | CMG | IRL |
| 15321 | APO-TIC | por tbflm100x250mg | CMG | IRL |
| 16584 | APO-TIC | por tbl flm30x250mg | KAT | NL |
| 16585 | APO-TIC | por tbflm100x250mg | KAT | NL |
| 21023 | IPATON 250 MG | por tbl flm60x250mg | EGI | H |
| 66938 | TAGREN | tbl 30x250mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 36.5 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová | parent. | 3.00 | GM | 36.30 | O |
|------|---------|---------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|--|------|----|------|--|
| 36.6 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová (do 30 mg/p.o. v jedné tabletě včetně) | | 1.00 | DF | 0.51 | |
|------|---------|---|--|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 36.7 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 0.98 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 36.8 | B01AC06 | kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 0.51 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|--------|----|------|---|
| 36.9 | B01AC07 | dipyridamol | p.o. | 400.00 | MG | 8.65 | P |
|------|---------|-------------|------|--------|----|------|---|

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací předepisuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 36.10 | B01AC07 | dipyridamol | parent. | 0.20 | GM | 224.45 | H |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|
| 36.11 | B01AC09 | epoprostenol | parent. | 0.50 | MG | 3 595.00 | X |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|---|
| 36.12 | B01AC10 | indobufen | p.o. | 0.30 | GM | 8.40 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|---|

Léčbu indobufenem předepisuje internista, kardiolog nebo neurolog u pacientů, u kterých je potřebné zajistit pouze krátkodobě antiagregační účinek (např. před chirurgickým výkonem).

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 36.13 | B01AC10 | indobufen | parent. | 0.30 | GM | 89.35 | H |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|--------|---|
| 36.14 | B01AC11 | iloprost | parent. | 50.00 | RG | 660.60 | X |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|-------|----|---------|---|
| 36.15 | B01AC11 | iloprost | inhalač. | 50.00 | RG | 1765.00 | X |
|-------|---------|----------|----------|-------|----|---------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|
| 36.16 | B01AC21 | treprostinil | parent. | 1.00 | MG | 7 190.00 | X |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 36.17 | B01AC30 | dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinaci | p.o. | 2.00 | DF | 12.00 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací předepisuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky k. acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 37 | fibrinolytické enzymy | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|
| 37.1 | B01AC13 | abciximab | parent. | 1.00 | DF | 10 018.00 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 37.2 | B01AC14 | anagrelid | parent. | 1.00 | DF | 140.00 | X |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|
| 37.3 | B01AD01 | streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce) | parent. | 1.50 | MU | 3 384.60 | U |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|

10937 STREPTASE

inj sic 1x750ku

AVN D

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|
| 37.4 | B01AD01 | streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce) | parent. | 1.50 | MU | 3 314.67 | U |
|------|---------|---|---------|------|----|----------|---|

62461 STREPTASE

inj sic 1x1.5mu

AVN D

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.5 | B01AD02 | altepláza | parent. | 0.10 | GM | 34 897.44 | U/P |
|------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.6 | B01AD04 | urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně) | parent. | 3.00 | MU | 53 928.40 | U/P |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.7 | B01AD04 | urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně) | parent. | 3.00 | MU | 45 346.56 | U/P |
|------|---------|--|---------|------|----|-----------|-----|

07411 RHEOTROMB 500.000

inj plv sol 1x500ku

BGD D

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-----------|-----|
| 37.8 | B01AD04 | urokináza (nad 500 KU v jedné dávce) | parent. | 3.00 | MU | 42 565.93 | U/P |
|------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|---|-----------|-----|
| 37.9 | B01AD07 | retepláza | parent. | 20.00 | U | 43 265.44 | U/P |
|------|---------|-----------|---------|-------|---|-----------|-----|

Altepláza, urokináza, tenektepláza a retepláza jsou indikovány v těchto indikacích:

a) u akutního infarktu myokardu, u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Altepláza je dále indikována při léčbě ischemické cévní mozkové příhody (léčbu je nutno zahájit do 3 hodin od vzniku příznaků ischemické cévní mozkové příhody a po vyloučení intrakraniálního krvácení vhodnou zobrazovací metodou).

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou jsou altepláza, urokináza, tenektepláza a retepláza indikovány pro:

- a) intrakoronární trombolýzu,
- b) trombolýzu akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|----------|---|
| 37.10 | B01AD10 | drotrecogin alfa (aktivovaný) | parent. | 5.00 | MG | 6 882.00 | X |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|
| 37.11 | B01AD11 | tenekteplaza do 40 mg včetně | parent. | 40.00 | MG | 42 757.20 | U/P |
|-------|---------|------------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|
| 37.12 | B01AD11 | tenekteplaza nad 40 mg | parent. | 40.00 | MG | 35 914.50 | U/P |
|-------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----|
| 37.13 | B01AD12 | protein C | parent. | 1.00 | IU | 65.38 | U/P |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----|

Léčbu proteinem C předepisuje hematolog v centru pro vrozené a získané poruchy hemostázy u nemocných s prokázaným vrozeným deficitem proteinu C.

28023 CEPROTIN

inj pso lqf1x500ut

BXG A

28024 CEPROTIN

inj pso lqf1x1000ut

BXG A

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 37.14 | B01AX03 | lepirudin | parent. | 1.00 | DF | 2 300.00 | H |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|---|
| 37.15 | B01AX05 | fondaparinux | parent. | 1.00 | DF | 95.00 | H |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|---|

| | |
|----|-------------------------------------|
| 38 | antifibrinolytika, perorální podání |
|----|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 38.1 | B02AA01 | kyselina aminokaproová | p.o. | 16.00 | GM | 38.86 | |
|------|---------|------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 38.2 | B02AA02 | kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 2.00 | GM | 40.72 | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 38.3 | B02AA02 | kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě) | p.o. | 2.00 | GM | 29.69 | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|--|

42613 EXACYL

por tblflm20x500mg

SXQ P

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 38.4 | B02AA03 | kyselina aminomethylbenzoová | p.o. | 0.25 | GM | 19.13 | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 39 | antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|---------|-------|----|----------|---|
| 39.1 | B01AC16 | eptifibatide infuze | parent. | 1.00 | DF | 2 637.30 | H |
| 39.2 | B01AC16 | eptifibatide injekce | parent. | 1.00 | DF | 837.24 | H |
| 39.3 | B01AC17 | tirofiban | parent. | 1.00 | DF | 4 893.30 | H |
| 39.4 | B02AA01 | kyselina aminokaproová | parent. | 16.00 | GM | 65.01 | |
| 39.5 | B02AA02 | kyselina tranexámová | parent. | 2.00 | GM | 64.32 | |
| 39.6 | B02AA03 | kyselina aminomethylbenzoová | parent. | 0.25 | GM | 186.61 | |

42630 PAMBA inj sol 5x5ml/50mg AKZ D

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------|--------|----|-----------|---|
| 39.7 | B02AB01 | aprotinin | parent. | 500.00 | KU | 664.66 | H |
| 39.8 | B02AB02 | Alfa1 antitrypsin | parent. | 1.00 | GM | 11 200.00 | Z |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 40 | vitamin K a jiná hemostatika | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 40.1 | B02BA | menadiolfosfat sodná sůl | parent. | 10.00 | MG | 14.27 | |
| 40.2 | B02BA01 | fytomenadion | p.o. | 20.00 | MG | 10.38 | |
| 40.3 | B02BA01 | fytomenadion | parent. | 20.00 | MG | 15.68 | |
| 40.4 | B02BB01 | lidský fibrinogen | parent. | 5.00 | GM | 24 234,20 | U |

62464 HAEMOCOMPLETTAN P inf plv sol1x1000mg AVN D

62465 HAEMOCOMPLETTAN P inf plv sol1x2000mg AVN D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------------------|
| 40.5 | B02BC | lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | |
| 40.6 | B02BC | lokální hemostatika (pěna) | lok. | 1.00 | C2 | 1.47 | |
| 40.7 | B02BC | lokální hemostatika (rektální lékové formy) | lok. | 1.00 | DF | 7.19 | |
| 40.8 | B02BC | lidský thrombin a fibrinogen (houba) | lok. | 1.00 | DF | 56.80 | H |
| 40.9 | B02BC01 | absorbovatelná želatinová houba | lok. | 1.00 | C2 | 2.69 | |
| 40.10 | B02BC06 | thrombin (houba) | lok. | 1.00 | DF | 56.80 | |
| 40.11 | B02BX01 | etamsylat | p.o. | 0.75 | GM | 11.30 | L/OPH,HEM, ORL |
| 40.12 | B02BX01 | etamsylat | parent. | 0.75 | GM | 72.45 | O |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 41 | koagulační faktory (koagulační faktor VIII) | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|---|----------|-----|
| 41.1 | B02BD02 | koagulační faktor VIII (středně čištěný) | parent. | 500.00 | U | 5 083.42 | B/P |
| 41.2 | B02BD02 | koagulační faktor VIII (vysoce čištěný) | parent. | 500.00 | U | 5 818.70 | B/P |
| 41.3 | B02BD02 | koagulační faktor VIII (rekombinantní) | parent. | 500.00 | U | 5 818.70 | B/P |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|---|----------|-----|
| 41.4 | B02BD02 | koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem | parent. | 500.00 | U | 7 820.64 | B/P |
| 41.5 | B02BD02 | koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem | parent. | 500.00 | U | 9 263.30 | B/P |

Léčbu koagulačním faktorem VIII předepisuje hematolog pro:

a) prevenci a léčbu krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII, b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek), c) vepřový faktor VIII je hrazen u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII, d) u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru VIII či při absolutní nesnášenlivosti tétoho přípravku je hrazen koagulační faktor VIII rekombinantrní.

| | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-----|---|
| 88335 | HAEMATE P | inj sic 1x250ut+sol | AVN | D |
| 88336 | HAEMATE P | inj sic 1x500ut+sol | AVN | D |
| 88337 | HAEMATE P | inj sic 1x1ku+solv. | AVN | D |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 42 | koagulační faktory (koagulační faktor IX) | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|---------|--------|---|----------|-----|
| 42.1 | B02BD04 | koagulační faktor IX (středně čištěný) | parent. | 350.00 | U | 3 284.67 | B/P |
| 42.2 | B02BD04 | koagulační faktor IX (vysoce čištěný) | parent. | 350.00 | U | 4 285.96 | B/P |
| 75079 | IMMUNINE 600 I.E. | inj sic 1x600ut+5ml | BXG | A | | | |
| 75080 | IMMUNINE 1200 I.E. | inj sic 1.2ku+10ml | BXG | A | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-----|---|----------|-----|
| 42.3 | B02BD04 | koagulační faktor IX (rekombinantrní) | parent. | 350 | U | 4 285.96 | B/P |
|------|---------|---------------------------------------|---------|-----|---|----------|-----|

Léčbu koagulačním faktorem IX předepisuje hematolog k prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, anebo u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII; u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru IX, je indikován koagulační faktor IX rekombinantrní.

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 43 | ostatní koagulační faktory | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|---------|--------|---|----------|-----|
| 43.1 | B02BD | srážecí faktory | parent. | 350.00 | U | 2 975.02 | X |
| 43.2 | B02BD01 | kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X | parent. | 350.00 | U | 3 091.66 | B/P |
| 86657 | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 200I.U | injpsolqf 1x200ut+s | BXG | A | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|-------|----|------------|-----|
| 43.3 | B02BD03 | aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII | parent. | 10.00 | KU | 274 092.00 | B/P |
|------|---------|---|---------|-------|----|------------|-----|

Léčbu aktivitou obcházející inhibitor faktoru VIII předepisuje hematolog k léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|---------------------------|---------|--------|----|--------------|-----|
| 85676 | FEIBA TIM 4 500 J. | inf pso lqf 1x500ut | BXG | A | | | |
| 43.4 | B02BD05 | koagulační faktor VII | parent. | 6.00 | KU | 87 982.20 | X |
| 43.5 | B02BD07 | koagulační faktor XIII | parent. | 350.00 | U | 2 975.02 | X |
| 43.6 | B02BD08 | eptakog alfa (aktivovaný) | parent. | 2.50 | MU | 1 357 785.42 | B/P |

Léčbu eptakogem alfa předepisuje hematolog k léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, které není prokazatelně zvládnutelné jiným léčivým přípravkem jakož i u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|------|------|----|------|--|
| 44 | soli železa, perorální podání | | | | | | |
| 44.1 | B03AA02 | fumarát železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
| 44.2 | B03AA02 | fumarát železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 2.98 | |

00677 FERRONAT sus 1x100ml/3gm IXP CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 44.3 | B03AA03 | glukonát železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
| 44.4 | B03AA03 | glukonát železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 44.5 | B03AA05 | chlorid železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
| 44.6 | B03AA05 | chlorid železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 44.7 | B03AA07 | síran železnatý (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 1.12 | |
| 44.8 | B03AA07 | síran železnatý (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 44.9 | B03AB | soli trojmočného železa (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 44.10 | B03AB02 | polymaltosum ferricum (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 2,28 | |
| 44.11 | B03AB02 | polymaltosum ferricum (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | GM | 10.80 | |

02946 MALTOFER por gtt sol 30 ml VII CH
 16595 MALTOFER por gtt sol 30ml AFS F

| 45 soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--------------------|
| 45.1 | B03AD | glukonat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
| 45.2 | B03AD | chlorid železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
| 45.3 | B03AD02 | fumarat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |

89140 FERRETAB COMP. cps 30 LAR A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--------------------|
| 45.4 | B03AD03 | síran železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
| 45.5 | B03AD04 | polymaltosum ferricum /kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.90 | L/GYN,HEM,INT, GER |
| 45.6 | B03AE01 | dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12 | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.7 | B03AE02 | dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.8 | B03AE10 | fumarat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.9 | B03AE10 | glukonat železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.10 | B03AE10 | chlorid železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
| 45.11 | B03AE10 | různé kombinace bez kyseliny listové | p.o. | 0.10 | GM | 2.30 | |

97402 SORBIFER DURULES tbl obd 50x100mg EGI H

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 45.12 | B03AE10 | síran železnatý/kyselina listová | p.o. | 0.10 | GM | 3.20 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 45.13 | B03AE10 | síran železnatý/serin -pevné lékové formy | p.o. | 0.10 | GM | 2.30 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 45.14 | B03AE10 | síran železnatý/serin -tekuté lékové formy | p.o. | 0.10 | GM | 10.80 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 46 | soli železa, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 46.1 | B03AC02 | hydroxid železitý se sacharózou | parent. | 0.10 | GM | 31.47 | O |
|------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|

04084 FERRUM LEK I.M. inj sol 50x2ml/100mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 46.2 | B03AC03 | komplex železo-sorbitol-citronová kyselina | parent. | 0.10 | GM | 25.56 | O |
|------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 46.3 | B03AC07 | glukonát železito-sodný | parent. | 0.10 | GM | 41.25 | O |
|------|---------|-------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 47 | vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 47.1 | B03BA01 | cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.02 | MG | 0.51 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 47.2 | B03BA01 | cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.02 | MG | 0.20 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

92503 NEUROBENE inj 6x1ml/1000rg MCK D

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|------|-------|----|------|--|
| 47.3 | B03BB01 | kyselina listová | p.o. | 10.00 | MG | 1.39 | |
|------|---------|------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 48 | erythropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|-----|
| 48.1 | B03XA01 | erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetně | parent. | 1.00 | KU | 493.27 | K/P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|-----|

26700 NEORECORMON 500 IU inj sol 6x0.3ml RRG GB

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 48.2 | B03XA01 | erythropoetin více než 500 IU do 10 KU v jedné ampuli včetně | parent. | 1.00 | KU | 376.75 | K/P |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|-----|
| 48.3 | B03XA01 | erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli | parent. | 1.00 | KU | 356.00 | K/P |
|------|---------|---|---------|------|----|--------|-----|

26714 NEORECORMON 60 000 IU inj pso lqf 3x1mldv RRG GB

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 48.4 | B03XA02 | darbepoetin do 50 mikrogramů v ampuli včetně | parent. | 5.00 | RG | 376.75 | K/P |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 48.5 | B03XA02 | darbepoetin nad 50 mikrogramů v ampuli | parent. | 5.00 | RG | 356.00 | K/P |
|------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|

Léčbu erythropoetinem a darbepoetinem předepisuje onkolog, hematolog, internista, nefrolog nebo pediatr:

- a) k léčbě klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- b) k léčbě anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftázou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- c) k léčbě těžké anémie nezralých dětí.

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 49 | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-------|----|----------|---|
| 49.1 | B05AA01 | albumin | parent. | 20.00 | GM | 1 883.29 | B |
|------|---------|---------|---------|-------|----|----------|---|

62471 HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO inf sol 1x100ml 20% BXG A

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------------|--------|-----|--------|---|
| 50 | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) | | | | | | |
| 50.1 | B05AA02 | ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady | parent. | 100.00 | ML | 952.16 | B |
| 50.2 | B05AA05 | dextran (koncentrace 10%) | parent. | 500.00 | ML | 185.84 | O |
| 50.3 | B05AA05 | dextran (koncentrace 6%) | parent. | 500.00 | ML | 108.80 | O |
| 50.4 | B05AA05 | dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku) | parent. | 500.00 | ML | 123.86 | O |
| 50.5 | B05AA06 | želatinové přípravky | parent. | 500.00 | ML | 168.71 | O |
| 56412 | GELOFUSINE | | inf 1x500ml | | BME | CH | |
| 83274 | GELOFUSINE | | inf sol 1x500ml v | | BMM | D | |
| 50.6 | B05AA07 | hydroxyethyl škrob | parent. | 500.00 | ML | 286.90 | O |
| 01798 | SERAG-HAES 6% | | inf sol 1x500ml/30gm | | SWS | D | |
| 01894 | SERAG-HAES 10% | | inf sol 1x500ml/50gm | | SWS | D | |
| 44431 | HEMOHES 6% | | inf sol 1x500ml-pe | | BMM | D | |
| 55897 | HEMOHES 6% | | inf sol 10x500ml-pe | | BMM | D | |
| 51 | parenterální výživa | | | | | | |
| 51.1 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 38.76 | H |
| 31989 | CLINIMIX N9G20E | | inf sol 4x2000ml | | BXF | GB | |
| 98240 | AMINOPLASMAL 5% E | | inf 1x500ml | | BME | D | |
| 51.2 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 47.42 | H |
| 11626 | AMINOPLASMAL 10% | | inf 1x500ml | | BME | D | |
| 31985 | CLINIMIX N14G30E | | inf sol 4x2000ml | | BXF | GB | |
| 31987 | CLINIMIX N17G35E | | inf sol 4x2000ml | | BXF | GB | |
| 51.3 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 70.48 | H |
| 51.4 | B05BA01 | aminokyseliny (koncentrace nad 14%) | parent. | 100.00 | ML | 63.44 | H |
| 75521 | AMINOPLASMAL 15% E | | inf 1x1000ml | | BME | D | |
| 51.5 | B05BA02 | tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 173.20 | H |
| 31526 | SOYACAL 10% | | inf eml 20x100ml | | GFL | E | |
| 49956 | INTRALIPID 10 % | | inf 12x100ml-sklo | | FRK | A | |
| 49959 | INTRALIPID 10 % | | inf 1x100ml-vak | | FRK | A | |
| 49960 | INTRALIPID 10 % | | inf 10x100ml-vak | | FRK | A | |
| 49970 | INTRALIPID 10 % | | inf 1x100ml-sklo | | FRK | A | |
| 51.6 | B05BA02 | tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 53.83 | H |

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|
| 49962 | INTRALIPID 10 % | inf 12x500ml-vak | FRK | A |
| 49973 | INTRALIPID 10 % | inf 12x500ml-sklo | FRK | A |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 51.7 | B05BA02 | tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 196.40 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|-------------|------------------|-----|---|
| 31529 | SOYACAL 20% | inf eml 20x100ml | GFL | E |
|-------|-------------|------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.8 | B05BA02 | tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 67.58 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|
| 49971 | INTRALIPID 20 % | inf 1x1000ml-sklo | FRK | A |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|
| 49972 | INTRALIPID 20 % | inf 6x1000ml-sklo | FRK | A |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|
| 57247 | INTRALIPID 20 % | inf 6x1000ml-sklo | FRK | S |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.9 | B05BA03 | fruktóza (koncentrace do 5% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 14.47 | H |
|------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 51.10 | B05BA03 | fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 15.54 | H |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.11 | B05BA03 | fruktóza (koncentrace nad 10%) | parent. | 100.00 | ML | 17.74 | H |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.12 | B05BA03 | glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 28.00 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 03433 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x100ml-sk | FKI | I |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 31430 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x100ml-skl | FKI | I |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|
| 59432 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(vak) | BFF | I |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|
| 59436 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(vak) | BFH | E |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.13 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 12.71 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 31432 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x250ml-skl | FKI | I |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 31433 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 16x250ml-sk | FKI | I |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|
| 59433 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|
| 59437 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------|-----|----|
| 62376 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA | inf 1x250ml(sklo) | IMA | SK |
|-------|--------------------------|-------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---|
| 97735 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.14 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 6.04 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|---|
| 31437 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-pp | FKI | I |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|-----|---|
| 47000 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | E |
|-------|------------------|----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|-----|----|
| 47017 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | CH |
|-------|------------------|----------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|
| 59419 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|----|
| 71735 | INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|-----|---|
| 96877 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BMM | D |
|-------|------------------|----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---|
| 97736 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|
| 97737 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
|-------|-------------------------------|------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.15 | B05BA03 | glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 5.82 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 31436 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-sk | FKI | I |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 31439 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-pp | FKI | I |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----|---|
| 31440 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 12x1000ml-pp | FKI | I |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 31447 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-va | FKI | I |
| 31449 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x2000ml-va | FKI | I |
| 31450 | 10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 4x2000ml-va | FKI | I |
| 47001 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x1000ml-pe | BME | E |
| 47018 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x1000ml-pe | BME | CH |
| 59434 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFF | I |
| 59438 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 92772 | INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 96878 | GLUKÓZA 10 BRAUN | inf 1x1000ml-pe | BMM | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 51.16 | B05BA03 | glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení) včetně) | parent. | 100.00 | ML | 29.10 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|

57750 GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN inf 1x100ml HUA H

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.17 | B05BA03 | glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 6.46 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---|
| 59421 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 59422 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 86054 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 97738 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.18 | B05BA03 | glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení) včetně) | parent. | 100.00 | ML | 27.76 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| 03432 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x100ml-sk | FKI | I |
| 31451 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x100ml-skl | FKI | I |
| 31462 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x100ml-vak | FKI | I |
| 31463 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 40x100ml-va | FKI | I |
| 46994 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-sklo | BME | E |
| 47011 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-sklo | BME | CH |
| 47252 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-pe | BMM | D |
| 47253 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-pe | BME | E |
| 47254 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-pe | BME | CH |
| 47255 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 20x100ml-pe | BME | CH |
| 47256 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 20x100ml-pe | BMM | D |
| 47257 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 20x100ml-pe | BME | E |
| 59413 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(vak) | BFH | E |
| 62370 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | inf 1x100ml(sklo) | IMA | SK |
| 96871 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x100ml-sklo | BMM | D |
| 97728 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(sklo) | BFF | I |
| 97731 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x100ml(vak) | BFF | I |
| 98886 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 50x100ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.19 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení) včetně) | parent. | 100.00 | ML | 12.90 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| 31453 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x250ml-skl | FKI | I |
| 31454 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 16x250ml-sk | FKI | I |
| 31464 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x250ml-vak | FKI | I |
| 31465 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 30x250ml-va | FKI | I |
| 46995 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x250ml-pe | BME | E |
| 47012 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x250ml-pe | BME | CH |
| 59414 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|-----|----|
| 62372 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | inf 1x250ml(sklo) | IMA | SK |
| 66866 | INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA | inf sol 1x250ml-skl | IHO | CZ |
| 96872 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x250ml-pe | BMM | D |
| 97729 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |
| 97732 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 98893 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 35x150ml | BFH | E |
| 98894 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 30x250ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.20 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 6.89 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| 31455 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-skl | FKI | I |
| 31456 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 12x500ml-sk | FKI | I |
| 31458 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-pp | FKI | I |
| 31459 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x500ml-pp | FKI | I |
| 31466 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x500ml-vak | FKI | I |
| 31467 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 20x500ml-va | FKI | I |
| 46996 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | E |
| 47013 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BME | CH |
| 59415 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 71734 | INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 96873 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 1x500ml-pe | BMM | D |
| 97730 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 97733 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 98901 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 20x500ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.21 | B05BA03 | glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 3.96 | O |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----|---|
| 31468 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-va | FKI | I |
| 31469 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 10x1000ml-va | FKI | I |
| 31470 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 1x2000ml-va | FKI | I |
| 31471 | 5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS | inf sol 4x2000ml-va | FKI | I |
| 59416 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 97734 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFF | I |
| 98902 | GLUKÓZA 5% VIAFLO | inf sol 10x1000ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.22 | B05BA03 | glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | ML | 23.90 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|
| 47241 | GLUKÓZA 5 BRAUN | inf 20x10ml-pla.amp | BMM | D |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.23 | B05BA03 | glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | ML | 83.15 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|----|
| 02587 | GLUKÓZA 40 BRAUN | inf 20x10ml-pla.amp | BMM | D |
| 02588 | GLUKÓZA 40 BRAUN | inf 20x10ml-pla.amp | BME | E |
| 02589 | GLUKÓZA 40 BRAUN | inf 20x10ml-pla.amp | BME | CH |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.24 | B05BA03 | glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | ML | 98.74 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.25 | B05BA03 | glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 31.97 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|-----|----|
| 55628 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA | inf 1x100ml | IMA | SK |
|-------|--------------------------|-------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 51.26 | B05BA03 | glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 18.18 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

55630 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x250ml IMA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 51.27 | B05BA03 | glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 8.26 | O |
|-------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|------|---|
| 51.28 | B05BA03 | sorbitol (koncentrace do 5% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 7.66 | H |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.29 | B05BA03 | sorbitol (koncentrace nad 10%) | parent. | 100.00 | ML | 11.10 | H |
|-------|---------|--------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|
| 51.30 | B05BA03 | sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 8.14 | H |
|-------|---------|---|---------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.31 | B05BA03 | xylitol (koncentrace do 5% včetně) | parent. | 100.00 | ML | 16.62 | H |
|-------|---------|------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.32 | B05BA03 | xylitol (koncentrace nad 5%) | parent. | 100.00 | ML | 22.83 | H |
|-------|---------|------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.33 | B05BA10 | kombinace bez obsahu aminokyselin | parent. | 100.00 | ML | 13.20 | H |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 51.34 | B05BA10 | kombinace s obsahem aminokyselin | parent. | 100.00 | ML | 55.76 | H |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--------|----|-------|---|

02452 NUTRIFLEX SPECIAL inf 5x1000ml BMB CH

02453 NUTRIFLEX SPECIAL inf 5x1500ml BMB CH

02454 NUTRIFLEX PERI inf 5x1000ml BMB CH

02455 NUTRIFLEX PERI inf 5x2000ml BMB CH

02458 NUTRIFLEX PLUS inf 5x1000ml BMB CH

02459 NUTRIFLEX PLUS inf 5x2000ml BMB CH

02460 NUTRIFLEX BASAL inf 5x1000ml BMB CH

02461 NUTRIFLEX BASAL inf 5x2000ml BMB CH

32599 OLICLINOMEL N4-550E inf eml 4x2000ml BXI B

32782 NEONUTRIMIX P inf sol (1.5+0.5)lt IHO CZ

40178 AMINOPLASMAL 10% E inf 1x1000ml BME D

42557 OLICLINOMEL N5-800E inf eml 6x1000ml BXI B

42603 OLICLINOMEL N6-900E inf eml 4x2000ml BXI B

46235 NEONUTRIMIX C inf sol (1+0.875)lt IHO CZ

95637 NUTRIFLEX LIPID PLUS inf eml 5x1875ml BMM D

95638 NUTRIFLEX LIPID PLUS inf eml 5x2500ml BMM D

95640 NUTRIFLEX LIPID PERI inf eml 5x1875ml BMM D

95641 NUTRIFLEX LIPID PERI inf eml 5x2500ml BMM D

98053 OLICLINOMEL N4-550E inf eml 4x2000ml CTT F

98055 OLICLINOMEL N5-800E inf eml 6x1000ml CTT F

98086 OLICLINOMEL N6-900E inf eml 4x2000ml CTT F

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 52 | intravenozní roztoky fyziologického roztoku | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 52.1 | B05BB | roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů | parent. | 100.00 | ML | 10.46 | H |
|------|-------|---|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|--------|----|------|---|
| 52.2 | B05BB01 | elektrolyty | parent. | 100.00 | ML | 8.07 | H |
|------|---------|-------------|---------|--------|----|------|---|

05860 INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 inf 1x3000ml(vak) INK CZ

05869 INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 inf 1x5000ml(vak) INK CZ

05870 INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1 inf 1x5000ml(vak) INK CZ

11222 RINGER'S INJECTION FRESENIUS inf 1x1000ml-vak FKI I

11305 RINGER'S INJECTION FRESENIUS inf 10x1000ml-vak FKI I

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 11323 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x500ml-sklo | FKI | I |
| 11328 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x1000ml-sklo | FKI | I |
| 11376 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 12x500ml-sklo | FKI | I |
| 11380 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 12x1000ml-sklo | FKI | I |
| 18304 | RINGERFUNDIN B.BRAUN | inf sol 10x500ml pe | BMM | D |
| 18305 | RINGERFUNDIN B.BRAUN | inf sol10x1000ml pe | BMM | D |
| 21291 | INFUSIO DARROWI INFUSIA | inf 1x1000ml-vak | IHO | CZ |
| 21329 | INFUSIO HARTMANNI INFUSIA | inf 1x1000ml-vak | IHO | CZ |
| 44100 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 1x500ml-plast | BMM | D |
| 44101 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 1x1000ml-plast | BMM | D |
| 44102 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 10x500ml-plast | BMM | D |
| 44103 | HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP | inf 10x1000ml-plast | BMM | D |
| 49995 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol10x1000ml | FRE | D |
| 49996 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 10x1000 ml | FRE | D |
| 55616 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 55617 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 59357 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x500ml(Idpe) | BMM | D |
| 59358 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x1000ml(Idpe) | BMM | D |
| 59361 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x500ml(Idpe) | BME | E |
| 59362 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x1000ml(Idpe) | BME | E |
| 59365 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x500ml(Idpe) | BME | CH |
| 59366 | RINGERUV ROZTOK BRAUN | inf 10x1000ml(Idpe) | BME | CH |
| 59374 | RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 66833 | PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL. | inf 1x1000ml | BXF | GB |
| 69235 | RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 70524 | INFUSIO HARTMANNI MEDICAM.H1/1 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 70527 | INFUSIO DARROWI MEDICAMEN.D1/1 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 70529 | INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAR1/1 | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 70530 | INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 72793 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |
| 83946 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x500ml(vak) | INK | CZ |
| 85578 | INFUSIO RINGERI IMUNA | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 85887 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 89861 | INFUSIO RINGERI INFUSIA | inf 1x500ml-sklo | IHO | CZ |
| 89864 | INFUSIO RINGERI INFUSIA | inf 1x1000ml-vak | IHO | CZ |
| 92580 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 92581 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 92775 | INFUSIO DARROWI MEDIEKOS D1/1 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 92777 | INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1 | inf 1x1000ml(vak) | INK | CZ |
| 92778 | INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 92801 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x1000ml(vak) | INK | CZ |
| 92802 | INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1 | inf 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 93527 | ARDEAELYTOSOL R 1/1 | inf 1x500ml | ARD | CZ |
| 95569 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x1000ml-pe | FKI | I |
| 95571 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 12x1000ml-pe | FKI | I |
| 95579 | RINGER'S INJECTION FRESENIUS | inf 1x1000ml-f | FKI | I |
| 95758 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 6x1000ml | FRF | F |
| 95782 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol20x500ml | FRE | D |
| 95787 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol1x1000ml | FRE | D |
| 95788 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol1x1000ml | FRE | D |
| 95789 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FRE | D |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------|-----|----|
| 95790 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FRE | D |
| 95791 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol1x1000ml | FRF | F |
| 95792 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FRF | F |
| 95793 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 1x1000ml | FKI | I |
| 95794 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 6x1000ml | FKI | I |
| 95795 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol10x1000ml | FRF | F |
| 95796 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol10x1000ml | FRE | D |
| 95797 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol10x1000ml | FRE | D |
| 95798 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | inf sol 8x1000ml | FRE | D |
| 95799 | HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS | infsol8x1000ml | FRE | D |
| 97014 | INFUSIO HARTMANNI BP-HUMAN | inf 1x500ml | HUA | H |
| 97015 | RINGER INFUSION-HUMAN | inf 1x500ml | HUA | H |
| 99168 | INFUSIO HARTMANNI IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |

| | | | | | | |
|------|---------|--|--------|----|-------|---|
| 52.3 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně parent.) | 100.00 | ML | 39.65 | O |
|------|---------|--|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|----|
| 46068 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol20x10ml-plamp | BMR | E |
| 46078 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol20x10ml-plamp | BME | CH |
| 96886 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol20x10ml-plamp | BMM | D |

| | | | | | | |
|------|---------|--|--------|----|-------|---|
| 52.4 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně) | 100.00 | ML | 21.08 | O |
|------|---------|--|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 46065 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | inf sol 1x100ml-sk | BMR | E |
| 46069 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol20x20ml-plamp | BMR | E |
| 46075 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | inf sol1x100ml-skl | BME | CH |
| 46079 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol20x20ml-plamp | BME | CH |
| 50973 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN | inf sol1x100mlpelah | BMR | E |
| 51246 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN | infsol1x100ml-pelah | BME | CH |
| 51365 | CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN | infsol1x100ml-pelah | BMM | D |
| 57681 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x100ml(vak ii) | BFH | E |
| 96882 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | inf sol 1x100ml-sk | BMM | D |
| 96887 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol20x20mlpl.amp | BMM | D |
| 97748 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x100ml(sklo) | BFF | I |
| 97751 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x100ml(vak ii) | BFF | I |
| 98864 | FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO | inf sol 50x100ml | BFH | E |

| | | | | | | |
|------|---------|--|--------|----|------|---|
| 52.5 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně) | 100.00 | ML | 7.40 | O |
|------|---------|--|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 46070 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x250ml-pelah | BMR | E |
| 46080 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x250ml-pelah | BME | CH |
| 57683 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(vak ii) | BFH | E |
| 97682 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x250ml-pelah | BMM | D |
| 97749 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |
| 97752 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x250ml(vak ii) | BFF | I |
| 98872 | FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO | inf sol 30x250ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|------|---|
| 52.6 | B05BB01 | chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení) | parent. | 100.00 | ML | 3.77 | O |
|------|---------|--|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 03122 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak i) | BFH | E |
| 03124 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1500ml(vak i) | BFF | I |
| 03126 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak i) | BFH | E |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----|----|
| 03127 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak i) | BFF | I |
| 31487 | 0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS | inf sol1x1000ml-skl | FKI | I |
| 31490 | 0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS | inf sol 1x1000ml-pp | FKI | I |
| 31500 | 0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS | inf sol1x2000ml-vak | FKI | I |
| 31501 | 0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS | inf sol4x2000ml-vak | FKI | I |
| 46067 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x1000mlpelah | BMR | E |
| 46077 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x1000mlpelah | BME | CH |
| 57672 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1500ml(vak ii) | BFH | E |
| 57673 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak ii) | BFH | E |
| 57685 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x500ml(vak ii) | BFH | E |
| 57687 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak ii) | BFH | E |
| 69180 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1500ml(vak ii) | BFF | I |
| 69181 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x2000ml(vak ii) | BFF | I |
| 75611 | 0.9% SODIUM CHLOR.I.V.BP BAXTER | inf 1x1000ml(vak) | BXF | GB |
| 92585 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |
| 96885 | CHLORID SODNY 0.9% BRAUN | infsol1x1000mlpelah | BMM | D |
| 97753 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x500ml(vak ii) | BFF | I |
| 97754 | SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF | inf 1x1000ml(vak ii) | BFF | I |
| 98880 | FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLO | inf sol 10x1000ml | BFH | E |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|---------|--------|----|------|---|
| 52.7 | B05BB02 | elektrolyty se sacharidy | parent. | 100.00 | ML | 9.04 | H |
|------|---------|--------------------------|---------|--------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 56702 | INFUSIO F 1/2 INFUSIA | inf 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 56706 | INFUSIO R 1/2 INFUSIA | inf 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 62369 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |
| 69660 | ARDEAEPLYTOSOL F 1/2 | inf 1x500ml | ARD | CZ |
| 71732 | INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 71733 | INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 85566 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x1000ml(vak) | IMA | SK |
| 92624 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x2000ml(vak) | IMA | SK |
| 92625 | INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNA | inf 1x3000ml(vak) | IMA | SK |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---|
| 52.8 | B05BB03 | trometamol | parent. | 100.00 | ML | 23.02 | H |
|------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.9 | B05BC01 | mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 19.31 | H |
|------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|-----|----|
| 46026 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 74983 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 80494 | INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM | inf sol 1x250ml | MVM | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.10 | B05BC01 | mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 12.17 | H |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|----|
| 46027 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 71727 | INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 74984 | MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 75517 | INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA | inf 1x500ml(sklo) | IMA | SK |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.11 | B05BC01 | mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně) | parent. | 100.00 | ML | 21.70 | H |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|---|
| 21383 | MANITOL 20% VIAFLO | inf sol 30x250ml | BFH | E |
| 31475 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 1x250ml-sklo | FKI | I |
| 31476 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 16x250ml-sklo | FKI | I |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----|----|
| 59741 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 59742 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 80497 | INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM | inf sol 1x250ml | MVM | CZ |
| 97745 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 52.12 | B05BC01 | mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení) | parent. | 100.00 | ML | 13.78 | H |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----|----|
| 31477 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 1x500ml-sklo | FKI | I |
| 31478 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 12x500ml-sklo | FKI | I |
| 31479 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 1x1000ml-sklo | FKI | I |
| 31480 | 20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS | inf 6x1000ml-sklo | FKI | I |
| 46025 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 59743 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 71728 | INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM | inf sol 1x500ml | MVM | CZ |
| 97746 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 97747 | MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|
| 52.13 | B05BC02 | karbamid | parent. | 90.00 | GM | 1 133.11 | H |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 53 | ostatní intravenezní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|----------|----|-------|---|
| 53.1 | B05CB01 | chlorid sodný | lok. | 1 000.00 | ML | 37.29 | H |
|------|---------|---------------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|----------|----|-------|---|
| 53.2 | B05CX02 | sorbitol | lok. | 1 000.00 | ML | 37.29 | H |
|------|---------|----------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------|------|----------|----|-------|---|
| 53.3 | B05CX03 | glycin | lok. | 1 000.00 | ML | 54.04 | H |
|------|---------|--------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------|------|----------|----|-------|---|
| 53.4 | B05CX10 | kombinované roztoky k irrigaci | lok. | 1 000.00 | ML | 54.04 | H |
|------|---------|--------------------------------|------|----------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------------------|---------|----------|----|--------|---|
| 53.5 | B05DA | přípravky pro peritoneální dialýzu | parent. | 1 000.00 | ML | 138.04 | H |
|------|-------|------------------------------------|---------|----------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------------------|---------|----------|----|--------|---|
| 53.6 | B05DB | přípravky pro peritoneální dialýzu | parent. | 1 000.00 | ML | 138.04 | H |
|------|-------|------------------------------------|---------|----------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|---|
| 01184 | GAMBROSOL TRIO 10 | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 01186 | GAMBROSOL TRIO 10 | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 01215 | GAMBROSOL TRIO 40 | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 01218 | GAMBROSOL TRIO 40 | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 14856 | BALANCE 4.25%GLU.,1.75MMOL/L CA | dlpprnsol4x2500mlst | FMC | D |
| 14858 | BALANCE 4.25%GLU.,1.75MMOL/L CA | dlpprnsol4x3000mlsl | FMC | D |
| 14861 | BALANCE 2.3%GL.,1.75MMOL/L CA | dlpprnsol4x2500mlst | FMC | D |
| 14863 | BALANCE 2.3%GL.,1.75MMOL/L CA | dlpprnsol4x3000mlsl | FMC | D |
| 14866 | BALANCE 1.5%GL.,1.75MMOL/L CA | dlpprnsol4x2500mlst | FMC | D |
| 14868 | BALANCE 1.5%GL.,1.75MMOL/L CA | dlpprnsol4x3000mlsl | FMC | D |
| 15037 | BALANCE 1.5%GL.,1.25MMOL/L CA | sol 4x3000ml(sleep) | FMC | D |
| 15042 | BALANCE 4.25%GL.,1.25MMOL/L CA | sol 4x3000ml(sleep) | FMC | D |
| 15047 | BALANCE 2.3%GL.,1.25MMOL/L CA | sol 4x3000ml(sleep) | FMC | D |
| 15256 | CAPD/DPCA 18 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 15257 | CAPD/DPCA 18 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 15259 | CAPD/DPCA 18 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 15261 | CAPD/DPCA 19 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 15262 | CAPD/DPCA 19 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 15264 | CAPD/DPCA 19 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 15266 | CAPD/DPCA 17 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 15267 | CAPD/DPCA 17 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 15269 | CAPD/DPCA 17 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 19229 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | dlpprnsol5x2000ml-1 | BXI | IRL |
| 19231 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | dlpprnsol5x2000ml-1 | BXI | IRL |
| 19236 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | dlpprnsol4x2500ml-2 | BXI | IRL |
| 19238 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | dlpprnsol4x2500ml-2 | BXI | IRL |
| 19240 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | dlpprnsol4x2500ml-2 | BXI | IRL |
| 19247 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | dlpprnsol2x5000ml-1 | BXI | IRL |
| 19249 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | dlpprnsol2x5000ml-1 | BXI | IRL |
| 19251 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | dlpprnsol2x5000ml-1 | BXI | IRL |
| 19271 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | dlpprnsol5x2000ml-1 | BXI | IRL |
| 19273 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | dlpprnsol5x2000ml-1 | BXI | IRL |
| 19278 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | dlpprnsol4x2500ml-2 | BXI | IRL |
| 19280 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | dlpprnsol4x2500ml-2 | BXI | IRL |
| 19282 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | dlpprnsol4x2500ml-2 | BXI | IRL |
| 19289 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | dlpprnsol2x5000ml-1 | BXI | IRL |
| 19291 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | dlpprnsol2x5000ml-1 | BXI | IRL |
| 19293 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | dlpprnsol2x5000ml-1 | BXI | IRL |
| 21574 | CAPD/DPCA 2 | sol 6x1500ml-stay | FMC | D |
| 21577 | CAPD/DPCA 3 | sol 6x1500ml-stay | FMC | D |
| 21582 | CAPD/DPCA 4 | sol 6x1500ml-stay | FMC | D |
| 30828 | CAPD/DPCA 2 BALANCE | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 30848 | CAPD/DPCA 3 BALANCE | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 30852 | CAPD/DPCA 4 BALANCE | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 31627 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27% | dlpprnsol4x2.5lt1kl | BXI | IRL |
| 31675 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3.86% | dlpprnsol4x2.5lt1kl | BXI | IRL |
| 31724 | PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1.36% | dlpprnsol4x2.5lt1kl | BXI | IRL |
| 45632 | GAMBROSOL 10 H | sol 6x1500ml(sy10) | BJS | I |
| 45638 | GAMBROSOL 10 H | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 45640 | GAMBROSOL 10 H | sol 2x4500ml(sy10) | BJS | I |
| 45645 | GAMBROSOL 10 H | sol 4x2500ml(ge10) | BJS | I |
| 45668 | GAMBROSOL 10 M | sol 6x1500ml(sy10) | BJS | I |
| 45672 | GAMBROSOL 10 M | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 45674 | GAMBROSOL 10 M | sol 2x4500ml(sy10) | BJS | I |
| 45677 | GAMBROSOL 10 M | sol 4x2500ml(ge10) | BJS | I |
| 45700 | GAMBROSOL 10 L | sol 6x1500ml(sy10) | BJS | I |
| 45704 | GAMBROSOL 10 L | sol 4x2500ml(sy10) | BJS | I |
| 45706 | GAMBROSOL 10 L | sol 2x4500ml(sy10) | BJS | I |
| 45711 | GAMBROSOL 10 L | sol 4x2500ml(ge10) | BJS | I |
| 46906 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46907 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46909 | DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46914 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46916 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46918 | DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46924 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 46925 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 46927 | DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 47900 | CAPD/DPCA 19 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 47908 | CAPD/DPCA 18 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 47941 | CAPD/DPCA 17 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 59059 | NUTRINEAL PD4 WITH 1.1%AMINOAC. | dlp prn sol4x2500ml | BXI | IRL |
| 65936 | GAMBROSOL 10 M | sol 3x3000ml(ge10) | BJS | I |
| 65937 | GAMBROSOL 10 M | sol 5x2000ml(ge10) | BJS | I |
| 65946 | GAMBROSOL 10 M | sol 3x3000ml(sy10) | BJS | I |
| 65949 | GAMBROSOL 10 M | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I |
| 65950 | GAMBROSOL 10 M | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 65956 | GAMBROSOL 10 L | sol 3x3000ml(sy10) | BJS | I |
| 65959 | GAMBROSOL 10 L | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 65962 | GAMBROSOL 10 L | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I |
| 65963 | GAMBROSOL 10 L | sol 5x2000ml(ge10) | BJS | I |
| 65967 | GAMBROSOL 10 L | sol 3x3000ml(ge10) | BJS | I |
| 68321 | GAMBROSOL 10 H | sol 3x3000ml(sy10) | BJS | I |
| 68460 | GAMBROSOL 10 H | sol 5x2000ml(sy10) | BJS | I |
| 68515 | GAMBROSOL 10 H | sol 2x5000ml(sy10) | BJS | I |
| 69304 | GAMBROSOL 10 H | sol 5x2000ml(ge10) | BJS | I |
| 69318 | GAMBROSOL 10 H | sol 3x3000ml(ge10) | BJS | I |
| 76613 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76614 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 76616 | DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76622 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76623 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 76625 | DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76631 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2000ml(vak) | BXI | IRL |
| 76632 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x2500ml(vak) | BXI | IRL |
| 76634 | DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML | sol 1x5000ml(vak) | BXI | IRL |
| 81204 | CAPD/DPCA 2 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 81337 | CAPD/DPCA 4 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 95424 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 95425 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 95427 | CAPD/DPCA 2 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95432 | CAPD/DPCA 3 | sol 2x5000ml-stand | FMC | D |
| 95433 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2000ml-stand | FMC | D |
| 95435 | CAPD/DPCA 3 | sol 6x1500ml-stand | FMC | D |
| 95442 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2000ml-andy | FMC | D |
| 95443 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2500ml-andy | FMC | D |
| 95489 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 95490 | CAPD/DPCA 3 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 95492 | CAPD/DPCA 3 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 95497 | CAPD/DPCA 4 | sol 2x5000ml-stand | FMC | D |
| 95498 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2000ml-stand | FMC | D |
| 95499 | CAPD/DPCA 4 | sol 6x1500ml-stand | FMC | D |
| 95506 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2000ml-andy | FMC | D |
| 95507 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2500ml-andy | FMC | D |
| 95514 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2000ml-stay | FMC | D |
| 95515 | CAPD/DPCA 4 | sol 4x2500ml-stay | FMC | D |
| 95517 | CAPD/DPCA 4 | sol 2x5000ml-sleep | FMC | D |
| 96072 | CAPD/DPCA 3 BALANCE | sol 4x3000ml-sleep | FMC | D |
| 97356 | CAPD/DPCA 2 | sol 2x5000ml-stand | FMC | D |
| 97357 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2000ml-stand | FMC | D |
| 97359 | CAPD/DPCA 2 | sol 6x1500ml-stand | FMC | D |

| | | | | |
|-------|-------------|-------------------|-----|---|
| 97366 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2000ml-andy | FMC | D |
| 97367 | CAPD/DPCA 2 | sol 4x2500ml-andy | FMC | D |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 54 | aditiva k intravenezním roztokům | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--------|----|--------|---|
| 54.1 | B05XA01 | chlorid draselný (koncentrace 7,45%) | parent. | 100.00 | ML | 17.40 | H |
| 54.2 | B05XA02 | hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | ML | 124.74 | O |
| 54.3 | B05XA02 | hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | ML | 10.65 | O |
| 54.4 | B05XA03 | chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně) | parent | 100.00 | ML | 20.30 | H |

44171 CHLORID SODNY 5.85% BRAUN inf 1x100ml BME D

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 54.5 | B05XA03 | chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%) | parent. | 100.00 | ML | 18.55 | H |
| 54.6 | B05XA04 | chlorid amonný | parent. | 100.00 | ML | 11.68 | H |
| 54.7 | B05XA06 | fosforečnan draselný, vč. kombinací | parent. | 100.00 | ML | 52.35 | H |
| 54.8 | B05XA30 | kombinace elektrolytů (stopové prvky) | parent. | 10.00 | ML | 12.46 | H |

10285 UNIEL INFUSIA inf sol 100ml IHO CZ B05XA30

10286 UNIEL INFUSIA inf sol 250ml IHO CZ B05XA30

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|--------|---|
| 54.9 | B05XA31 | elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy | parent. | 100.00 | ML | 33.26 | H |
| 54.10 | B05XB01 | chlorid argininu (koncentrace 21%) | parent. | 100.00 | ML | 233.08 | H |
| 54.11 | B05XB02 | alanylglutamin | parent. | 1.00 | ML | 4.39 | H |
| 54.12 | B05XC | vitamíny | parent. | 1.00 | DF | 43.99 | H |
| 54.13 | B05XX | ostatní i.v. roztoky | parent. | 100.00 | ML | 7.63 | H |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------------|------|----------|----|--------|---|
| 55.1 | B05Z | hemodialytika a hemofiltráty | lok. | 1 000.00 | ML | 94.50 | H |
| 55.2 | B05ZA | hemodialytika, koncentráty | lok. | 1 000.00 | ML | 125.72 | H |
| 55.3 | B05ZB | hemofiltráty | lok. | 1 000.00 | ML | 94.50 | H |

89174 SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 sol 1x5000ml BFF I B05ZB

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------|------|------|----|------|--|
| 56 | srdeční glykosidy | | | | | | |
| 56.1 | C01AA02 | acetyldigoxin | p.o. | 0.50 | MG | 1.03 | |
| 56.2 | C01AA04 | digitoxin | p.o. | 0.10 | MG | 1.03 | |
| 56.3 | C01AA05 | digoxin | p.o. | 0.25 | MG | 1.27 | |

03542 DIGOXIN 0.250 LÉČIVA tbl 30x0.25mg ZEH CZ C01AA05
18000 DIGOXIN-GALENA porgttsol1x10ml/5mg IVX CZ C01AA05

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|------|----|-------|--|
| 56.4 | C01AA05 | digoxin | parent. | 0.25 | MG | 7.32 | |
| 56.5 | C01AA08 | metildigoxin | p.o. | 0.20 | MG | 1.03 | |
| 56.6 | C01AA08 | metildigoxin | parent. | 0.20 | MG | 6.99 | |
| 56.7 | C01AC01 | g-strofantin | parent. | 0.25 | MG | 23.46 | |

| | |
|----|--|
| 57 | antiarytmika třída I a III, perorální podání |
|----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 57.1 | C01BA | detajmii bitartras | p.o. | 75.00 | MG | 13.64 | |
| 57.2 | C01BA01 | chinidin (neretardované lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 10.80 | |
| 57.3 | C01BA01 | chinidin (retardované lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 17.40 | |
| 57.4 | C01BA02 | prokainamid | p.o. | 3.00 | GM | 38.61 | |
| 57.5 | C01BA03 | disopyramid | p.o. | 0.40 | GM | 12.37 | |
| 57.6 | C01BA08 | prajmalin | p.o. | 30.00 | MG | 10.80 | |
| 57.7 | C01BB02 | mexiletin | p.o. | 0.80 | GM | 9.41 | |
| 57.8 | C01BB03 | tocainid | p.o. | 1.20 | GM | 10.22 | |
| 57.9 | C01BC03 | propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 17.16 | |
| 57.10 | C01BC03 | propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 5.40 | |
| 57.11 | C01BC03 | propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 6.40 | |

53535 PROPAFENON AL 150

tbl obd 50x150mg

APA D C01BC03

91276 PROLEKOFEN 150 MG

tbl obd 50x150mg

LEK SLO C01BC03

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 57.12 | C01BD01 | amiodaron | p.o. | 0.20 | GM | 4.00 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

17850 AMIOHEXAL 200

tbl 20x200mg

HPZ PL C01BD01

17851 AMIOHEXAL 200

tbl 50x200mg

HPZ PL C01BD01

17852 AMIOHEXAL 200

tbl 100x200mg

HPZ PL C01BD01

59284 AMIOHEXAL 200

tbl 20x200mg

SFS D C01BD01

59285 AMIOHEXAL 200

tbl 50x200mg

SFS D C01BD01

59286 AMIOHEXAL 200

tbl 100x200mg

SFS D C01BD01

59655 AMIOKORDIN

por tbl nob60x200mg

KRK SLO C01BD01

| | |
|----|--------------------------------------|
| 58 | antiarytmika, ostatní cesty aplikace |
|----|--------------------------------------|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---------------|
| 58.1 | C01B | ipratropium | parent. | 3.00 | MG | 782.94 | O |
| 58.2 | C01BA02 | prokainamid | parent. | 3.00 | GM | 251.87 | O |
| 58.3 | C01BA03 | disopyramid | parent. | 0.40 | GM | 251.87 | O |
| 58.4 | C01BA05 | ajmalin | parent. | 0.30 | GM | 251.87 | O |
| 58.5 | C01BB01 | lidokain | parent. | 1.00 | ML | 1.22 | O/INT,KAR,GER |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---------------|
| 58.6 | C01BB02 | mexiletin | parent. | 0.80 | GM | 351.64 | O/INT,KAR,GER |
| 58.7 | C01BB03 | tocainid | parent. | 1.20 | GM | 351.64 | O/INT,KAR,GER |
| 58.8 | C01BC03 | propafenon | parent. | 0.30 | GM | 174.00 | O/INT,KAR,GER |
| 58.9 | C01BC07 | lorcainid | parent. | 0.20 | GM | 139.01 | O/INT,KAR,GER |
| 58.10 | C01BD01 | amiodaron | parent. | 0.20 | GM | 18.58 | O/INT,KAR,GER |

96600 SEDACORON inj sol 5x3ml/150mg EBP A

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|--------|----|--------|---------------|
| 58.11 | C01BD02 | bretylum tosilát | parent. | 100.00 | MG | 139.01 | O/INT,KAR,GER |
|-------|---------|------------------|---------|--------|----|--------|---------------|

59 adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|--------|----|-----------|---|
| 59.1 | C01CA | ipratropium | p.o. | 30.00 | MG | 53.77 | |
| 59.2 | C01CA02 | isoprenalin | parent. | 90.00 | MG | 15 620.16 | H |
| 59.3 | C01CA03 | norepinefrin | parent. | 6.00 | MG | 80.34 | O |
| 59.4 | C01CA04 | dopamin | parent. | 0.50 | GM | 114.50 | O |
| 59.5 | C01CA05 | norfenefrin | parent. | 25.00 | MG | 23.76 | H |
| 59.6 | C01CA07 | dobutamin | parent. | 0.50 | GM | 324.00 | H |
| 59.7 | C01CA09 | metaraminol | parent. | 50.00 | MG | 191.26 | H |
| 59.8 | C01CA10 | metoxamin | parent. | 30.00 | MG | 40.91 | H |
| 59.9 | C01CA11 | mepentermin | parent. | 30.00 | MG | 101.67 | H |
| 59.10 | C01CA14 | dopexamin | parent. | 500.00 | MG | 109.39 | H |
| 59.11 | C01CA17 | midodrin | parent. | 7.50 | MG | 83.44 | H |
| 59.12 | C01CA24 | epinefrin | parent. | 0.50 | MG | 4.75 | O |

00362 ADRENALIN LÉČIVA inj 5x1ml/1mg ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|---|
| 59.13 | C01CA24 | epinefrin (lékové formy autoinjektoru) | parent. | 1.00 | DF | 1 300.00 | P |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|---|

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog, klinický imunolog a pediatr u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyzí bodnutí.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|----------|---|
| 59.14 | C01CE01 | amrinon | parent. | 0.50 | GM | 4 059.95 | H |
| 59.15 | C01CE02 | milrinon | parent. | 50.00 | MG | 3 980.00 | H |

60 vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.1 | C01DA02 | glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě p.o. včetně, lékové formy tablet) | p.o. | 5.00 | MG | 2.00 | |
| 60.2 | C01DA02 | glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě p.o. včetně, lékové formy tobolek s peletami) | p.o. | 5.00 | MG | 3.00 | |

13467 NITROPELET 2.5 por cps pro30x2.5mg ZEH SK

13468 NITROPELET 2.5

por cps pro 30x2.5mg

ZEH SK

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.3 | C01DA02 | glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 5.00 | MG | 2.12 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.4 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 60.00 | MG | 3.50 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

47758 ISOPELET 20

por cps pro 30x20mg

ZEH SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.5 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy | p.o. | 60.00 | MG | 1.25 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.6 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy | p.o. | 60.00 | MG | 2.50 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

47762 ISOPELET 40

por cps pro 30x40mg

ZEH SK

47765 ISOPELET 60

por cps pro 20x60mg

ZEH SK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.7 | C01DA08 | isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě) | p.o. | 60.00 | MG | 4.20 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

21453 CARDIKET RETARD 120

por cps pro 30x120mg

SWP D

91591 CARDIKET RETARD 120

cps ret 20x120mg

SWP D

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|-----------------|------|-------|----|------|--|
| 60.8 | C01DA14 | isosorbid mononitrát do 20 mg včetně | v jedné tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 2.44 | |
|------|---------|--------------------------------------|-----------------|------|-------|----|------|--|

20159 MONOTAB 20

por tbl nob 20x20mg

ZEH SK

23305 MONOSAN 20 MG

por tbl nob 100x20mg

PMP CZ

47686 ISMIN AL 20

por tbl nob 60x20mg

APA D

47687 ISMIN AL 20

por tbl nob 100x20mg

APA D

61467 ISMIN AL 20

por tbl nob 100x20mg

APA D

76401 SORBIMON 20 MG

tbl 50x20mg

MCK D

76402 SORBIMON 20 MG

tbl 100x20mg

MCK D

96187 MONOSAN 20 MG

por tbl nob 50x20mg

PMP CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 60.9 | C01DA14 | isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě | p.o. | 40.00 | MG | 1.77 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

20301 MONOTAB 40

por tbl nob 20x40mg

ZEH SK

21793 MONOTAB SR

por tbl pro 20x100mg

ZEH SK

21794 MONOTAB SR

por tbl pro 50x100mg

ZEH SK

21795 MONOTAB SR

por tbl pro 100x100mg

ZEH SK

23306 MONOSAN 40 MG

por tbl nob 100x40mg

PMP CZ

47690 ISMIN AL 40

por tbl nob 100x40mg

APA D

76403 SORBIMON 40 MG

tbl 20x40mg

MCK D

76404 SORBIMON 40 MG

tbl 50x40mg

MCK D

76405 SORBIMON 40 MG

tbl 100x40mg

MCK D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 60.10 | C01DX03 | oxifedrin | p.o. | 40.00 | MG | 4.79 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 60.11 | C01DX12 | molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 6.00 | MG | 4.25 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

49553 MOLSIHEXAL 2 MG

tbl 100x2mg

SFS D

88173 DEPRAZOLIN

tbl 30x2mg

ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|--------|----|----------|----------------|
| 63.10 | C02CA06 | urapidil | p.o. | 50.00 | MG | 6.89 | |
| 63.11 | C02DB01 | dihydralazin | p.o. | 75.00 | MG | 2.00 | |
| 63.12 | C02DB03 | endralazin | p.o. | 10.00 | MG | 9.43 | |
| 63.13 | C02DC01 | minoxidil | p.o. | 20.00 | MG | 20.14 | L/INT,KAR, GER |
| 63.14 | C02LA51 | reserpin a diureтика | p.o. | 1.00 | DF | 1.63 | |
| 63.15 | C02LB01 | methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | DF | 4.94 | |
| 63.16 | C02LB01 | methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 2.00 | DF | 3.42 | |
| 63.17 | C02KX01 | bosentan | p.o. | 250.00 | MG | 3 278.00 | X |

64 antihypertenziva, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|--------|-----|--------|---|
| 64.1 | C02AC01 | klonidin | parent. | 0.45 | MG | 70.66 | H |
| 64.2 | C02CA06 | urapidil | parent. | 50.00 | MG | 217.84 | O |
| 90763 | EBRANTIL I.V. 25 | | inj sol 5x5ml/25mg | | AKZ | D | |
| 90765 | EBRANTIL I.V. 50 | | inj sol 5x10ml/50mg | | AKZ | D | |
| 64.3 | C02DA01 | diazoxid | parent. | 300.00 | MG | 214.62 | H |
| 64.4 | C02DB01 | dihydralazin | parent. | 25.00 | MG | 29.88 | H |
| 64.5 | C02DD01 | nitroprusid sodný | parent. | 50.00 | MG | 263.31 | H |

65 diureтика s nižším diuretickým účinkem

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|------|-------|----|------|--|
| 65.1 | C03AA03 | hydrochlorothiazid | p.o. | 25.00 | MG | 0.94 | |
| 65.2 | C03B | cikletanin | p.o. | 50.00 | MG | 1.03 | |
| 65.3 | C03BA | metipamid | p.o. | 2.50 | MG | 1.03 | |
| 65.4 | C03BA04 | chlortalidon | p.o. | 25.00 | MG | 0.61 | |
| 65.5 | C03BA10 | xipamid | p.o. | 20.00 | MG | 1.03 | |
| 65.6 | C03BA11 | indapamid | p.o. | 2.50 | MG | 1.12 | |

46635 INDAPAMID HF

tbl obd 30x2.5mg

HMF YU

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 65.7 | C03BA11 | indapamid s řízeným uvolňováním | p.o. | 1.50 | MG | 1.12 | |
|------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

66 diureтика s vysokým účinkem, perorální podání

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 66.1 | C03CA01 | furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě) | p.o. | 40.00 | MG | 0.86 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

02079 FUROSEMID-SLOVAKOFARMA

tbl 20x40mg

ZEH SK

| | | | | |
|-------|----------------------|---------------------|-----|-----|
| 15332 | APO-FUROSEMIDE 80 MG | tbl 100x80mg | CMG | IRL |
| 15335 | APO-FUROSEMIDE 40 MG | tbl 100x40mg | CMG | IRL |
| 56347 | APO-FUROSEMIDE 40MG | tbl 100x40mg | APT | CND |
| 56804 | FURORESE 40 | tbl 50x40mg | SFS | D |
| 56805 | FURORESE 40 | tbl 100x40mg | SFS | D |
| 96738 | APO-FUROSEMIDE 80MG | tbl 100x80mg | APT | CND |
| 98219 | FURON 40 MG | por tbl nob 50x40mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 66.2 | C03CA01 | furosemid (125 mg a více v jedné tabletě) | p.o. | 40.00 | MG | 0.68 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|-----|----|
| 17854 | FURORESE 125 | por tbl nob30x125mg | HPZ | PL |
| 17855 | FURORESE 125 | por tbl nob50x125mg | HPZ | PL |
| 17856 | FURORESE 125 | por tblobnob100x125mg | HPZ | PL |
| 56807 | FURORESE 125 | tbl 30x125mg | SFS | D |
| 56808 | FURORESE 125 | tbl 50x125mg | SFS | D |
| 56810 | FURORESE 250 | por tbl nob20x250mg | SFS | D |
| 56811 | FURORESE 250 | por tbl nob50x250mg | SFS | D |
| 56812 | FURORESE 250 | por tblobnob100x250mg | SFS | D |
| 56814 | FURORESE 500 | tbl 50x500mg | SFS | D |
| 56815 | FURORESE 500 | tbl 100x500mg | SFS | D |
| 68632 | FURORESE 500 | tbl 20x500mg | SFS | D |
| 81498 | FUROSEMID AL 500 | por tbl nob50x500mg | APA | D |
| 81499 | FUROSEMID AL 500 | por tblobnob100x500mg | APA | D |
| 98937 | FURORESE 250 | por tbl nob10x250mg | SFS | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 66.3 | C03CA04 | torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 15.00 | MG | 0.88 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 66.4 | C03CA04 | torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 15.00 | MG | 0.68 | |
|------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 67 | diureтика s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|------|---------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 67.1 | C03C | kyselina etakrynová | parent. | 50.00 | MG | 543.63 | O |
|------|------|---------------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|----|------|---|
| 67.2 | C03CA01 | furosemid (125 mg a více v jedné ampuli) | parent. | 40.00 | MG | 7.36 | O |
|------|---------|--|---------|-------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|---|
| 56819 | FURORESE ROZTOK | inf 5x25ml/250mg | PHH | D |
| 56820 | FURORESE ROZTOK | inf 25x25ml/250mg | PHH | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 67.3 | C03CA01 | furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli) | parent. | 40.00 | MG | 15.04 | O |
|------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------|-----------------|-----|---|
| 56818 | FURORESE 20 INJEKT | inj 25x2ml/20mg | PHH | D |
|-------|--------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 67.4 | C03CA04 | torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | MG | 16.03 | O |
|------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|---------|-------|----|------|---|
| 67.5 | C03CA04 | torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | MG | 7.72 | O |
|------|---------|--------------------------------------|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 68 | diureтика šetrící draslík | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 68.1 | C03DA01 | spironolakton | p.o. | 75.00 | MG | 4.60 | |
|------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------|------|-------|----|------|--|
| 68.2 | C03DB01 | amilorid | p.o. | 10.00 | MG | 1.57 | |
|------|---------|----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------|------------|-----|----|
| 87662 | AMICLARAN | tbl 50x5mg | ZEH | SK |
|-------|-----------|------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|--------|----|------|--|
| 68.3 | C03DB02 | triamteren | p.o. | 100.00 | MG | 1.22 | |
|------|---------|------------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 69 | kombinace diuretik | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 69.1 | C03EA01 | hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky | p.o. | 0.50 | DF | 0.50 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------|----------------|-----|---|
| 47476 | LORADUR | por tbl nob 50 | MCK | D |
| 47478 | LORADUR MITE | por tbl nob 50 | MCK | D |
| 83717 | AMILORID/HCT AL | tbl 50 | APA | D |
| 83718 | AMILORID/HCT AL | tbl 100 | APA | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 69.2 | C03EA06 | chlorthalidon a kalium šetřící látky | p.o. | 1.00 | DF | 1.10 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 69.3 | C03EA14 | spironolakton/butizid | p.o. | 1.00 | DF | 9.78 | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 70 | periferní vazodilatancia, perorální podání | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 70.1 | C04AC01 | kyselina nikotinová | p.o. | 0.20 | GM | 0.44 | |
|------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 70.2 | C04AD02 | xantinol nikotinát | p.o. | 0.90 | GM | 3.87 | |
|------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 70.3 | C04AD03 | pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 3.87 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 70.4 | C04AD03 | pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 4.77 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 70.5 | C04AD03 | pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | GM | 5.40 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|
| 70.6 | C04AD04 | etophyllin nikotinát | p.o. | 0.30 | GM | 1.65 | |
|------|---------|----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 70.7 | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | p.o. | 3.00 | MG | 2.13 | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------|--------------------|-----|----|
| 91032 | SECATOXIN FORTE | por gtt sol 1x25ml | IXP | CZ |
|-------|-----------------|--------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 70.8 | C04AE02 | nicergolin | p.o. | 30.00 | MG | 8.50 | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|------------|---------------------|-----|----|
| 05742 | ERGOTOP 30 | por tbl flm 28x30mg | IVX | CZ |
|-------|------------|---------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|
| 70.9 | C04AE54 | dihydroergokristin, kombinace | p.o. | 2.00 | ML | 1.87 | |
|------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------|------|------|----|------|--|
| 70.10 | C04AX | jiná periferní vasodilatancia | p.o. | 3.00 | DF | 4.77 | |
|-------|-------|-------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|
| 70.11 | C04AX02 | fenoxybenzamin | p.o. | 30.00 | MG | 4.77 | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 70.12 | C04AX19 | sulkotidil | p.o. | 0.30 | GM | 4.77 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 70.13 | C04AX20 | buflomedil | p.o. | 0.60 | GM | 4.77 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 70.14 | C04AX21 | naftidofuryl | p.o. | 0.20 | GM | 4.25 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 71 | periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------|---------|------|----|-------|--|
| 71.1 | C04AC | olamin nikotinát | parent. | 0.90 | GM | 20.04 | |
|------|-------|------------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 71.2 | C04AB01 | fentolamin | parent. | 10.00 | MG | 20.82 | O |
|------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|
| 71.3 | C04AB02 | tolazolin | parent. | 75.00 | MG | 87.00 | O |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 71.4 | C04AD | etophyllin/theophyllin | parent. | 0.30 | GM | 11.11 | |
| 71.5 | C04AD02 | xantinol nikotinát | parent. | 0.90 | GM | 4.25 | |
| 71.6 | C04AD03 | pentoxifylin | parent. | 0.30 | GM | 25.33 | |

43709 TRENTAL inf 10x15ml/300mg HBS SK
 69241 PENTILIN INJEKCE 100MG/5ML inj 5x5ml/100mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 71.7 | C04AE01 | hydrogenované ergotové alkaloidy | parent. | 3.00 | MG | 69.21 | |
| 71.8 | C04AX | jiná periferní vasodilatancia | parent. | 2.00 | DF | 14.86 | |
| 71.9 | C04AX11 | bencyklan | parent. | 0.60 | GM | 51.52 | |
| 71.10 | C04AX21 | naftidrofuryl | parent. | 0.20 | GM | 53.95 | |

| | |
|----|------------------------------|
| 72 | vazoprotektiva a venofarmaka |
|----|------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|---------|------|----|-------|---|
| 72.1 | C05AD | přípravky obsahující lokální anestetikum (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.2 | C05AD | přípravky obsahující lokální anestetikum (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.81 | |
| 72.3 | C05AD01 | lidokain (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.4 | C05AD01 | lidokain (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.81 | |
| 72.5 | C05AD04 | cinchokain (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.6 | C05AD04 | cinchokain (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.84 | |
| 72.7 | C05AX02 | bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.8 | C05AX02 | bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.78 | |
| 72.9 | C05AX03 | jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků) | lok. | 1.00 | DF | 0.98 | |
| 72.10 | C05AX03 | jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.78 | |
| 72.11 | C05BA01 | organo-heparinoidy | lok. | 1.00 | GM | 0.87 | |
| 72.12 | C05BA03 | heparin k zevnímu použití | lok. | 1.00 | GM | 0.87 | |
| 86042 | HEPARIN AL MAST 30000 | ung 1x100gm | | APA | D | | |
| 86044 | HEPARIN AL GEL 30000 | gel 1x100gm | | APA | D | | |
| 72.13 | C05BA53 | heparin, kombinace k zevnímu použití | lok. | 1.00 | GM | 0.87 | |
| 72.14 | C05BB02 | polidokanol (do 0,5% včetně) | parent. | 1.00 | ML | 13.96 | O |
| 08510 | AETHOXYSKLEROL 0.5% | inj 5x2ml | | KRS | D | | |
| 08512 | AETHOXYSKLEROL 0.5% | inj 1x30ml | | KRS | D | | |
| 72.15 | C05BB02 | polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně) | parent. | 1.00 | ML | 16.06 | O |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|-------|----|-------|----------------|
| 20033 | AETHOXYSKLEROL 1% | inj 5x2ml | KRS | D | | | |
| 20034 | AETHOXYSKLEROL 1% | inj 1x30ml | KRS | D | | | |
| 72.16 | C05BB02 | polidokanol (nad 1% do 3 % včetně) | parent. | 1.00 | ML | 17.89 | O |
| 02529 | AETHOXYSKLEROL 3% | inj 5x2ml | KRS | D | | | |
| 08511 | AETHOXYSKLEROL 2% | inj 5x2ml | KRS | D | | | |
| 72.17 | C05BB02 | polidokanol (více než 3 %) | parent. | 1.00 | ML | 19.35 | O |
| 90799 | AETHOXYSKLEROL 4% | inj 5x2ml | KRS | D | | | |
| 72.18 | C05BB04 | natrium tetradeциl sulfat (koncentrace do 1% včetně) | parent. | 1.00 | ML | 13.96 | O |
| 72.19 | C05BB04 | natrium tetradeциl sulfat (koncentrace nad 1%) | parent. | 1.00 | ML | 19.64 | O |
| 72.20 | C05BX01 | dobesilat vápenatý | p.o. | 0.75 | GM | 4.05 | |
| 72.21 | C05CA04 | troxerutin | p.o. | 3.00 | DF | 4.05 | |
| 72.22 | C05CA51 | rutosidy (kombinace, pevné lékové formy) | p.o. | 3.00 | DF | 1.30 | |
| 72.23 | C05CA51 | rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | ML | 3.03 | |
| 72.24 | C05CA53 | diosmin, kombinace | p.o. | 2.00 | DF | 4.05 | |
| 72.25 | C05CA54 | troxerutin, kombinace | p.o. | 2.00 | DF | 4.05 | |
| 72.26 | C05CX | jiné kapiláry stabilizující látky (escin) | p.o. | 60.00 | MG | 4.05 | |
| 72.27 | C05CX | jiné kapiláry stabilizující látky (escin) | parent. | 5.00 | MG | 54.26 | H |
| 72.28 | C05CX01 | tribenosid | p.o. | 0.80 | GM | 4.05 | |
| 73 | neselektivní beta-blokátory, perorální podání | | | | | | |
| 73.1 | C07AA | metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.78 | |
| 73.2 | C07AA | metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.29 | |
| 73.3 | C07AA | metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 0.66 | |
| 73.4 | C07AA02 | oxprenolol | p.o. | 0.10 | GM | 2.74 | |
| 73.5 | C07AA03 | pindolol | p.o. | 15.00 | MG | 2.74 | |
| 73.6 | C07AA05 | propranolol | p.o. | 0.16 | GM | 2.74 | |
| 73.7 | C07AA07 | sotalol | p.o. | 0.16 | GM | 4.75 | L/KAR,INT, GER |
| 17847 | SOTAHEXAL 160 | por tbl nob20x160mg | HPZ | PL | | | |
| 17848 | SOTAHEXAL 160 | por tbl nob50x160mg | HPZ | PL | | | |
| 49012 | SOTAHEXAL 80 | por tbl nob 20x80mg | SFS | D | | | |
| 49019 | SOTAHEXAL 160 | por tbl nob 20x160mg | SFS | D | | | |
| 49020 | SOTAHEXAL 160 | por tbl nob 50x160mg | SFS | D | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------------|-----|----|
| 83480 | SOTAHEXAL 80 | tbl 20x80mg | HEX | D |
| 83481 | SOTAHEXAL 160 | tbl 20x160mg | HEX | D |
| 83670 | SOTAHEXAL 160 | tbl 50x160mg | HEX | D |
| 85476 | SOTAHEXAL 80 | por tbl nob 20x80mg | HPZ | PL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 73.8 | C07AA12 | nadolol | p.o. | 0.16 | GM | 2.74 | |
| 73.9 | C07AA16 | tertatolol | p.o. | 5.00 | MG | 2.74 | |
| 73.10 | C07AA17 | bopindolol | p.o. | 1.00 | MG | 2.74 | |
| 73.11 | C07AA23 | penbutolol | p.o. | 40.00 | MG | 2.74 | |
| 73.12 | C07AA27 | kloranolol | p.o. | 20.00 | MG | 2.74 | |

| | | |
|----|--|--|
| 74 | selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorální podání | |
|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|------|------|----|-------|---|
| 74.1 | C07AB02 | metoprolol - retardované lékové formy | p.o. | 0.15 | GM | 2.63 | |
| 32673 | METOPROLOL AL 200 RETARD | por tbl pro50x200mg | APA | D | | | |
| 47501 | METOPROLOL AL 200 RETARD | por tb1pro100x200mg | APA | D | | | |
| 74.2 | C07AB02 | metoprolol (do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 2.56 | |
| 74.3 | C07AB02 | metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.15 | GM | 12.90 | P |

Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je indikován v léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce jsou indikovány tablety s obsahem 100 mg.

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|------|-------|----|------|---|
| 74.4 | C07AB02 | metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.15 | GM | 8.00 | P |
| 74.5 | C07AB02 | metoprolol (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 2.47 | |
| 47675 | METOPROLOL AL 100 | por tb1nob100x100mg | APA | D | | | |
| 74.6 | C07AB03 | atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 75.00 | MG | 2.65 | |
| 02951 | ATENOLOL AL 50 | por tbl nob100x50mg | APA | D | | | |
| 42457 | ATEHEXAL 50 | por tbl flm 50x50mg | SFS | D | | | |
| 42458 | ATEHEXAL 50 | por tbl flm100x50mg | SFS | D | | | |
| 74.7 | C07AB03 | atenolol nad 50 mg v jedné tabletě | p.o. | 75.00 | MG | 1.93 | |
| 42461 | ATEHEXAL 100 | por tb1flm100x100mg | SFS | D | | | |
| 74.8 | C07AB04 | acebutolol | p.o. | 0.40 | GM | 3.52 | |
| 46301 | ACEBIREX 200 MG | por tbl flm30x200mg | BTT | F | | | |
| 46303 | ACEBIREX 400 MG | por tbl flm30x400mg | BTT | F | | | |
| 74.9 | C07AB05 | betaxolol | p.o. | 20.00 | MG | 3.52 | |
| 95400 | BETAXA 20 | por tbl flm 30x20mg | ZEH | SK | | | |
| 95401 | BETAXA 20 | por tbl flm 60x20mg | ZEH | SK | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---|---------------------|-------|----|-------|---|
| 95402 | BETAXA 20 | | por tbl flm100x20mg | ZEH | SK | | |
| 74.10 | C07AB07 | bisoprolol | p.o. | 10.00 | MG | 3.52 | |
| 32963 | BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG | | por tbl nob 30x5mg | MCK | D | | |
| 32967 | BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG | | por tbl nob 100x5mg | MCK | D | | |
| 32970 | BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG | | por tbl nob 30x10mg | MCK | D | | |
| 32974 | BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG | | por tbl nob100x10mg | MCK | D | | |
| 42870 | KORDOBIS 5 MG TBL. | | por tbl flm 30x5mg | PVL | CZ | | |
| 42871 | KORDOBIS 10 MG TBL. | | por tbl flm30x10mg | PVL | CZ | | |
| 74.11 | C07AB07 | bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 10.00 | MG | 13.17 | P |

Bisoprolol je indikován v léčbě srdceho selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě je bisoprolol indikován v tabletách s obsahem 10 mg.

Nebivolol je indikován v léčbě srdečního selhání. Nebivolol v dávce 5mg je určen k zahájení léčby. Cílová dávka nebivololu v této indikaci je 10 mg denně.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|
| 74.15 | C07AG01 | labetalol | p.o. | 0.60 | GM | 19.50 | L/KAR,INT,GER |
| 74.16 | C07AG02 | karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 37.50 | MG | 13.17 | P |
| 74.17 | C07AG02 | karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě) | p.o. | 37.50 | MG | 8.00 | P |

Karvedilol je indikován v léčbě srdečního selhání. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, že není vyšší dávka tolerována, je možno podávat dávku 6,25 mg dlouhodobě. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 – 50 mg denně, k udržovací léčbě je karvedilol indikován v tabletách s obsahem 12,5 a 25 mg.

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--|----------------|-------|----|----------|---|
| 75 | beta-blokátory, ostatní cesty aplikace | | | | | | | |
| 75.1 | C07AA | metipranolol | | parent. | 10.00 | MG | 62.97 | O |
| 85886 | TRIMEPRANOL | | | inj 10x1ml/1mg | HBS | SK | | |
| 75.2 | C07AG01 | labetalol | | parent. | 0.60 | GM | 1 027.60 | H |
| 75.3 | C07AA | talinolol | | parent. | 50.00 | MG | 93.65 | O |
| 75.4 | C07AA02 | oxprenolol | | parent. | 0.10 | GM | 99.13 | O |
| 75.5 | C07AA03 | pindolol | | parent. | 15.00 | MG | 99.13 | O |
| 75.6 | C07AA07 | sotalol | | parent. | 0.16 | GM | 900.64 | O |
| 75.7 | C07AB02 | metoprolol | | parent. | 0.15 | GM | 1 398.18 | O |
| 75.8 | C07AB03 | atenolol | | parent. | 75.00 | MG | 1 840.83 | O |
| 75.9 | C07AB04 | acebutolol | | parent. | 0.40 | GM | 1 398.18 | O |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|----|----------|---|
| 75.10 | C07AB09 | esmolol | parent. | 2.50 | GM | 4 205.00 | O |
|-------|---------|---------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 76 | kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 76.1 | C07BB03 | atenolol a thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 4.41 | |
|------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|

76715 TENORETIC por tbl flm 28 AZC GB

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 76.2 | C07BB07 | bisoprolol a thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 3.71 | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|
| 76.3 | C07CA17 | bopindolol a thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 4.41 | |
|------|---------|-----------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|-------------|------|----|------|--|
| 76.4 | C07FA | beta-blokátory, neselektivní, antihypertensiva | a jiná p.o. | 0.50 | DF | 0.73 | |
|------|-------|--|-------------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 77 | blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorální podání | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.1 | C08CA01 | amlodipin do 5 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.00 | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|-----|-----|
| 02945 | AGEN 5 | por tbl nob 30x5mg | ZEH | CZ |
| 03936 | AMLOPP-5 | por tbl nob 30x5mg | SDD | CZ |
| 03993 | NORMODIPINE 5 MG | por tbl nob 30x5mg | GED | H |
| 03998 | CARDIOLPIN 5 MG | por tbl nob 30x5mg | EGI | H |
| 13464 | ORCAL 5 MG | por tbl nob90x5mg | LEK | SLO |
| 15378 | AGEN 5 | por tbl nob 90x5mg | ZEH | CZ |
| 19440 | ORCAL 5 MG TABLETY | por tbl nob30x5mg | LSW | PL |
| 19444 | ORCAL 5 MG TABLETY | por tbl nob90x5mg | LSW | PL |
| 32924 | ZOREM 5 MG | por tbl nob 30x5mg | PVL | CZ |
| 42833 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG | por tbl nob 30x5mg | MCK | D |
| 42837 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG | por tbl nob 100x5mg | MCK | D |
| 42848 | HIPRES 5 | por tbl nob 30x5mg | KRK | SLO |
| 58415 | ORCAL 5MG | tbl 30x5mg | LEK | SLO |
| 58874 | AMLOZEK 5 | por tbl nob 30x5mg | ADD | PL |
| 95582 | ZOREM 5 MG | por tbl nob 100x5mg | PVL | CZ |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.2 | C08CA01 | amlodipin nad 5 mg v 1 tbl | p.o. | 5.00 | MG | 4.00 | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|-----|
| 02954 | AGEN 10 | por tbl nob 30x10mg | ZEH | CZ |
| 03944 | AMLOPP-10 | por tbl nob 30x10mg | SDD | CZ |
| 03999 | CARDIOLPIN 10 MG | por tbl nob 30x10mg | EGI | H |
| 13466 | ORCAL 10 MG | por tbl nob90x10mg | LEK | SLO |
| 13851 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl nob 30x10mg | MCK | D |
| 13852 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl nob100x10mg | MCK | D |
| 15379 | AGEN 10 | por tbl nob 90x10mg | ZEH | CZ |
| 19442 | ORCAL 10 MG TABLETY | por tbl nob30x10mg | LSW | PL |
| 19446 | ORCAL 10 MG TABLETY | por tbl nob90x10mg | LSW | PL |
| 42849 | HIPRES 10 | por tbl nob 30x10mg | KRK | SLO |
| 58417 | ORCAL 10MG | tbl 30x10mg | LEK | SLO |
| 58876 | AMLOZEK 10 | por tbl nob 30x10mg | ADD | PL |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.3 | C08CA02 | felodipin do 5 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.00 | |
|------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|---------------|---------------------|-----|----|
| 02957 | PRESID 5 MG | por tbl ret 30x5mg | IXP | CZ |
| 02961 | PRESID 2.5 MG | por tbl ret30x2.5mg | IXP | CZ |

| | | | | |
|-------|---------------------------|--------------------|-----|----|
| 20394 | FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MG | por tbl pro 30x5mg | MCK | D |
| 20397 | FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MG | por tbl pro100x5mg | MCK | D |
| 21534 | FELOCOR 5 | por tbl pro 30x5mg | SFS | D |
| 21548 | FELOCOR 5 | por tbl pro 30x5mg | HED | DK |
| 42942 | FELODIPIN AL 5 RETARD | por tbl ret 30x5mg | APA | D |
| 48584 | FELOCOR 5 | por tbl pro 30x5mg | SFS | D |
| 48595 | FELOCOR 5 | por tbl pro 30x5mg | HED | DK |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.4 | C08CA02 | felodipin nad 5 mg v 1 tbl | p.o. | 5.00 | MG | 4.00 | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|----|
| 02959 | PRESID 10 MG | por tbl ret 30x10mg | IXP | CZ |
| 20317 | FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl pro 30x10mg | MCK | D |
| 20320 | FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl pro100x10mg | MCK | D |
| 21504 | FELOCOR 10 | por tbl pro 30x10mg | SFS | D |
| 21519 | FELOCOR 10 | por tbl pro 30x10mg | HED | DK |
| 42946 | FELODIPIN AL 10 RETARD | por tbl ret 30x10mg | APA | D |
| 48608 | FELOCOR 10 | por tbl pro 30x10mg | SFS | D |
| 48619 | FELOCOR 10 | por tbl pro 30x10mg | HED | DK |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 77.5 | C08CA03 | Isradipin | p.o. | 5.00 | MG | 4.75 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 77.6 | C08CA03 | isradipin (retardované lékové formy) | p.o. | 5.00 | MG | 5.00 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 77.7 | C08CA05 | nifedipin | p.o. | 30.00 | MG | 1.45 | |
|------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|
| 77.8 | C08CA05 | nifedipin (lékové formy s retardací hodin) | 24 p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | |
|------|---------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|------------------|-----------------|-----|-----|
| 03033 | CORDIPIN XL | tbl ret 30x40mg | KRK | SLO |
| 53372 | NIFECARD XL 30MG | tbl ret 30x30mg | LEK | SLO |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|--------------|------|-------|----|------|--|
| 77.9 | C08CA05 | nifedipin (retardované s obsahem 20 mg) | lékové formy | p.o. | 30.00 | MG | 2.03 | |
|------|---------|---|--------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|--------------------|---------------------|-----|-----|
| 47490 | CORINFAR 20 RETARD | por tbl pro 30x20mg | AWD | D |
| 93460 | CORDIPIN RETARD | tbl ret 30x20mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------------|------|-------|----|------|--|
| 77.10 | C08CA05 | nifedipin (retardované s obsahem 40 mg) | lékové formy | p.o. | 30.00 | MG | 1.37 | |
|-------|---------|---|--------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 77.11 | C08CA06 | nimodipin | p.o. | 0.30 | GM | 136.08 | X |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------|-----|----|
| 94189 | DILCEREN | tbl obd 50x30mg | ZEH | SK |
|-------|----------|-----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 77.12 | C08CA07 | nisoldipin | p.o. | 20.00 | MG | 5.00 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|--|
| 77.13 | C08CA08 | nitrendipin | p.o. | 20.00 | MG | 5.00 | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|
| 03078 | UNIPRES 20 | tbl 30x20mg | KRK | SLO |
| 03079 | UNIPRES 10 | tbl 30x10mg | KRK | SLO |
| 30965 | NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG | por tbl nob100x20mg | MCK | D |
| 66469 | NITREPRESS 10 | por tbl nob 20x10mg | HHO | D |
| 66495 | NITREPRESS 10 | por tbl nob 50x10mg | HHO | D |
| 66498 | NITREPRESS 20 | por tbl nob 50x20mg | HHO | D |
| 66499 | NITREPRESS 20 | por tbl nob 20x20mg | HHO | D |
| 94688 | NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG | por tbl nob 30x20mg | MCK | D |
| 95584 | NITREPRESS 10 | por tbl nob 28x10mg | HHO | D |

95586 NITREPRESS 20

por tbl nob 28x20mg

HHO D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 77.14 | C08CA09 | lacidipin | p.o. | 4.00 | MG | 5.00 | |
| 77.15 | C08CA10 | nilvadipin do 8 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 8.00 | MG | 5.00 | |
| 77.16 | C08CA10 | nilvadipin nad 8 mg v 1 tbl | p.o. | 8.00 | MG | 4.00 | |
| 77.17 | C08CA12 | barnidipin do 10 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 10.00 | MG | 5.00 | |
| 77.18 | C08CA12 | barnidipin nad 10 mg v 1 tbl | p.o. | 10.00 | MG | 4.00 | |
| 77.19 | C08CA13 | lercanidipin | p.o. | 10.00 | MG | 5.00 | |

78 blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 78.1 | C08DA01 | verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.24 | GM | 5.00 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|-----|-----|
| 43879 | VEROGALID ER 240 MG | porttblpro 100x240mg | IXP | CZ |
| 54032 | VERAPAMIL AL 240 RETARD | por tbl ret50x240mg | APA | D |
| 54034 | VERAPAMIL AL 240 RETARD | por tbldret100x240mg | APA | D |
| 56164 | VERAHEXAL RR | tbl ret 30x240mg | FST | D |
| 56165 | VERAHEXAL RR | tbl ret 50x240mg | FST | D |
| 56166 | VERAHEXAL RR | tbl ret 100x240mg | FST | D |
| 93679 | LEKOPTIN RETARD | tbl ret 20x240mg | LEK | SLO |
| 99575 | VEROGALID ER 240 MG | por tbldret30x240mg | IXP | CZ |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 78.2 | C08DA01 | verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.24 | GM | 4.50 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|-----|----|
| 17841 | VERAHEXAL 120 | porttblflm30x120mg | HPZ | PL |
| 17842 | VERAHEXAL 120 | porttblflm 50x120mg | HPZ | PL |
| 17843 | VERAHEXAL 120 | porttblflm100x120mg | HPZ | PL |
| 17844 | VERAHEXAL 80 | porttblflm 30x80mg | HPZ | PL |
| 56152 | VERAHEXAL 40 | tbl obd 30x40mg | FST | D |
| 56155 | VERAHEXAL 80 | tbl obd 30x80mg | FST | D |
| 56158 | VERAHEXAL 120 | tbl obd 30x120mg | FST | D |
| 56159 | VERAHEXAL 120 | tbl obd 50x120mg | FST | D |
| 56160 | VERAHEXAL 120 | tbl obd 100x120mg | FST | D |
| 56161 | VERAHEXAL KHK RETARD | tbl ret 30x120mg | FST | D |
| 56162 | VERAHEXAL KHK RETARD | tbl ret 50x120mg | FST | D |
| 56163 | VERAHEXAL KHK RETARD | tbl ret 100x120mg | FST | D |
| 77037 | VERAPAMIL AL 80 | por tbldret100x80mg | APA | D |
| 86046 | VERAPAMIL AL 120 | por tbldret100x120mg | APA | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 78.3 | C08DA02 | gallopamil | p.o. | 0.10 | GM | 4.50 | |
|------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 78.4 | C08DB01 | diltiazem | p.o. | 0.24 | GM | 4.75 | |
|------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 78.5 | C08DB01 | diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více) | p.o. | 0.24 | GM | 5.00 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

79 blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 79.1 | C08CA03 | isradipin | parent. | 5.00 | MG | 3 074.59 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|
| 79.2 | C08CA05 | nifedipin | parent. | 30.00 | MG | 3 074.59 | H |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|
| 79.3 | C08CA06 | nimodipin | parent. | 50.00 | MG | 3 019.19 | X |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|

94535 NIMOTOP S inf sol 5x50ml/10mg BAY D

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 79.4 | C08DA01 | verapamil | parent. | 0.24 | GM | 355.24 | H |
|------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|
| 79.5 | C08DB01 | diltiazem | parent. | 25.00 | MG | 332.07 | H |
|------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 80 | ACE inhibitory působící méně než 24 hodin | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 80.1 | C09AA01 | kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 50.00 | MG | 3.90 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

15327 APO-CAPTO 12.5 MG tbl 100x12.5mg CMG IRL

16564 APO-CAPTO 12.5 MG tbl 100x12.5mg KAT NL

96903 APO-CAPTO 12.5 MG tbl 100x12.5mg APT CND

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 80.2 | C09AA01 | kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 50.00 | MG | 3.60 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

15326 APO-CAPTO 25 MG tbl 100x25mg CMG IRL

16563 APO-CAPTO 25 MG tbl 100x25mg KAT NL

68839 APO-CAPTO 25 MG tbl 100x25mg APT CND

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 80.3 | C09AA01 | kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 3.40 | |
|------|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 80.4 | C09AA02 | enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 4.00 | |
|------|---------|---|------|-------|----|------|--|

20419 ENALAPRIL AL 5 por tbl nob 100x5mg APA D

32758 ENALEK 5 MG por tbl nob 30x5mg LEK SLO

59879 ENAPRIL 5 tbl 100x5mg SFS D

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 80.5 | C09AA02 | enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 2.30 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

32760 ENALEK 20 MG por tbl nob 30x20mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 80.6 | C09AA02 | enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 3.30 | |
|------|---------|--|------|-------|----|------|--|

20422 ENALAPRIL AL 10 por tbl nob 100x10mg APA D

32759 ENALEK 10 MG por tbl nob 30x10mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 80.7 | C09AA02 | enalaprilát | parent. | 1.25 | MG | 24.39 | H |
|------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

62597 ENAP I.V. inj 5x1ml/1.25mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 81 | ostatní ACE-inhibitory | | | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 81.1 | C09AA03 | lisinopril | p.o. | 10.00 | MG | 4.50 | |
|------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

10625 LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MG por tbl nob 30x5mg MCK D

10629 LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MG por tbl nob 100x5mg MCK D

10683 LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MG por tbl nob 30x10mg MCK D

10685 LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MG por tbl nob 100x10mg MCK D

10884 LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 MG por tbl nob 30x20mg MCK D

| | | | | |
|-------|---------------|---------------------|-----|----|
| 11006 | DIROTON 10 MG | tbl 100x10mg | GED | H |
| 32501 | DAPRIL 5 | por tbl nob 100x5mg | MOE | CY |
| 32503 | DAPRIL 10 | por tbl nob100x10mg | MOE | CY |
| 32505 | DAPRIL 20 | por tbl nob 60x20mg | MOE | CY |
| 95657 | LISIPRIL 5 | por tbl nob 30x5mg | SFS | D |
| 95665 | LISIPRIL 10 | por tbl nob 30x10mg | SFS | D |
| 95673 | LISIPRIL 20 | por tbl nob 30x20mg | SFS | D |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 81.2 | C09AA04 | perindopril do 4 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 4.00 | MG | 5.53 | |
|------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|------|--|
| 81.3 | C09AA04 | perindopril nad 4 mg v 1 tbl | p.o. | 4.00 | MG | 3.87 | |
|------|---------|------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 81.4 | C09AA05 | ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.50 | MG | 5.53 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|-----|-----|
| 01436 | PIRAMIL 1.25 MG | por tbl nob30x1.25mg | LSW | PL |
| 01444 | PIRAMIL 1.25 MG | portbl nob100x1.25mg | LSW | PL |
| 01544 | PIRAMIL 2.5 MG | por tbl nob30x2.5mg | LSW | PL |
| 01564 | PIRAMIL 2.5 MG | por tbl nob100x2.5mg | LSW | PL |
| 13469 | RAMIL 1.25 | por tbl nob30x1.25mg | ZEH | CZ |
| 13470 | RAMIL 1.25 | por tbl nob90x1.25mg | ZEH | CZ |
| 13472 | RAMIL 2.5 | por tbl nob 30x2.5mg | ZEH | CZ |
| 13473 | RAMIL 2.5 | por tbl nob 90x2.5mg | ZEH | CZ |
| 16405 | PIRAMIL 1.25 MG | por tbl nob30x1.25mg | SZP | D |
| 16407 | PIRAMIL 1.25 MG | portbl nob100x1.25mg | SZP | D |
| 16420 | PIRAMIL 2.5 MG | por tbl nob30x2.5mg | SZP | D |
| 16422 | PIRAMIL 2.5 MG | por tbl nob100x2.5mg | SZP | D |
| 18668 | RAMILIFE 2.5 MG | por tbl nob30x2.5mg | AHJ | IS |
| 23954 | AMPRILAN 1.25 | portbl nob 30x1.25mg | KRK | SLO |
| 23956 | AMPRILAN 1.25 | portbl nob 60x1.25mg | KRK | SLO |
| 23957 | AMPRILAN 1.25 | portbl nob 90x1.25mg | KRK | SLO |
| 23958 | AMPRILAN 2.5 | portbl nob 30x2.5mg | KRK | SLO |
| 23960 | AMPRILAN 2.5 | portbl nob 60x2.5mg | KRK | SLO |
| 23961 | AMPRILAN 2.5 | portbl nob 90x2.5mg | KRK | SLO |
| 48752 | HARTIL 1.25 MG | portbl nob 28x1.25mg | EGI | H |
| 48753 | HARTIL 2.5 MG | portbl nob 28x2.5mg | EGI | H |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 81.5 | C09AA05 | ramipril nad 2,5 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.50 | MG | 3.87 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|--------------|--------------------|-----|-----|
| 01874 | PIRAMIL 5 MG | por tbl nob 30x5mg | LSW | PL |
| 01893 | PIRAMIL 5 MG | por tbl nob100x5mg | LSW | PL |
| 13475 | RAMIL 5 | por tbl nob 30x5mg | ZEH | CZ |
| 13476 | RAMIL 5 | por tbl nob 90x5mg | ZEH | CZ |
| 16367 | PIRAMIL 5 MG | por tbl nob 30x5mg | SZP | D |
| 16369 | PIRAMIL 5 MG | por tbl nob100x5mg | SZP | D |
| 23962 | AMPRILAN 5 | por tbl nob 30x5mg | KRK | SLO |
| 23964 | AMPRILAN 5 | por tbl nob 60x5mg | KRK | SLO |
| 23965 | AMPRILAN 5 | por tbl nob 90x5mg | KRK | SLO |
| 48754 | HARTIL 5 MG | portbl nob 28x5mg | EGI | H |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 81.6 | C09AA05 | ramipril nad 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 2.50 | MG | 2.70 | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|---------------|---------------------|-----|----|
| 02023 | PIRAMIL 10 MG | por tbl nob 30x10mg | LSW | PL |
| 02058 | PIRAMIL 10 MG | por tbl nob100x10mg | LSW | PL |

| | | | | | |
|-------|---------------|--|----------------------|-----|-----|
| 13477 | RAMIL 10 | | por tbl nob 30x10mg | ZEH | CZ |
| 13478 | RAMIL 10 | | por tbl nob 90x10mg | ZEH | CZ |
| 16383 | PIRAMIL 10 MG | | por tbl nob 30x10mg | SZP | D |
| 16385 | PIRAMIL 10 MG | | por tbl nob 100x10mg | SZP | D |
| 23966 | AMPRILAN 10 | | por tbl nob 30x10mg | KRK | SLO |
| 23968 | AMPRILAN 10 | | por tbl nob 60x10mg | KRK | SLO |
| 23969 | AMPRILAN 10 | | por tbl nob 90x10mg | KRK | SLO |
| 48755 | HARTIL 10 MG | | portblnob 28x10mg | EGI | H |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 81.7 | C09AA06 | quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 15.00 | MG | 5.53 | |
| 81.8 | C09AA06 | quinapril nad 15 mg v jedné tabletě | p.o. | 15.00 | MG | 3.87 | |
| 81.9 | C09AA07 | benazepril | p.o. | 7.50 | MG | 5.53 | |
| 81.10 | C09AA08 | cilazapril do 2,5 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 2.50 | MG | 5.53 | |
| 81.11 | C09AA08 | cilazapril nad 2,5 mg v 1 tbl | p.o. | 2.50 | MG | 3.87 | |
| 81.12 | C09AA09 | fosinopril | p.o. | 15.00 | MG | 3.87 | |
| 81.13 | C09AA10 | trandolapril | p.o. | 2.00 | MG | 5.53 | |
| 81.14 | C09AA11 | spirapril | p.o. | 6.00 | MG | 5.53 | |
| 81.15 | C09AA12 | delapril | p.o. | 30.00 | MG | 5.53 | |
| 81.16 | C09AA13 | moexipril | p.o. | 15.00 | MG | 5.53 | |
| 81.17 | C09AA16 | imidapril do 5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.53 | |
| 81.18 | C09AA16 | imidapril nad 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 3.87 | |

82 kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|----------------|------|-----|------|--|
| 82.1 | C09BA01 | kaptopril a diureтика | p.o. | 1.00 | DF | 4.34 | |
| 82.2 | C09BA02 | enalapril a diureтика | p.o. | 1.00 | DF | 3.97 | |
| 55429 | ENAP-HL | | por tbl nob 30 | KRK | SLO | | |
| 66506 | ENAP-H | | por tbl nob 30 | KRK | SLO | | |
| 82.3 | C09BA04 | perindopril a indapamid 2mg/0,625 mg | p.o. | 1.00 | DF | 3.05 | |
| 82.4 | C09BA04 | perindopril a indapamid 4 mg/1,25 mg | p.o. | 1.00 | DF | 6.09 | |
| 82.5 | C09BA05 | ramipril s obsahem 2,5 mg a diuretikum s obsahem 12,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 | |
| 95275 | RAMIL H | | por tbl nob 30 | ZEH | CZ | | |
| 82.6 | C09BA05 | ramipril s obsahem 5 mg a diuretikum s obsahem 25 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.68 | |
| 82.7 | C09BA06 | quinapril s obsahem 10 mg v jedné tabletě a diuretikum | p.o. | 1.00 | DF | 4.16 | |
| 82.8 | C09BA06 | quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum s obsahem 12,5 mg | p.o. | 1.00 | DF | 5.63 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 82.9 | C09BA06 | quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě p.o. a diuretikum s obsahem 25 mg | p.o. | 1.00 | DF | 6.10 | |
| 82.10 | C09BA07 | benazepril a diuretika | p.o. | 1.00 | DF | 5.06 | |
| 82.11 | C09BA08 | cilazapril a diuretika | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |
| 82.12 | C09BB05 | ramipril s obsahem 2,5 mg a felodipin s obsahem 2,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.03 | |
| 82.13 | C09BB05 | ramipril s obsahem 5 mg a felodipin s obsahem 5 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 12.74 | |
| 82.14 | C09BB10 | trandolapril a verapamil | p.o. | 1.00 | DF | 9.28 | |
| 82.15 | C09DA01 | losartan v kombinaci s thiazidy | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 | |

97027 LORISTA H por tbl flm 28 KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 82.16 | C09DA03 | valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |
| 82.17 | C09DA03 | valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 8.68 | |
| 82.18 | C09DA03 | valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg valsartanu v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 | |
| 82.19 | C09DA06 | kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |
| 82.20 | C09DA06 | kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 | |
| 82.21 | C09DA07 | telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 40 mg telmisartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 6.00 | |
| 82.22 | C09DA07 | telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg telmisartanu v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF | 8.21 | |

83 Léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|----------------------|-------|-----|------|--|
| 83.1 | C09CA01 | losartan do 50 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 50.00 | MG | 5.53 | |
| 10604 | LORISTA | | por tblflm 28x50mg | | KRK | SLO | |
| 10618 | LOZAP 12.5 | | porttblflm 30x12.5mg | | ZEH | CZ | |
| 10620 | LOZAP 50 | | por tbl flm 30x50mg | | ZEH | CZ | |
| 13886 | LOZAP 12.5 ZENTIVA | | porttblflm 30x12.5mg | | ZEH | SK | |
| 13888 | LOZAP 12.5 ZENTIVA | | porttblflm 90x12.5mg | | ZEH | SK | |
| 13892 | LOZAP 50 ZENTIVA | | por tbl flm 30x50mg | | ZEH | SK | |
| 13894 | LOZAP 50 ZENTIVA | | por tbl flm 90x50mg | | ZEH | SK | |
| 15403 | LORISTA | | por tblflm 56x50mg | | KRK | SLO | |
| 17963 | LOZAP 50 | | por tbl flm 90x50mg | | ZEH | CZ | |

| | | | | |
|-------|-------------|---------------------|-----|-----|
| 47610 | LORISTA | por tblflm 84x50mg | KRK | SLO |
| 95461 | LAKEA 50 MG | por tbl flm 30x50mg | LEK | SLO |
| 97062 | LOZAP 50 | por tbl flm 30x50mg | ZEH | CZ |

| | | | | | | |
|------|---------|--|--------|--------|------|------|
| 83.2 | C09CA01 | losartan nad 50 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 50.00 | MG | 3.87 | |
| 83.3 | C09CA02 | eprosartan | p.o. | 600.00 | MG | 5.53 |
| 83.4 | C09CA03 | valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 80.00 | MG | 5.53 | |
| 83.5 | C09CA03 | valsartan nad 80 mg v jedné tabletě p.o. | 80.00 | MG | 3.87 | |
| 83.6 | C09CA04 | irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 150.00 | MG | 7.68 | P |
| 83.7 | C09CA04 | irbesartan nad 150 mg v jedné tabletě p.o. | 150.00 | MG | 6.12 | P |

Irbesartan je indikován v těchto případech:

- a) diabetická nefropatie již od fáze mikroalbuminurie,
- b) nedиabetická nefropatie s proteinuríí vyšší než 1 g/24 hodin u nemocných netolerujících ACE inhibitory.

| | | | | | | |
|-------|---------|--|-------|----|------|--|
| 83.8 | C09CA06 | kandesartan do 8 mg v jedné tabletě p.o. včetně | 8.00 | MG | 5.53 | |
| 83.9 | C09CA06 | kandesartan nad 8 mg v jedné tabletě p.o. | 8.00 | MG | 3.87 | |
| 83.10 | C09CA07 | telmisartan do 40 mg v jedné tabletě p.o. včetně | 40.00 | MG | 5.53 | |
| 83.11 | C09CA07 | telmisartan nad 40 mg v jedné tabletě p.o. | 40.00 | MG | 3.87 | |
| 83.12 | C09CA08 | olmesartan medoxomil do 20 mg v jedné tabletě včetně | 20.00 | MG | 5.53 | |
| 83.13 | C09CA08 | olmesartan medoxomil nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně | 20.00 | MG | 3.87 | |

84 hypolipidemika ze skupiny statinů

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 84.1 | C10AA01 | simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|------------------------------|----------------------|-----|-----|
| 10390 | SIMIREX 10 MG | por tbl flm 30x10mg | SYH | E |
| 13499 | SIMGAL 10 MG | por tbl flm 84x10mg | IXP | CZ |
| 13827 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl flm 30x10mg | SBV | NL |
| 13830 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl flm 100x10mg | SBV | NL |
| 14733 | SIMVOR 10 MG | por tbl flm 30x10mg | IRI | IRL |
| 15697 | SIMIREX 10 MG | por tbl flm 60x10mg | SYH | E |
| 31844 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl flm 30x10mg | SYH | E |
| 31847 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl flm 100x10mg | SYH | E |
| 32578 | SIMGAL 10 MG | por tbl flm 28x10mg | IXP | CZ |
| 45336 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl flm 30x10mg | MCK | D |
| 45359 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MG | por tbl flm 100x10mg | MCK | D |
| 49919 | SIMVAX 10 | por tbl flm 28x10mg | SFS | D |
| 49923 | SIMVAX 10 | por tbl flm 28x10mg | SFS | D |
| 58136 | VASILIP 10 | tbl obd 28x10mg | KRK | SLO |
| 58773 | SIMVACARD 10 | tbl obd 28x10mg | ZEH | CZ |
| 66024 | SIMVOR 10MG | tbl obd 30x10mg | RXY | IND |
| 81479 | SIMVAX 10 | por tbl flm 28x10mg | GEA | DK |
| 95250 | VASILIP 10 | tbl obd 84x10mg | KRK | SLO |

97067 SIMVAX 10

por tbl flm 28x10mg

GEA DK

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|---|
| 84.2 | C10AA01 | simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 8.00 | P |
|------|---------|--|------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|------------------------------|----------------------|-----|-----|
| 10422 | SIMIREX 20 MG | por tbl flm 30x20mg | SYH | E |
| 13701 | SIMGAL 20 MG | por tbl flm 84x20mg | IXP | CZ |
| 13843 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 30x20mg | SBV | NL |
| 13848 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 100x20mg | SBV | NL |
| 14734 | SIMVOR 20 MG | por tbl flm 30x20mg | IRI | IRL |
| 15073 | SIMIREX 20 MG | por tbl flm 60x20mg | SYH | E |
| 21719 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 100x20mg | MCK | D |
| 31851 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 30x20mg | SYH | E |
| 31856 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 100x20mg | SYH | E |
| 32579 | SIMGAL 20 MG | por tbl flm 28x20mg | IXP | CZ |
| 45752 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 30x20mg | MCK | D |
| 47731 | SIMVACARD 20 | tbl obd 84x20mg | ZEH | CZ |
| 49911 | SIMVAX 20 | por tbl flm 28x20mg | SFS | D |
| 49912 | SIMVAX 20 | por tbl flm 30x20mg | SFS | D |
| 49915 | SIMVAX 20 | por tbl flm 28x20mg | SFS | D |
| 49916 | SIMVAX 20 | por tbl flm 30x20mg | SFS | D |
| 58064 | VASILIP 20 | tbl obd 28x20mg | KRK | SLO |
| 58775 | SIMVACARD 20 | tbl obd 28x20mg | ZEH | CZ |
| 66026 | SIMVOR 20MG | tbl obd 30x20mg | RXY | IND |
| 81483 | SIMVAX 20 | por tbl flm 28x20mg | GEA | DK |
| 81484 | SIMVAX 20 | por tbl flm 30x20mg | GEA | DK |
| 95251 | VASILIP 20 | tbl obd 84x20mg | KRK | SLO |
| 97071 | SIMVAX 20 | por tbl flm 28x20mg | GEA | DK |
| 97072 | SIMVAX 20 | por tbl flm 30x20mg | GEA | DK |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.3 | C10AA01 | simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 11.00 | P |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 10459 | SIMIREX 40 MG | por tbl flm 30x40mg | SYH | E |
| 13702 | SIMGAL 40 MG | por tbl flm 84x40mg | IXP | CZ |
| 13833 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG | por tbl flm 30x40mg | SBV | NL |
| 14735 | SIMVOR 40 MG | por tbl flm 30x40mg | IRI | IRL |
| 15070 | SIMIREX 40 MG | por tbl flm 60x40mg | SYH | E |
| 17915 | SIMVACARD 40 | tbl obd 84x40mg | ZEH | CZ |
| 31859 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG | por tbl flm 30x40mg | SYH | E |
| 32580 | SIMGAL 40 MG | por tbl flm 28x40mg | IXP | CZ |
| 42929 | VASILIP 40 | por tbl obd 28x40mg | KRK | SLO |
| 45535 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MG | por tbl flm 30x40mg | MCK | D |
| 49901 | SIMVAX 40 | por tbl flm 28x40mg | SFS | D |
| 49902 | SIMVAX 40 | por tbl flm 30x40mg | SFS | D |
| 49905 | SIMVAX 40 | por tbl flm 28x40mg | SFS | D |
| 58777 | SIMVACARD 40 | tbl obd 28x40mg | ZEH | CZ |
| 66028 | SIMVOR 40MG | tbl obd 30x40mg | RXY | IND |
| 81487 | SIMVAX 40 | por tbl flm 28x40mg | GEA | DK |
| 81488 | SIMVAX 40 | por tbl flm 30x40mg | GEA | DK |
| 97075 | SIMVAX 40 | por tbl flm 28x40mg | GEA | DK |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 84.4 | C10AA01 | simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 15.40 | P |
|------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | |
|------|---------|--|------|----|------|---|
| 84.5 | C10AA02 | lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě) p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | P |
|------|---------|--|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------|-----|-----|
| 01300 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 30x20mg | APT | CND |
| 15397 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 100x20mg | CMG | IRL |
| 15398 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 30x20mg | CMG | IRL |
| 16572 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 100x20mg | KAT | NL |
| 16573 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 30x20mg | KAT | NL |
| 53286 | APO-LOVASTATIN 20 | tbl 100x20mg | APT | CND |
| 53506 | MEDOSTATIN 20MG | tbl 30x20mg | MOE | CY |
| 53507 | MEDOSTATIN 20MG | tbl 100x20mg | MOE | CY |
| 58799 | HOLETAR 20 | tbl 30x20mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|---|
| 84.6 | C10AA02 | lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 6.75 | P |
|------|---------|--|------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------|-----|-----|
| 01254 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 30x40mg | APT | CND |
| 15394 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 100x40mg | CMG | IRL |
| 15396 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 30x40mg | CMG | IRL |
| 16575 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 100x40mg | KAT | NL |
| 16577 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 30x40mg | KAT | NL |
| 53287 | APO-LOVASTATIN 40 | tbl 100x40mg | APT | CND |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 84.7 | C10AA03 | pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 4.80 | P |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 84.8 | C10AA03 | pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 7.20 | P |
|------|---------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.9 | C10AA03 | pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 10.80 | P |
|------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 84.10 | C10AA04 | fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 4.80 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 84.11 | C10AA04 | fluvastatin (nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 7.20 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.12 | C10AA04 | fluvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 16.85 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|
| 84.13 | C10AA05 | atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 8.50 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 19590 | TORVACARD 10 | por tbl flm 30x10mg | ZEH | CZ |
| 19591 | TORVACARD 10 | por tbl flm 90x10mg | ZEH | CZ |
| 20165 | TULIP 10 MG | por tbl flm 30x10mg | LEK | SLO |
| 42051 | TULIP LEK 10 MG POTAHOVANÉ TBL | por tbflfm30x10mg | LEK | SLO |
| 49004 | ATORIS 10 | por tbl flm 30x10mg | KRK | SLO |
| 49005 | ATORIS 10 | por tbl flm 60x10mg | KRK | SLO |
| 49006 | ATORIS 10 | por tbl flm 90x10mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.14 | C10AA05 | atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 11.00 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 19592 | TORVACARD 20 | por tbl flm 30x20mg | ZEH | CZ |
| 19593 | TORVACARD 20 | por tbl flm 90x20mg | ZEH | CZ |
| 20166 | TULIP 20 MG | por tbl flm 30x20mg | LEK | SLO |
| 42056 | TULIP LEK 20 MG POTAHOVANÉ TBL | por tbflfm30x20mg | LEK | SLO |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|---------------------|-----|-----|
| 49007 | ATORIS 20 | | por tbl flm 30x20mg | KRK | SLO |
| 49008 | ATORIS 20 | | por tbl flm 60x20mg | KRK | SLO |
| 49009 | ATORIS 20 | | por tbl flm 90x20mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 84.15 | C10AA05 | atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 14.50 | P |
| 84.16 | C10AA05 | atorvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 29.00 | P |
| 84.17 | C10AA07 | rosuvastatin (do 10 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 19.26 | P |
| 84.18 | C10AA07 | rosuvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 28.89 | P |
| 84.19 | C10AA07 | rosuvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 43.34 | P |

A) Léčba atorvastatinem (10 a 20mg), simvastatinem (10,20 a 40mg), fluvastatinem (20 a 40mg) a lovastatinem (20,40 a 80mg) a pravastatinem (20 a 40mg) je indikována u nemocných s hypercholesterolémii a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem hodnota LDL-cholesterolu, jejíž cílová hodnota je stanovena na 3,0mmol/l. Kombinaci hypolipidemik může indikovat a předepisovat pouze kardiolog, internista, lékař lipidologické poradny a diabetolog.

B) Léčba atorvastatinem (v dávce vyšší než 20mg), fluvastatinem (v dávce vyšší než 40mg) či rosuvastatinem je předepisována kardiologem, internistou, diabetologem, angiologem nebo lékařem lipidologické poradny u nemocných s hypercholesterolémii a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% a kdy nelze dosáhnout cílových hodnot (LDL ≤ 3,0mmol/l) statiny uvedenými v A) nebo kdy statiny uvedené v bodě A) nelze použít.

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------|------|----|------|
| 85 | hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin | | | | | |
| 85.1 | C10AB | klofibrát (etofyllin) | p.o. | 0.50 | GM | 4.32 |
| 85.2 | C10AB02 | bezafibrat | p.o. | 0.60 | GM | 6.17 |
| 85.3 | C10AB04 | gemfibrozil | p.o. | 1.20 | GM | 6.17 |
| 85.4 | C10AB05 | fenofibrát | p.o. | 0.30 | GM | 6.17 |
| 85.5 | C10AB05 | fenofibrát (mikronované lékové formy) | p.o. | 1.00 | DF | 6.82 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| 04143 | APO-FENO | | por cpsdur 30x200mg | APT | CND |
| 04145 | APO-FENO | | por cpsdur100x200mg | APT | CND |
| 13337 | LIPOHEXAL 250 RETARD | | por cps ret60x250mg | SFS | D |
| 13338 | LIPOHEXAL 250 RETARD | | por cps ret90x250mg | SFS | D |
| 13596 | LIPIREX 267 MG | | por cps dur30x267mg | SGY | B |
| 13598 | LIPIREX 267 MG | | por cps dur60x267mg | SGY | B |
| 14316 | FENOFIX 200 | | por cps dur90x200mg | IXP | CZ |
| 15501 | APO-FENO | | por cps dur30x200mg | CMG | IRL |
| 15503 | APO-FENO | | por cpsdur100x200mg | CMG | IRL |
| 16597 | APO-FENO | | por cps dur30x200mg | KAT | NL |
| 16599 | APO-FENO | | por cpsdur100x200mg | KAT | NL |
| 32652 | FEBIRA 200 | | por cps dur30x200mg | ZEH | SK |
| 32653 | FEBIRA 200 | | por cps dur60x200mg | ZEH | SK |
| 32654 | FEBIRA 200 | | por cps dur90x200mg | ZEH | SK |
| 32722 | FENOFIX 200 | | por cps dur30x200mg | IXP | CZ |
| 41797 | LIPIREX 200MG | | por cps dur60x200mg | SGY | B |
| 56460 | LIPIREX 200MG | | por cps dur30x200mg | SGY | B |

| | | | | |
|-------|----------------------|---------------------|-----|---|
| 58769 | LIPOHEXAL 250 RETARD | por cps ret30x250mg | SFS | D |
| 58770 | LIPOHEXAL 250 RETARD | por cpsret100x250mg | SFS | D |
| 99839 | LIPIREX S 160 MG | por cps dur60x160mg | SGY | B |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|-------------|-------|----|-------|---|
| 85.6 | C10AB05 | fenofibrát (supramikronisované formy) | lékové p.o. | 1.00 | DF | 8.55 | |
| 85.7 | C10AB08 | ciprofibrát | p.o. | 0.10 | GM | 6.82 | |
| 85.8 | C10AC01 | cholestyramin | p.o. | 14.00 | GM | 31.09 | P |
| 85.9 | C10AC02 | colestipol | p.o. | 20.00 | GM | 31.09 | P |

Léčbu cholestyraminem a colestipolem předepisuje gastroenterolog, kardiolog, internista, nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) u pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
- b) u pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|-------|---|
| 85.10 | C10AD06 | acipimox | p.o. | 500.00 | MG | 10.59 | |
| 85.11 | C10AX09 | ezetimib | p.o. | 10.00 | MG | 46.00 | P |

Ezetimib je určen pro kombinační léčbu se statinu (tj. je indikován v případě použití ve druhé volbě). Léčbu ezetimibem předepisuje specialista (kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař lipidologické poradny) u nemocných s těžkou rezistentní hyperlipoproteinemií (familiární hypercholesterolémie), u kterých nevedla léčba vyššími dávkami statinů, trvající alespoň 6 měsíců k dosažení cílových hodnot LDLcholesterolu ($LDL \leq 3,0 \text{ mmol/l}$). Za vyšší dávku statinu je považováno 40 mg simvastatinu, 40 mg atorvastatinu, 80 mg fluvastatinu a lovastatinu, 20 mg rosuvastatinu. V kombinaci s ezetimibem jsou indikovány základní dávky statinu (tj. do 40 mg simvastatinu a atorvastatinu, do 80 mg fluvastatinu a lovastatinu a do 20 mg rosuvastatinu). Pokud kombinační léčba není účinná (nebylo dosaženo výše uvedených cílových hodnot LDL cholesterolu) po 3 měsících léčby, je ezetimib vysazen.

Ezetimib je dále předepisován uvedenými speciality u nemocných, u kterých vedla léčba statiny k významným a rádně dokumentovaným nežádoucím účinkům: elevaci aminotransferáz na více než trojnásobek a CK na více než pětinásobek normálních hodnot. Za neúčinnost léčby je považováno, pokud po 3 měsících léčby nedojde k aditivnímu poklesu LDL cholesterolu alespoň o 10% ve srovnání s monoterapií statinem.

| | | |
|------|--|--------------------|
| 86 | Ostatní léčiva používaná u nemoci kardiovaskulárního systému | |
| 86.1 | C01CX08 | levosimendan |
| 86.2 | C01DA02 | glycerol trinitrát |

| | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-----|---|
| 04307 | NITRO POHL INFUS. | inf 10x10ml/10mg | PLB | D |
|-------|-------------------|------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 86.3 | C01DA08 | isosorbid dinitrát | parent. | 20.00 | MG | 123.96 | H |
| 86.4 | C01DX03 | oxifedrin | parent. | 40.00 | MG | 13.78 | H |
| 86.5 | C01DX12 | molsidomin | parent. | 6.00 | MG | 105.38 | H |

| | | |
|----|---|--|
| 87 | antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů | |
|----|---|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 87.1 | D01AA01 | nystatin | lok. | 1.00 | GM | 2.68 | |
| 87.2 | D01AA02 | natamycin | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 87.3 | D01AC01 | klotrimazol do 20 g včetně | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |

| | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----|---|
| 65484 | CLOTRIMAZOL AL 1% | crm 1x20gm 1% | APA | D |
|-------|-------------------|---------------|-----|---|

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|------|------|----|------|--|--|
| 87.4 | D01AC01 | klotrimazol nad 20 g | lok. | 1.00 | GM | 1.52 | | |
| 86397 CLOTRIMAZOL AL 1% crm 1x50gm 1% APA D | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 87.5 | D01AC01 | klotrimazol tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | GM | 2.54 | |
| 87.6 | D01AC02 | mikonazol | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.7 | D01AC03 | ekonazol (lékové formy tekuté, lipogel a pasty) | lok. | 1.00 | GM | 3.16 | |
| 87.8 | D01AC03 | ekonazol lékové formy krému | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.9 | D01AC05 | isokonazol | lok. | 1.00 | ML | 1.77 | |
| 87.10 | D01AC08 | ketokonazol | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.11 | D01AC10 | bifonazol | lok. | 1.00 | GM | 2.49 | |
| 87.12 | D01AC11 | oxikonazol | lok. | 1.00 | GM | 2.49 | |
| 87.13 | D01AC12 | fenticonazol | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.14 | D01AC14 | sertakonazol | lok. | 1.00 | GM | 2.49 | |
| 87.15 | G01AF18 | flutrimazol, lékové forma gelu | lok. | 1.00 | GM | 3.06 | |
| 87.16 | G01AF18 | flutrimazol, lékové forma krém a spray | lok. | 1.00 | GM | 4.70 | |
| 87.17 | D01AC20 | kombinace | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.18 | D01AC51 | clotrimazol/urea | lok. | 1.00 | GM | 1.77 | |
| 87.19 | D01AC60 | bifonazol, kombinace | lok. | 1.00 | GM | 13.41 | P |

Léčbu předepisuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením.

88 Ostatní antimykotika k lokálnímu použití

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 88.1 | D01AE | jiná antimykotika k zevnímu použití | lok. | 1.00 | ML | 0.78 | |
| 88.2 | D01AE | naftini hydrochlorid | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 88.3 | D01AE04 | kyselina undecylenová | lok. | 1.00 | GM | 0.97 | |

00871 MYKOSEPTIN ung 1x30gm ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 88.4 | D01AE14 | ciclopirox | lok. | 1.00 | GM | 3.79 | |
| 88.5 | D01AE15 | terbinafin | lok. | 1.00 | GM | 3.79 | |
| 88.6 | D01AE16 | amorolfin | lok. | 1.00 | MG | 3.35 | |
| 88.7 | D01AE18 | tolnaftat | lok. | 1.00 | GM | 1.83 | |
| 88.8 | D01AE19 | tolciklát | lok. | 1.00 | GM | 1.83 | |
| 88.9 | D01AE20 | kombinace antimykotik (ostatní kombinace) | lok. | 1.00 | GM | 0.64 | |
| 88.10 | D01AE20 | kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid) | lok. | 1.00 | GM | 1.83 | |

89 emolliencia a protektiva

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 89.1 | D02AB | přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 0.51 | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

54249 SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC. sus 1x100gm HEO CZ

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.2 | D02AC | měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 0.59 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.3 | D02AC | měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | ML | 0.59 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.4 | D02AC | měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.43 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.5 | D02AC | měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | ML | 0.43 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.6 | D02AC | měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně) | lok. | 1.00 | ML | 0.65 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|
| 89.7 | D02AC | měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení) | lok. | 1.00 | ML | 0.47 | L/DER,PED |
|------|-------|---|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|-----------|
| 89.8 | D02AE01 | měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy | lok. | 1.00 | ML | 0.46 | L/DER,PED |
|------|---------|--|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|---------|------|------|------|----|------|-----------|
| 89.9 | D02AE01 | urea | lok. | 1.00 | GM | 0.46 | L/DER,PED |
|------|---------|------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 89.10 | D02AE51 | kombinace kyseliny salicylové s ureou | lok. | 1.00 | GM | 1.00 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 89.11 | D02AX | jiná emolientia a protektiva (do 50 g v balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.71 | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 89.12 | D02AX | jiná emolientia a protektiva (nad 50 g v balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.64 | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 90 | | léčiva pro léčbu ran a vředů | | | | | |
|----|--|------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 90.1 | D03AX | jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl) | lok. | 1.00 | ML | 0.49 | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|--|
| 90.2 | D03AX | jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 90.3 | D03AX | jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 1.42 | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 90.4 | D03AX | jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy roztoku) | lok. | 1.00 | ML | 3.91 | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 90.5 | D03AX02 | dextranomer | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
|------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 90.6 | D03BA | proteolytické enzymy (chymotrypsin) | lok. | 1.00 | GM | 79.28 | P |
|------|-------|-------------------------------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|-------|---|
| 90.7 | D03BA | proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza) | lok. | 1.00 | GM | 14.02 | P |
|------|-------|--|------|------|----|-------|---|

02594 FIBROLAN MAST ung 1x25gm

PDA F

48200 FIBROLAN MAST ung 1x25gm

PPO F

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 90.8 | D03BA | proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin) | lok. | 1.00 | GM | 28.84 | P |
| 90.9 | D03BA52 | proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 18.57 | P |
| 90.10 | D03BA52 | proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 16.62 | P |

Léčbu proteolytickými enzymy předepisuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog k:

- a) léčbě běrových vředu,
- b) léčbě nekrotických pouzárových nebo pooperačních ran,
- c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

91 Antipsoriatiáka

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 91.1 | D05AA | dehyt | lok. | 1.00 | GM | 0.73 | |
| 55290 | UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM | drm ung 1x100gm | MVM | CZ | | | |
| 83870 | UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM | drm ung 1x1kg | MVM | CZ | | | |
| 85950 | SUSPENSIO VIŠNĚVSKI+PICE LIQUID | sus 1x1000gm | HEO | CZ | | | |
| 91.2 | D05AA | dehyt (odbarvený dehet) | lok. | 1.00 | GM | 1.17 | |
| 91.3 | D05AC01 | dithranol | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
| 91.4 | D05AD02 | methoxalen (0,15 % koncentrace) | lok. | 1.00 | ML | 4.05 | |
| 90618 | OXSORALEN | liq 1x50ml 0.15% | GER | A | | | |
| 91.5 | D05AX02 | calcipotriol | lok. | 1.00 | GM | 9.00 | P |
| 91.6 | D05AX03 | calcitriol | lok. | 1.00 | GM | 9.00 | P |
| 91.7 | D05AX04 | tacalcitol | lok. | 1.00 | GM | 18.00 | P |
| 91.8 | D05AX05 | tazaroten | lok. | 1.00 | GM | 18.00 | P |
| 91.9 | D05AX52 | kalcipotriol, kombinace | lok. | 1.00 | GM | 9.90 | P |

Léčbu deriváty vitaminu D včetně kombinací v lokálních lékových formách předepisuje dermatolog k:

léčbě torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|-------|----|-------|-------|
| 91.10 | D05BA02 | methoxalen | p.o. | 10.00 | MG | 3.81 | L/DER |
| 03733 | OXSORALEN | cps 50x10mg | GER | A | | | |
| 91.11 | D05BB01 | etretinát | p.o. | 35.00 | MG | 73.02 | P |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|
| 91.12 | D05BB02 | acitretin | p.o. | 35.00 | MG | 73.02 | P |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|

Léčbu etretinátem a acitretinem předepisuje dermatolog

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy a u všech forem pustulózní psoriázy nereagující na jinou léčbu
- b) léčba m. Darier, ichthyóz a jiných poruch keratinizace, léčba lichen planus, lupus erythematoses nereagujících na jinou léčbu
- c) léčby kožních T-lymfomů

92 antibiotika k zevnímu použití

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 92.1 | D06AA | tetracyklin a deriváty | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 92.2 | D06AX | neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku) | lok. | 1.00 | ML | 3.83 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|-------|--|
| 92.3 | D06AX | neomycin/bacitracin (mast) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 92.4 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně) | lok. | 1.00 | GM | 13.69 | |
| 92.5 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 7.63 | |
| 92.6 | D06AX | neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 2.70 | |

01063 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm IHO CZ
 48261 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm BHN CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 92.7 | D06AX | primycin | lok. | 1.00 | GM | 2.44 | |
| 92.8 | D06AX01 | acidum fusidicum | lok. | 1.00 | GM | 4,00 | |
| 92.9 | D06AX02 | chloramfenikol | lok. | 1.00 | GM | 2.88 | |
| 92.10 | D06AX09 | mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 6.65 | |
| 92.11 | D06AX09 | mupirocin (nad 5 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 4.00 | |

93 antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|-----------|
| 93.1 | D06BA | sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.08 | L/DER,CHI |
| 93.2 | D06BA | sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.98 | L/DER,CHI |
| 93.3 | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.40 | L/DER,CHI |
| 93.4 | D06BA01 | sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 1.12 | L/DER,CHI |
| 93.5 | D06BA02 | sulfathiazol | lok. | 1.00 | GM | 0.98 | |
| 93.6 | D06BA03 | matenic | lok. | 1.00 | GM | 0.98 | L/DER,CHI |
| 93.7 | D06BA51 | sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému) | lok. | 1.00 | GM | 5.73 | L/DER,CHI |

14877 IALUGEN PLUS crm 1x60gm ISR CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|--------|-----|-------|-----------|
| 93.8 | D06BA51 | sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti) | lok. | 100.00 | CM2 | 13.49 | L/DER,CHI |
| 93.9 | D06BB04 | podophylotoxin | lok. | 1.00 | GM | 15.00 | L/DER |
| 93.10 | D06BX01 | metronidazol | lok. | 1.00 | GM | 2.25 | L/DER,CHI |

94 středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 94.1 | D07AA02 | hydrokortison | lok. | 1.00 | GM | 3.31 | |
| 94.2 | D07AA03 | prednisolon | lok. | 1.00 | GM | 3.18 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|------|----|------|--|
| 94.3 | D07AB01 | klobetazon | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.4 | D07AB02 | hydrokortison butyrát | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 09305 | LOCOID 0.1% | | crm 1x30gm | YEU | NL | | |
| 09307 | LOCOID 0.1% LOTION | | lot 1x30ml | YEU | NL | | |
| 09310 | LOCOID 0.1% | | ung 1x30gm | YEU | NL | | |
| 62047 | LOCOID LIPOCREAM 0.1% | | crm 1x30gm | YEU | NL | | |
| 94.5 | D07AB03 | flumetason | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.6 | D07AB07 | flupredniden | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.7 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy lotia) | lok. | 1.00 | ML | 2.83 | |
| 16441 | TRIAMCINOLON-IVAX | | drm sol 1x30gm | IXP | CZ | | |
| 66167 | TRIAMCINOLON-GALENA | | drm sol 1x30gm | IXP | CZ | | |
| 94.8 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 2.55 | |
| 41040 | TRIAMCINOLON HBF | | drm crm 1x30gm | HEO | CZ | | |
| 94.9 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 | GM | 0.73 | |
| 94.10 | D07AB09 | triamcinolon (lékové formy tinktury) | lok. | 1.00 | ML | 0.98 | |
| 94.11 | D07AB10 | alclomethason | lok. | 1.00 | GM | 3.08 | |
| 94.12 | D07AB19 | dexamethason acetát | lok. | 1.00 | GM | 3.09 | |
| 02415 | DEXAMETHAZON LÉČIVA CRM | | drm crm 1x10gm | ZEH | CZ | | |
| 95 | velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace | | | | | | |
| 95.1 | D07AC01 | betamethason dipropionát | lok. | 1.00 | GM | 2.18 | |
| 98032 | DIPROSONE | | ung 1x30gm | SCH | B | | |
| 95.2 | D07AC01 | betamethason valerát | lok. | 1.00 | GM | 2.95 | |
| 95.3 | D07AC02 | fluklorolon | lok. | 1.00 | GM | 3.32 | |
| 95.4 | D07AC04 | fluocinolon gel | lok. | 1.00 | GM | 2.44 | |
| 95.5 | D07AC04 | fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 95.6 | D07AC04 | fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%) | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
| 95.7 | D07AC04 | fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025%) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 95.8 | D07AC04 | fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%) | lok. | 1.00 | GM | 3.91 | |
| 95.9 | D07AC06 | diflukortolon | lok. | 1.00 | GM | 3.42 | |
| 95.10 | D07AC08 | fluocinonid | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---------------|
| 95.11 | D07AC09 | budesonid | lok. | 1.00 | GM | 3.18 | L/DER |
| 95.12 | D07AC12 | halometason | lok. | 1.00 | GM | 3.27 | |
| 95.13 | D07AC13 | mometazon do 10g v 1 balení včetně | lok. | 1.00 | GM | 6.70 | L/DER,ALG,PED |
| 95.14 | D07AC13 | mometazon nad 10g v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 5.00 | L/DER,ALG,PED |
| 95.15 | D07AC14 | methylprednisoloni aceponas | lok. | 1.00 | GM | 5.87 | L/DER,ALG,PED |
| 95.16 | D07AC17 | flutikason | lok. | 1.00 | GM | 3.42 | |
| 95.17 | D07AC18 | prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 6.70 | L/DER,ALG,PED |
| 95.18 | D07AC18 | prednikarbat (nad 10 g v 1 balení) | lok. | 1.00 | GM | 5.87 | L/DER,ALG,PED |
| 95.19 | D07AD01 | klobetasol | lok. | 1.00 | GM | 3.93 | L/DER |
| 95.20 | D07AD02 | halcinonid | lok. | 1.00 | ML | 3.93 | L/DER |

16890 BETACORTON drm sol 1x100ml SBT SK

97020 BETACORTON drm sol 1x100ml SEG CH

| 96 kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky | | | | | | | |
|---|---------|--|------|------|----|------|--|
| 96.1 | D07BA01 | prednisolon/cloroxin | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 96.2 | D07BA01 | prednisolon/hexamidin diisothionát | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 96.3 | D07BB01 | flumetason a antiseptika | lok. | 1.00 | GM | 3.32 | |
| 96.4 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 1.92 | |

04178 TRIAMCINOLON E LÉČIVA ung 1x20gm LEX CZ

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 96.5 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny) | lok. | 1.00 | GM | 1.42 | |
| 96.6 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 | GM | 0.59 | |
| 96.7 | D07CA01 | hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 96.8 | D07CA01 | hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy) | lok. | 1.00 | ML | 1.96 | |
| 96.9 | D07CA01 | hydrocortison a kys. fusidová (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 4.40 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 96.10 | D07CC01 | betamethason a gentamicin | lok. | 1.00 | GM | 2.50 | |
| 96.11 | D07CC01 | betamethason a kyselina fusidová (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 4.40 | |

| 97 kortikosteroidy v jiných kombinacích | | | | | | | |
|---|---------|---|------|------|----|------|--|
| 97.1 | D07BB03 | triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury) | lok. | 1.00 | ML | 1.60 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 97.2 | D07XA01 | hydrokortison | lok. | 1.00 | ML | 1.96 | |
| 97.3 | D07XA02 | prednisolon/kyselina salicylová | lok. | 1.00 | ML | 1.32 | |
| 97.4 | D07XB01 | flumetason/dehet | lok. | 1.00 | GM | 4.40 | |
| 97.5 | D07XB01 | flumethason pivalat/kyselina salicylová | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 97.6 | D07XB02 | triamcinolon | lok. | 1.00 | GM | 1.87 | |
| 97.7 | D07XC | diflucortolon/isoconasol | lok. | 1.00 | GM | 2.61 | |
| 97.8 | D07XC01 | betamethason (lékové formy mastí a krémů) | lok. | 1.00 | GM | 2.61 | |

85864 BELOSALIC drm ung 1x30gm BLU CHO

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 97.9 | D07XC01 | betamethason (lékové formy tinktur) | lok. | 1.00 | ML | 2.61 | |
| 97.10 | D07XD | halcinonid/kyselina salicylová | lok. | 1.00 | ML | 3.51 | |
| 97.11 | D07XD | halcinonid/močovina | lok. | 1.00 | GM | 3.51 | |

16888 BETACORTON U drm crm 1x20gm SBT SK

16893 BETACORTON U MASTNÝ KRÉM drm.crm.1x20gm SBT SK

98 antiseptika a desinficiencia

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------|----------|----|--------|--|
| 98.1 | D08AC02 | chlorhexidin | lok. | 1 000.00 | ML | 178.70 | |
| 98.2 | D08AD | kyselina boritá (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 0.32 | |
| 65998 UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA ung 1x1000gm (dÓza) HEO CZ | | | | | | | |
| 98.3 | D08AD | kyselina boritá (lékové formy roztoků) | lok. | 10.00 | GM | 1.32 | |
| 98.4 | D08AG02 | polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |

16320 BRAUNVIDON MAST long 1x100gm-tuba BMM D

84421 BRAUNOVIDON MAST long IV bag/tube BSWI D
long 1x100cm tube BMBI CH

| | | | | | | | | |
|------|---------|---|--------|--|------|----|------|--|
| 98.5 | D08AG02 | polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku) v jednom balení) | lokal. | | 1.00 | ML | 0.64 | |
|------|---------|---|--------|--|------|----|------|--|

02981 JODISOL ROZTOK liq 1x80gm SDH CZH

98.6 D08AG02 polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku) lok. 1.00 ML 0.49

02983 JODISOL ROZTOK liq 1x760gm SDH CZ

15877 BRAUNSTEIN DRUG CO. INC. 1x250ml BMM D

15879 BRAUNCL 0011551 TX250M BMMI D
15880 BRAUNCL 1111551 TX250M BMMI D

15880 BRAUNUL drm sol 1x500ml BMM D

46055 BRAUNOL liq 1x250ml BMB CP

46056 BRAUNOL liq 1x500ml BMB CH

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 98.7 | D08AG02 | polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení) | lok. | 1.00 | GM | 0.64 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|------|------|----|------|--|
| 98.8 | D08AH | kloroxin | lok. | 1.00 | GM | 0.78 | |
|------|-------|----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 98.9 | D08AJ | bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | ML | 0.29 | |
|------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|---|
| 98.10 | D08AJ | bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení) | lok. | 1.00 | ML | 0.08 | H |
|-------|-------|---|------|------|----|------|---|

58237 AJATIN PROFARMA TINKTURA tct 1x1000ml PSR CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|---|
| 98.11 | D08AJ | chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně) | lok. | 1.00 | ML | 0.08 | H |
|-------|-------|---|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|------|------|----|--------|---|
| 98.12 | D08AX | hexamidin/chlorhexidin | lok. | 1.00 | GM | 121.37 | H |
|-------|-------|------------------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------|------|------|----|--------|---|
| 98.13 | D08AX | noxytiolin | lok. | 2.50 | GM | 492.11 | H |
|-------|-------|------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|------|------|----|--------|---|
| 98.14 | D08AX | noxytiolin/tetrakain | lok. | 2.50 | GM | 492.11 | H |
|-------|-------|----------------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|------|------|----|-------|---|
| 98.15 | D08AX | taurodin | lok. | 1.00 | GM | 94.48 | H |
|-------|-------|----------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 99 | Iléčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.1 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně) | lok. | 1.00 | GM | 3.69 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

15389 RETIN-A 0.025% drm.crm 1x30gm JAN B

49985 LOCACID crm 1x30gm 0.05% PRH F

66170 LOCACID crm 1x30gm 0.05% PFH F

97573 RETIN-A KRÉM 0.025% drm.crm 1x30gm CIL CH

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.2 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%) | lok. | 1.00 | GM | 4.40 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 99.3 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 3.70 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

64956 AIROL lot 1x50ml 0.05% PRH F

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.4 | D10AD01 | tretinoïn (lékové formy roztoků do koncentrace nad 0,05%) | lok. | 1.00 | ML | 4.40 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 99.5 | D10AD03 | adapalen - léková forma krémů a gelů | lok. | 1.00 | GM | 4.00 | |
|------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.6 | D10AD54 | isotretinoïn a erythromycin v kombinaci | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 99.7 | D10AE01 | benzoyl peroxid (koncentrace 20%) | lok. | 1.00 | ML | 2.54 | |
|------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.8 | D10AE01 | benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů) | lok. | 1.00 | GM | 1.42 | |
|------|---------|---|------|------|----|------|--|

47279 ECLARAN 5 drm.gel 1x45gm PFG F

| | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 99.9 | D10AE01 | benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií) | lok. | 1.00 | ML | 0.39 | |
|------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 99.10 | D10AF01 | klindamycin (tekuté lékové formy) | lok. | 1.00 | ML | 1.96 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.11 | D10AF01 | klindamycin (lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 99.12 | D10AF02 | erythromycin (lékové formy krémů a mastí) | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 99.13 | D10AF02 | erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | ML | 2.01 | |

98204 ERYFLUID sol 1x30ml PFH F

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 99.14 | D10AF02 | erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení | lok. | 1.00 | ML | 1.62 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

75285 ERYFLUID sol 1x100ml PFH F

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|-------|
| 99.15 | D10AF52 | erythromycin v kombinaci se zinkem | lok. | 1.00 | ML | 2.93 | |
| 99.16 | D10AF52 | erythromycin v kombinaci s tretinoinem | lok. | 1.00 | ML | 3.75 | |
| 99.17 | D10AX03 | kyselina azelaová | lok. | 1.00 | GM | 1.96 | |
| 99.18 | D10BA01 | isotretinooin (do 10 MG včetně v jedné kapsli) | p.o. | 30.00 | MG | 65.90 | X |
| 99.19 | D10BA01 | isotretinooin (nad 10 MG v jedné kapsli) | p.o. | 30.00 | MG | 59.40 | X |
| 99.20 | D11AX | celulóza (lékové formy zásypů) | lok. | 1.00 | GM | 9.78 | L/DER |

100 ostatní léčiva používaná u nemocí kůže

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|
| 100.1 | D04AB01 | lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%) | lok. | 1.00 | GM | 4.26 | O |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---|

46125 LIDOCAIN 10% spr 1x38gm EGI H

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 100.2 | D11AF | fluorouracil (lékové formy mastí) | lok. | 1.00 | GM | 13.15 | L/DER,ONK |
| 100.3 | D11AF | fluorouracil (lékové formy roztoků) | lok. | 1.00 | ML | 11.50 | L/DER |
| 100.4 | D11AX14 | tacrolimus v koncentraci 0,03% | lok. | 1.00 | GM | 28.80 | P |
| 100.5 | D11AX14 | tacrolimus v koncentraci 0,1% | lok. | 1.00 | GM | 31.50 | P |

Léčbu tacrolimem předepisuje dermatovenerolog u pacientů s atopickou dermatitidou (AD), kteří netolerují klasickou terapii, nebo kteří na klasické terapii selhávají:

- a) u dětí do 6 let, které trpí středně těžkou a těžkou AD na hlavě a krku (4,5 - 9 klasifikace dle Rajka-Langeland),
- b) u starších dětí a dospělých, kteří trpí těžkou AD na hlavě a krku (8 – 9 klasifikace dle Rajka - Langeland).

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|
| 100.6 | D11AX15 | pimecrolimus | lok. | 1.00 | GM | 28.80 | P |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu pimecrolimem předepisuje dermatovenerolog u pacientů s atopickou dermatitidou (AD), kteří netolerují klasickou terapii, nebo kteří na klasické terapii selhávají - u dětí, které trpí středně těžkou AD na hlavě a krku (4,5 – 7,5 klasifikace dle Rajka - Langeland).

101 gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|--------|----|------|--|
| 101.1 | G01AA01 | nystatin | vag. | 100.00 | KU | 0.98 | |
| 101.2 | G01AA02 | natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg) | vag. | 25.00 | MG | 6.64 | |

78213 PIMAFUCIN

glo vag 3x100mg

YEU NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 101.3 | G01AA02 | natamycin (lékové formy s obsahem méně vag. než 100 mg) | vag. | 25.00 | MG | 4.11 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 101.4 | G01AA10 | klindamycin (lékové formy krémů) | vag. | 1.00 | GM | 11.00 | P |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu vaginálním klindamycinem předepisuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na klindamycin.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 101.5 | G01AA51 | nystatin kombinace s nifuratem (lékové vag. formy vag. čípků) | vag. | 1.00 | DF | 17.00 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 101.6 | G01AA51 | nystatin kombinace s nifuratem (lékové vag. formy vag. krémů) | vag. | 5.00 | GM | 33.95 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.7 | G01AA51 | nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem | vag. | 1.00 | DF | 11.30 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 101.8 | G01AF01 | metronidazol | vag. | 0.50 | GM | 3.34 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

02430 ENTIZOL tbl vag 10x500mg ZPF PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 101.9 | G01AF02 | klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.10 | GM | 12.68 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

68917 JENAMAZOL 2% crm vag 20gm+aplik. VJP D

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 101.10 | G01AF02 | klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet) | vag. | 0.10 | GM | 8.10 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

58653 CLOTRIMAZOL AL 100 tbl vag 6x100mg+apl APA D

58654 CLOTRIMAZOL AL 200 tbl vag 3x200mg+apl APA D

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 101.11 | G01AF04 | mikonazol | vag. | 0.10 | GM | 8.70 | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.12 | G01AF05 | ekonazol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.10 | GM | 12.78 | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 101.13 | G01AF05 | ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků) | vag. | 0.10 | GM | 30.99 | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 101.14 | G01AF11 | ketoconazol | vag. | 0.40 | GM | 13.44 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 101.15 | G01AF12 | fenticonazol | vag. | 0.10 | GM | 13.44 | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|--|
| 101.16 | G01AF17 | oxikonazol | vag. | 0.60 | GM | 109.90 | |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 101.17 | G01AF20 | kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol (lékové formy vag. tablet) | vag. | 1.00 | DF | 6.35 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 101.18 | G01AG02 | terkonazol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 80.00 | MG | 12.88 | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 101.19 | G01AG02 | terkonazol (lékové formy vaginálních tablet) | vag. | 80.00 | MG | 31.28 | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 101.20 | G01AX12 | ciclopirox (vaginální čípky) | vag. | 1.00 | DF | 31.28 | |
|--------|---------|------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 101.21 | G01AX12 | ciclopirox (vaginální roztok) | vag. | 1.00 | DF | 17.60 | |
|--------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 101.22 | G01AX12 | ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení) | vag. | 1.00 | GM | 4.69 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 101.23 | G01AX12 | ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení) | vag. | 1.00 | GM | 3.11 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 102 | gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 102.1 | G01AX | jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný) | vag. | 1.00 | DF | 6.40 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|--|
| 102.2 | G01AX | laktobacillus | vag. | 1.00 | DF | 10.26 | |
|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|
| 102.3 | G01AX | nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků) | vag. | 1.00 | DF | 17.60 | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|
| 102.4 | G01AX | nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 5.00 | GM | 35.19 | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|------|------|----|------|--|
| 102.5 | G01AX | nitrofurantoin | vag. | 0.20 | GM | 2.99 | |
|-------|-------|----------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|------|------|----|------|--|
| 102.6 | G01AX | sulfathiazol | vag. | 1.00 | DF | 6.60 | |
|-------|-------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|-------|----|------|--|
| 102.7 | G01AX03 | polykresulen | vag. | 90.00 | MG | 0.38 | |
|-------|---------|--------------|------|-------|----|------|--|

41965 VAGOTHYL sol 1x50gm PBA PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|
| 102.8 | G01AX11 | polyvidon-jód (vaginální čípky) | vag. | 0.20 | GM | 8.94 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|
| 102.9 | G01AX11 | polyvidon-jód (vaginální gel) | vag. | 0.20 | GM | 6.16 | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 102.10 | G01AX14 | laktobacillus a estriol – vaginální tablety | vag. | 1.00 | DF | 16.13 | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------|------|------|----|------|--|
| 102.11 | G02CC03 | benzydamin hydrochlorid | vag. | 1.00 | DF | 8.00 | |
|--------|---------|-------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 103 | léčiva zvyšující tonus dělohy | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Léčbu předepisuje gynekolog u:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- d) v porodním období při závažné metrorragii.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|-------|--|
| 103.1 | G02AB01 | methylergometrin | parent. | 0.20 | MG | 18.00 | |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 103.2 | G02AB02 | ergotové alkaloidy | p.o. | 0.20 | MG | 1.12 | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 103.3 | G02AB03 | ergometrin | p.o. | 0.20 | MG | 1.12 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|--|
| 103.4 | G02AB03 | ergometrin | parent. | 0.20 | MG | 9.38 | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|-----|
| 103.5 | G02AD01 | dinoprost | parent. | 25.00 | MG | 651.85 | K/P |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 103.6 | G02AD02 | dinoproston | p.o. | 0.50 | MG | 84.02 | H |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|-----|
| 103.7 | G02AD02 | dinoproston | parent. | 0.50 | MG | 389.86 | K/P |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|-----|
| 103.8 | G02AD02 | dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně) | vag. | 1.00 | DF | 770.00 | K/P |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|----------|-----|
| 103.9 | G02AD02 | dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně) | vag. | 1.00 | DF | 1 111.90 | K/P |
|-------|---------|--|------|------|----|----------|-----|

103.10 G02AD02 dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce) vag. 1.00 DF 357.19 K/P

103.11 G02AD02 dinoproston (pesan) vag. 1.00 DF 2 200.00 K/P

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----|
| 103.12 | G02AD04 | karboprost | parent. | 0.25 | MG | 633.92 | K/P |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----|

10734 PROSTIN 15 M INJ. inj 1x1ml/250rg PMB B

103.13 G02AD05 sulproston parent. 0.50 MG 651.85 K/P

104 léčiva snižující tonus dělohy

104.1 G02CA hexoprenalin p.o. 1.50 MG 10.12 P

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---------|-------|----|-------|-----|
| 104.2 | G02CA | hexoprenalin | parent. | 25.00 | RG | 45.36 | U/P |
|-------|-------|--------------|---------|-------|----|-------|-----|

46293 GYNIPRAL 25MCG KONC.PRO PŘ. INF. inf cnc sol 5x5ml NYC A

75463 GYNIPRAL 10 MCG/2ML ini sol 5x2ml/1Org NYC A

75464 GYNIPRAL 25MCG KONZEN ZUR INF. inf 5x5ml/25rg HNP A

104.3 G02CA01 ritodrin p.o. 40.00 MG 23.14 P

104.4 G02CA01 ritodrin parent. 40.00 MG 45.36 U/P

104.5 G02CA03 fenoterol p.o. 20.00 MG 23.14 P

104.6 G02CA03 fenoterol parent. 0.50 MG 45.36 U/P

Léčbu hexoprenalinem, ritodrinem a fenoterolem předepisuje gynekolog - parenterální formu při zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, léčbě porodní dystokie, intrapartální akutní tokolýze; - p.o. formu pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

104.7 G02CX01 atosiban infuse parent. 1.00 DF 2 511.00 U/P

104.8 G02CX01 atosiban injekce parent. 1.00 DF 817.00 U/P

Atosiban je indikován při předčasné děložní činnosti od 24. týdne gestace do ukončeného 33. týdne těhotenství u těhotných s:
a) diabetes mellitus, b) kardiopatií, c) primární hypotenzi a tendencí ke kolapsovým stavům, d) thyreopatií, e) srdeční arytmii
anebo f) u nichž byla indikována parenterální tokolýza v kontinuálním podání delším než 48 hodin.

105 inhibitory prolaktinu

105.1 G02CB tergurid n.s. 1.00 MG 5.46

105.2 G02CB01 bromokriptin 10.0 5.00 MG 11.43

67514 MEDOCBIRTINE tab 500x2.5mg I MOE CX

105.3 G02CB02 lisurid p.o. 0.60 MG 2.49

105.4 G02CB03 kabergolin 100.00 RG 21.49 P

Kabergolin je indikován při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků s obsahem bromokriptinu) u nemocných s prolaktin secernujícími adenomy hypofýzy a s hyperprolaktinémii jiného původu, u nemocných s akromeglií reagující na léčbu dopaminergními agonisty a u žen v indikacích vyžadujících zástavu laktace.

Za nedostatečnou účinnost léčiv ze skupiny dopaminergních agonistů se považuje:

- a) neschopnost navodit klinickou remisi potíží, tj. u žen obnovu menstruačního krvácení a zástava galaktorey, případně u žen přejících si otěhotnět obnova ovulačních cyklů, u mužů potenci,
 b) neschopnost zabránit růstu prolaktin secerujícího adenomu a u makroadenomů neschopnost zmenšit jeho objem,
 c) v indikaci zástava laktace nedosažení této zástavy obvyklým dávkováním.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|
| 105.5 | G02CB04 | quinagolid | p.o. | 75.00 | RG | 21.49 | Z |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|

| | |
|-----|-------------------------|
| 106 | mužské pohlavní hormony |
|-----|-------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 106.1 | G03BA03 | testosteron | p.o. | 0.12 | GM | 27.37 | L/END,ONK,GYN,SEX,URN |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|------|-----------------------|
| 106.2 | G03BA03 | testosteron | parent. | 18.00 | MG | 8.07 | L/END,ONK,GYN,SEX,URN |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|------|-----------------------|

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|-----------------------|
| 106.3 | G03BB01 | mesterolon | p.o. | 50.00 | MG | 20.04 | L/END,ONK,GYN,SEX,URN |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|-----------------------|

| | |
|-----|--|
| 107 | ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 107.1 | G03CA | přirozené a semisynthetické estrogeny prosté, mestranol | p.o. | 0.15 | MG | 3.76 | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|
| 107.2 | G03CA03 | estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
|-------|---------|--|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|---|
| 107.3 | G03CA03 | estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 4.18 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|---|

Estradiol v p.o. lékové formě předepisuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) při substituční léčba hypogonadismu žen,
 b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|------|--|
| 107.4 | G03CA04 | estriol | p.o. | 1.00 | DF | 3.84 | |
|-------|---------|---------|------|------|----|------|--|

09497 OVESTIN 1 MG tbl 30x1mg ORG NL

31315 OVESTIN 2 MG tbl 30x2mg ORG NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 107.5 | G03CA57 | přírodní konj. estrogeny (do 300 µg včetně v jedné tabletě nebo tobolce) | p.o. | 1.00 | DF | 2.25 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 107.6 | G03CA57 | přírodní konj. estrogeny (nad 300 µg v jedné tabletě nebo tobolce) | p.o. | 1.00 | DF | 4.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | |
|-----|--|
| 108 | ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|--|
| 108.1 | G03CA03 | estradiol | Parent. | 1.00 | MG | 4.35 | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|--|

00364 AGOFOLLIN inj sol 5x1ml/5mg BTA SK

00365 AGOFOLLIN-DEPOT inj 1x2ml/10mg BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 108.2 | G03CA03 | estradiol | vag. | 25.00 | RG | 7,83 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|--------|--------|----|------|---|
| 108.3 | G03CA03 | estradiol (léková forma nosní spray) | inhal. | 300.00 | RG | 5.00 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|--------|--------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 108.4 | G03CA03 | estradiol (lékové formy gelů) | transd. | 1.50 | MG | 5.00 | P |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 108.5 | G03CA03 | estradiol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.20 | MG | 2,46 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|---|
| 108.6 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|---|
| 108.7 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 1.00 | DF | 4.18 | P |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|---|
| 108.8 | G03CA03 | estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu) | transd. | 1.00 | DF | 5.00 | P |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|--------|---|
| 108.9 | G03CA03 | estradiol implantát | parent. | 1.00 | DF | 900.00 | P |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|--------|---|

Estradiol v transd., parent. (implantát) a inhal. lékové formě předepisuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) při substituční léčbě hypogonadismu žen,
- b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|---------|------|----|------|--|
| 108.10 | G03CA03 | estradiol valerat | parent. | 1.00 | MG | 2.37 | |
|--------|---------|-------------------|---------|------|----|------|--|

00529 NEOFOLLIN inj sol 5x1ml/5mg BTA SK

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|----|------|--|
| 108.11 | G03CA04 | estriol | parent. | 2.00 | MG | 4.30 | |
|--------|---------|---------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 108.12 | G03CA04 | estriol (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 0.20 | MG | 1,50 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 108.13 | G03CA04 | estriol (lékové formy vaginálních tablet, do vag. 0,5 mg včetně) | vag. | 0.20 | MG | 2,14 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 108.14 | G03CA04 | estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg) | vag. | 0.20 | MG | 0,93 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 108.15 | G03CA09 | promestrien (lékové formy vaginálních krémů) | vag. | 10.00 | MG | 3,76 | |
|--------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 108.16 | G03CA09 | promestrien (lékové formy vaginálních tobbolek) | vag. | 10.00 | MG | 4,00 | |
|--------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 108.17 | G03CC | promestrien a chlorquinaldol v kombinaci | vag. | 1.00 | DF | 5.50 | |
|--------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 109 | ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|------------------------|
| 109.1 | G03DA02 | medroxyprogesteron | p.o. | 5.00 | MG | 2.94 | L/GYN,URN,END, INT,SEX |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|-------|----|------|---------------|
| 109.2 | G03DA03 | hydroxyprogesteron | parent. | 10.00 | MG | 1.76 | L/GYN,URN,SEX |
|-------|---------|--------------------|---------|-------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|------------------------|
| 109.3 | G03DA04 | progesteron | p.o. | 0.30 | GM | 15.60 | L/GYN,URN,END, INT,SEX |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|------|---------------|
| 109.4 | G03DA04 | progesteron | parent. | 5.00 | MG | 1.00 | L/GYN,URN,SEX |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|------|---------------|
| 109.5 | G03DA04 | progesteron (depotní lékové formy) | parent. | 5.00 | MG | 3.85 | L/GYN,URN,SEX |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|----|----|-------|------------------------|
| 109.6 | G03DA04 | progesteron | vag. | 45 | MG | 15.60 | L/GYN,URN,END, INT,SEX |
|-------|---------|-------------|------|----|----|-------|------------------------|

23221 CRINONE 8% vag gel 6x1.125gm MYB GB

23222 CRINONE 8% vag gel 15x1.125gm MYB GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|----------------------------|
| 109.7 | G03DB01 | dydrogesteron | p.o. | 10.00 | MG | 5.20 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|----------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|----------------------------|
| 109.8 | G03DB04 | nomegestrol | p.o. | 5.00 | MG | 5.20 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|----------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|----------------------------|
| 109.9 | G03DC02 | norethisteron | p.o. | 5.00 | MG | 2.81 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|----------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|-------------------------------|
| 109.10 | G03DC03 | lynestrenol | p.o. | 5.00 | MG | 2.81 | L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER |
| 109.11 | G03DC05 | tibolon | p.o. | 2.50 | MG | 14.50 | P |

Léčbu tibolonom předepisuje gynekolog, endokrinolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|---|-------|--------------------|
| 111.1 | G03GA01 | choriový gonadotrofin (do 500 U v 1ampuli včetně) | parent. | 250.00 | U | 24.59 | L/GYN,END,PED, SEX |
|-------|---------|---|---------|--------|---|-------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|---|-------|--------------------|
| 111.2 | G03GA01 | choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1ampuli) | parent. | 250.00 | U | 10.71 | L/GYN,END,PED, SEX |
|-------|---------|--|---------|--------|---|-------|--------------------|

96314 PREGNYL 5000 inj pso lqf3x5000ut ORG NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|---|-------|--------------------|
| 111.3 | G03GA01 | choriový gonadotrofin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně) | parent. | 250.00 | U | 14.98 | L/GYN,END,PED, SEX |
|-------|---------|---|---------|--------|---|-------|--------------------|

11951 PREGNYL 1500 inj pso lqf3x1500ut ORG NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|---|-------|--------------------|
| 111.4 | G03GA01 | rekombinantní choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli) | parent. | 250.00 | U | 19.60 | L/GYN,END,PED, SEX |
|-------|---------|---|---------|--------|---|-------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|---|--------|---|
| 111.5 | G03GA02 | gonadotrofin lidský | parent. | 75.00 | U | 313.26 | Z |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|---|--------|---|

12979 MENOGON inj sic 10+10xsolv. FEI D

15203 MERIONAL 75 M.J. inj pso lqf 1x75ut ISR CZ

15204 MERIONAL 75 M.J. inj pso lqf 10x75ut ISR CZ

43727 MERIONAL 75 M.J. inj sic 1x75ut+solv IBS CH

43728 MERIONAL 75 M.J. inj sic 10x75ut+sol IBS CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|-------|---|--------|---|
| 111.6 | G03GA02 | gonadotrofin lidský vysoce čistěný | parent. | 75.00 | U | 600.00 | Z |
|-------|---------|------------------------------------|---------|-------|---|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|-------|---|--------|---|
| 111.7 | G03GA04 | urofollitrofin | parent. | 75.00 | U | 381.40 | Z |
|-------|---------|----------------|---------|-------|---|--------|---|

15006 FOSTIMON 75 M.J. inj pso lqf1x75ut+s ISR CZ

15007 FOSTIMON 75 M.J. injpsolqf10x75ut+s ISR CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|-------|---|--------|---|
| 111.8 | G03GA04 | urofollitrofin vysoce čistěný | parent. | 75.00 | U | 488.79 | Z |
|-------|---------|-------------------------------|---------|-------|---|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|---|--------|---|
| 111.9 | G03GA05 | folitrofin alfa | parent. | 75.00 | U | 650.00 | Z |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|---|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|-------|---|--------|---|
| 111.10 | G03GA06 | folitrofin beta | parent. | 75.00 | U | 650.00 | Z |
|--------|---------|-----------------|---------|-------|---|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|---|--------|---|
| 111.11 | G03GA07 | lutropin alfa (rekombinantní lidský luteinizační hormon) | parent. | 75.00 | U | 650.00 | Z |
|--------|---------|--|---------|-------|---|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|------|--------------------|
| 111.12 | G03GB02 | klomifen | p.o. | 9.00 | MG | 1.24 | L/GYN,END,SEX, URN |
|--------|---------|----------|------|------|----|------|--------------------|

42450 CLOMHEXAL 50 tbl 10x50mg SFS D

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 112 | ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|----------------|
| 112.1 | G03HA01 | cyproteron | parent. | 0.10 | GM | 121.67 | L/PSY,SEX, URN |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|----------------|

23342 ANDROCUR DEPOT inj sol 3x3ml/300mg SAG D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|--------|--|
| 112.2 | G03HA01 | cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 166.20 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 112.3 | G03HA01 | cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 55.60 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

03783 ANDROCUR-50 inj 50x50mg SAG D

32094 CYPROPLEX por tbl nob 30x50mg PHM NL

| | | | | | |
|-------|--------------|--|---------------------|-----|----|
| 32095 | CYPROPLEX | | por tbl nob 50x50mg | PHM | NL |
| 32096 | CYPROPLEX | | por tbl nob 50x50mg | PHM | NL |
| 59354 | ANDROCUR 100 | | tbl obd 50x100mg | SUE | F |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|---------------------------|
| 112.4 | G03XA01 | danazol | p.o. | 0.60 | GM | 78.16 | L/GYN,END,HEM, ALG,SEX |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|---------------------------|
| 112.5 | G03XA02 | gestrinon | p.o. | 0.70 | MG | 46.26 | L/GYN,END,HEM, ALG,SEX |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 113 | jiná urologika včetně spasmolytik | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 113.1 | G04AB01 | kyselina nalidixová | p.o. | 4.00 | GM | 8.55 | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|-------|--|
| 113.2 | G04AB03 | kyselina pipemidová | p.o. | 0.80 | GM | 19.55 | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 113.3 | G04AC02 | nifurtinol | p.o. | 0.16 | GM | 2.58 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 113.4 | G04BD02 | flavoxat | p.o. | 0.80 | GM | 12.96 | L/URN,GYN,SEX, GER |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---------------------------|
| 113.5 | G04BD04 | oxybutynin | p.o. | 15.00 | MG | 12.96 | L/URN,GYN,SEX GER, PED |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|---|----|-------|---------------------------|
| 113.6 | G04BD04 | oxybutynin | transd. | 1 | DF | 37,20 | L/URN,GYN,SEX GER, PED |
|-------|---------|------------|---------|---|----|-------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|----------------------------|
| 113.7 | G04BD06 | propiverin (do 5 mg v jedné tabletě) včetně) | p.o. | 15.00 | MG | 11.70 | L/URN,GYN,SEX, PED, GER |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|----------------------------|

66819 MICTONETTEN drg 50x5mg APG D

66820 MICTONETTEN drg 100x5mg APG D

92255 MICTONETTEN drg 30x5mg APG D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|-----------------------|
| 113.8 | G04BD06 | propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 15.00 | MG | 5.20 | L/URN,GYN,SEX, GER |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|-----------------------|

92254 MICTONORM drg 30x15mg APG D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|
| 113.9 | G04BD07 | tolterodin | p.o. | 4.00 | MG | 40.00 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|

Léčiva s obsahem tolterodinu jsou předepisována urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro závažné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spasmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře (počet mikcí 10 a více za 24 hodin, z toho minimálně 1 mikce za noc, nejméně 1 episodaurgence, nebo 1 episoda inkontinence za 24 hodin) či urgentní inkontinence bez polakisurií. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskarinky: pokud je frekvence inkontinentních nebo urgentních episod snížena o více než 50%, nebo frekvence mikcí o více než 20%, lze terapii tolterodinem dále indikovat.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|------|-------|----|-------|--|
| 113.10 | G04BD09 | trospium chlorid | p.o. | 40.00 | MG | 11.84 | |
|--------|---------|------------------|------|-------|----|-------|--|

12527 SPASMEX 15 tbl 30x15mg PFL D

17162 SPASMED 15 por tbl flm 30x15mg PMP CZ

17163 SPASMED 15 por tbl flm 50x15mg PMP CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 113.11 | G04BD08 | solifenacin | p.o. | 5.00 | MG | 40.00 | P |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

Léčiva s obsahem solifenacimu jsou předepisována urologem a gynekologem při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spasmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře (počet mikcí 10 a více/24 hod., z toho

minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizodaurgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinence bez polakisurii.

Po 3 měsících terapie solifenacinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii solifenacinem pokračovat.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|---------------------------|
| 113.12 | G04BD10 | darifenacin do 10 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 7.5 | MG | 12.96 | L/URN, GYN, SEX, PED, GER |
| 113.13 | G04BD10 | darifenacin nad 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 7.5 | MG | 9.07 | L/URN, GYN, SEX, PED, GER |
| 113.14 | G04BX | duloxetin | p.o. | 80.00 | MG | 46.00 | P |

Léčiva s obsahem duloxetinu jsou předepisována urologem nebo gynekologem u pacientek starších 18 let s prokázanou stresovou inkontinencí moči I a II stupně (některým z těchto vyšetření: urodynamickým, UZ a PWT), u kterých není primárně indikována chirurgická léčba. Po 3 měsících léčby duloxetinem je zhodnocen stav pacientky. Pokud frekvence epizod mimovolného úniku moči za týden poklesne pod 50% (za poslední týden před kontrolou), je léčba duloxetinem plně indikována a bude nadále hrazena z prostředku veřejného zdravotního pojistění. Po 6 měsících léčby je stav opět vyhodnocen (kritéria pro toto hodnocení jsou dotazník s počtem epizod inkontinence), užívání duloxetinu se přeruší na 1 měsíc a stav pacientky je opět vyhodnocen (celkový zdravotní stav, změna frekvence urgencí nebo epizod úniku moči a vedlejší účinky léku). Pokud ústup obtíží bude přetrávat po dobu alespoň 1 měsíce i po vysazení duloxetinu, bude tato léčba ukončena a pacientka bude pozvána na kontrolu za 3 měsíce. Pokud dojde během 1-měsíčního přerušení léčby duloxetinem k obnovení obtíží (v původním rozsahu nebo ještě horším) je další podávání duloxetinu indikováno a hrazeno a to po dobu pokračování účinků léčby, tzn. snížení množství epizod úniku moči pod 50% výchozí hodnoty. Kontroly pacientky u specialisty (urologa nebo gynekologa) jsou nutné každé 3 měsíce ke zhodnocení účinků léčby a stavu pacientky. Pokud léčba trvá déle než 1 rok, je nutné kontrolní vyšetření pacientky (urodynamické event. UZ a vyhodnocení PWT).

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------|--------|-----|-------|-------|
| 114 | léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty a ostatní gynekologa | | | | | | |
| 114.1 | C02CA04 | doxazosin | p.o. | 4.00 | MG | 12.75 | L/URN |
| 45214 | ZOXON 2 | | tbl 30x2mg | | ZEH | CZ | |
| 45215 | ZOXON 4 | | por tbl nob 30x4mg | | ZEH | CZ | |
| 64797 | KAMIREN 4 | | tbl 30x4mg | | KRK | SLO | |
| 64798 | KAMIREN 2 | | tbl 30x2mg | | KRK | SLO | |
| 95243 | ZOXON 4 | | por tbl nob100x4mg | | ZEH | CZ | |
| 114.2 | G04CA01 | alfuzosin | p.o. | 10 | MG | 14.40 | L/URN |
| 114.3 | G04CA02 | tamsulosin | p.o. | 0.40 | MG | 14.40 | L/URN |
| 114.4 | G04CA03 | terazosin | p.o. | 5.00 | MG | 12.75 | L/URN |
| 114.5 | G04CB01 | finasterid | p.o. | 5.00 | MG | 14.40 | L/URN |
| 16273 | TERAZOSIN HEXAL 5 | | por tbl nob 30x5mg | | SFS | D | |
| 44312 | KORNAM 5 MG | | por tbl nob 30x5mg | | LEK | SLO | |
| 114.6 | G04CX01 | extrakt Pyg. africanum | p.o. | 2.00 | DF | 9.20 | L/URN |
| 114.7 | G04CX02 | extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně) | p.o. | 1.00 | DF | 9.20 | L/URN |
| 114.8 | G04CX02 | extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně) | p.o. | 2.00 | DF | 9.20 | L/URN |
| 114.9 | G04CX03 | mepartircin | p.o. | 150.00 | KU | 14.40 | L/URN |
| 115 | ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému | | | | | | |
| 115.1 | G04BC | rozpuštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet) | p.o. | 4.00 | DF | 17.72 | |

60046 BLEMAREN N

tbl eff 80

EPF D

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|-------|----|------|--|
| 115.2 | G04BC | rozpuštědla močových kamenů (ve formě prášku) | p.o. | 10.00 | GM | 6.58 | |
|-------|-------|---|------|-------|----|------|--|

116 hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-------|
| 116.1 | H01AA02 | tetrakosaktid (nedepotní lékové formy) | parent. | 0.25 | MG | 59.93 | L/END |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|---|--------|------|
| 116.2 | H01AC01 | somatropin | parent. | 2.00 | U | 602.76 | L/J5 |
|-------|---------|------------|---------|------|---|--------|------|

61229 GENOTROPIN 16 M.J.(5.3MG)

inj pso lqf 5x16ut

PHA S

66752 GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)

inj pso lqf 5x36ut

PHA S

117 hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 117.1 | H01BA02 | desmopresin | parent. | 4.00 | RG | 82.41 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 117.2 | H01BA02 | desmopresin (nosní kapky) | lok. | 25.00 | RG | 23.53 | |
|-------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 117.3 | H01BA02 | desmopresin (nosní spray) | lok. | 25.00 | RG | 58.25 | |
|-------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|--------|----|--------|---|
| 117.4 | H01BA02 | desmopresin (pevné lékové formy) | p.o. | 400.00 | RG | 125.00 | P |
|-------|---------|----------------------------------|------|--------|----|--------|---|

Léčba desmopresinem v tabletách je indikována u nemocných s diabetes insipidus, kde není možná aplikace desmopresinu intranasálně vzhledem k závažnému postižení nosní sliznice nebo v případě slepoty nemocného.

42452 MINIRIN 0.2 MG TABLETY

por tbl nob30x0.2mg

FEG S

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 117.5 | H01BA04 | terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 288.08 | H |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 117.6 | H01BA04 | terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 245.27 | H |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|---|-------|---|
| 117.7 | H01BA05 | ornipresin | parent. | 5.00 | U | 27.57 | H |
|-------|---------|------------|---------|------|---|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|
| 117.8 | H01BB02 | oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | U | 49.20 | H |
|-------|---------|---|---------|-------|---|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|-------|---|-------|---|
| 117.9 | H01BB02 | oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | U | 21.96 | H |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|-------|---|-------|---|

118 hormony hypotalamu a jejich analoga

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|---------|---|
| 118.1 | H01AX01 | pegvisomant | parent. | 10.00 | MG | 2256.30 | Z |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|---------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|------|------|----|--------|---|
| 118.2 | H01CA01 | gonadorelin (nasálně) | lok. | 1.20 | MG | 203.34 | Z |
|-------|---------|-----------------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 118.3 | H01CA02 | nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně) | lok. | 0.40 | MG | 134.00 | Z |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 118.4 | H01CA02 | nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně) | lok. | 0.40 | MG | 104.40 | Z |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|
| 118.5 | H01CB01 | somatostatin | parent. | 6.00 | MG | 7 704.44 | X |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|

66824 SOMATOSTATIN-UCB 3 MG inf pso lqf 1x3mg UCB B

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 118.6 | H01CB02 | oktreetid | parent. | 1.00 | MG | 4 000.00 | H |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|
| 118.7 | H01CB02 | oktreetid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 10 mg | parent. | 357.00 | RG | 1 212.90 | X |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|----------|----|----------|---|
| 118.8 | H01CB02 | oktretoid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 20 mg | parent. | 714.00 | RG | 1 479.20 | X |
| 118.9 | H01CB02 | oktretoid s podáváním 1x za 28 dnů, s obsahem 30 mg | parent. | 1 072.00 | RG | 1 740.40 | X |
| 118.10 | H01CB03 | lantreotid s obsahem 120mg | parent. | 4.29 | MG | 1 973.60 | X |
| 118.11 | H01CB03 | lantreotid s obsahem 30mg | parent. | 2.14 | MG | 1 479.20 | X |
| 118.12 | H01CB03 | lantreotid s obsahem 60mg | parent. | 2.14 | MG | 1 445.90 | X |
| 118.13 | H01CB03 | lantreotid s obsahem 90mg | parent. | 3.21 | MG | 1 710.80 | X |
| 118.14 | H01CC01 | ganirelix (antagonista releasing hormonu) | parent. | 0.25 | MG | 1 368.00 | Z |

119 kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 119.1 | H02AA02 | fludrokortison | p.o. | 0.10 | MG | 4.76 | |
| 119.2 | H02AB01 | betamethason | p.o. | 1.50 | MG | 3.42 | |
| 119.3 | H02AB02 | dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více) | p.o. | 1.50 | MG | 9.29 | |

83994 FORTECORTIN 4 tbl 20x4mg MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 119.4 | H02AB02 | dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | MG | 3.42 | |
| 119.5 | H02AB07 | prednison | p.o. | 10.00 | MG | 2.80 | |

02963 PREDNISON 20 LÉČIVA tbl 20x20mg-blistr ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 119.6 | H02AB08 | triamcinolon | p.o. | 7.50 | MG | 2.74 | |
| 119.7 | H02AB09 | hydrokortison | p.o. | 30.00 | MG | 6.97 | |

76205 HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARM por tbl nob 20x10mg VJP D

119.8 H02AB10 kortison p.o. 37.50 MG 5.07

120 kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 120.1 | H02AB | mazipredon | parent. | 30.00 | MG | 17.79 | O |
| 120.2 | H02AB01 | betamethason (depotní lékové formy) | parent. | 0.40 | MG | 3.28 | O |
| 120.3 | H02AB02 | dexamethason (40 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 24.50 | O |
| 120.4 | H02AB02 | dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.50 | MG | 1.56 | O |

01673 DEXAMED

inj 100x2ml/8mg

MOE CY

84090 DEXAMED

inj 10x2ml/8mg

MOE CY

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 120.5 | H02AB04 | methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 20.00 | MG | 22.10 | O |
| 120.6 | H02AB04 | methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 20.00 | MG | 11.40 | O |
| 120.7 | H02AB04 | methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 20.00 | MG | 16.60 | O |
| 120.8 | H02AB06 | prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | MG | 17.46 | O |
| 120.9 | H02AB06 | prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | MG | 12.51 | O |
| 120.10 | H02AB07 | prednison (do 10 mg včetně) | p.rect. | 10.00 | MG | 17.30 | |
| 120.11 | H02AB07 | prednison (nad 10 do 30 mg včetně) | p.rect. | 10.00 | MG | 8.16 | |
| 120.12 | H02AB07 | prednison (nad 30 mg) | p.rect. | 10.00 | MG | 4.59 | |
| 120.13 | H02AB08 | triamcinolon | parent. | 7.50 | MG | 13.64 | O |
| 120.14 | H02AB09 | hydrokortison | parent. | 30.00 | MG | 11.19 | O |

121 hormony štítné žlázy a jódová terapie

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|------|------|----|------|--|
| 121.1 | H03AA | hormony štítné žlázy | p.o. | 1.00 | DF | 2.12 | |
|-------|-------|----------------------|------|------|----|------|--|

61160 JODTHYROX

tbl 50

MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 121.2 | H03AA01 | levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 0.15 | MG | 1.86 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

69189 EUTHYROX 50

tbl 100x50rg

MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 121.3 | H03AA01 | levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | MG | 1.09 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

69191 EUTHYROX 150

tbl 100x150rg

MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 121.4 | H03AA01 | levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | MG | 1.37 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

97186 EUTHYROX 100

tbl 100x100rg

MEC D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 121.5 | H03AA02 | liothyronin sodný | p.o. | 0.06 | MG | 4.40 | |
| 121.6 | H03AA03 | kombinace levothyroxinu a liothyroninu | p.o. | 1.00 | DF | 1.69 | |

03875 THYREOTOM

tbl 60x50rg

BCE D

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|------|--------|----|------|--|
| 121.7 | H03CA | jódová terapie | p.o. | 200.00 | RG | 1.76 | |
|-------|-------|----------------|------|--------|----|------|--|

61158 JODID 100

tbl 100

MEC D

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 122 | Tyreostatika | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|------|--|
| 122.1 | H03BA02 | propylthiouracil | p.o. | 0.10 | GM | 6.94 | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|------|--|

14914 PROPYCIL 50

por tbl nob100x50mg

HPB D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 122.2 | H03BB01 | karbimazol | p.o. | 15.00 | MG | 2.93 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

00066 CARBIMAZOL-SLOVAKOFARMA

tbl 100x5mg

ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 122.3 | H03BB02 | thiamazol | p.o. | 10.00 | MG | 2.83 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|------|---|
| 122.4 | H03BB02 | thiamazol | parent. | 10.00 | MG | 4.50 | H |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 122.5 | H03BC01 | perchlorát draselný | p.o. | 0.20 | GM | 1.66 | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|

123 glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|
| 123.1 | H04AA01 | glukagon | parent. | 1.00 | MG | 404.62 | L/DIA |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 123.2 | H04AA01 | glukagon (ve formě hypokit) | parent. | 1.00 | MG | 819.51 | L/DIA |
|-------|---------|-----------------------------|---------|------|----|--------|-------|

83741 GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT

inj sic 1mg+sol+stř

NOO DK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|
| 123.3 | H05AA02 | teriparatid | parent. | 20.00 | RG | 390.00 | X |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|--------|---|--------|-----------------------|
| 123.4 | H05BA01 | kalcitonin (lososí) | parent. | 100.00 | U | 118.09 | L/INT,ORT, END,GER |
|-------|---------|---------------------|---------|--------|---|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|--------|--------|---|-------|---|
| 123.5 | H05BA01 | kalcitonin (lososí) | inhal. | 200.00 | U | 45.90 | P |
|-------|---------|---------------------|--------|--------|---|-------|---|

Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, revmatolog, gynekolog a endokrinolog u osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii. Po 3 měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|---|--------|-----------------------|
| 123.6 | H05BA03 | kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | U | 125.37 | L/INT,ORT, END,GER |
|-------|---------|--|---------|--------|---|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|---|--------|-----------------------|
| 123.7 | H05BA03 | kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | U | 157.39 | L/INT,ORT, END,GER |
|-------|---------|--|---------|--------|---|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|
| 123.8 | H05BX01 | cinacalcet | p.o. | 60.00 | MG | 392.45 | X |
|-------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|

124 ostatní léčiva ze skupiny hormonů

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 124.1 | H02AB04 | methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 7.50 | MG | 3.42 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 124.2 | H02AB04 | methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě) | p.o. | 7.50 | MG | 4.79 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

86606 MEDROL 16 MG

por tbl nob50x16mg-b

PMB B

125 tetracyklinová a amfenikolová antibiotika

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 125.1 | J01AA02 | doxycyklin | p.o. | 0.10 | GM | 3.92 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----|---|
| 04013 | DOXYBENE 200 MG TABLETY | por tbl nob10x200mg | MCK | D |
|-------|-------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------|-----|---|
| 12737 | DOXYHEXAL 200 TABS | tbl 10x200mg | SFS | D |
|-------|--------------------|--------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------|-----|---|
| 12738 | DOXYHEXAL 200 TABS | tbl 20x200mg | SFS | D |
|-------|--------------------|--------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|----------------|--------------|-----|---|
| 32953 | DOXYHEXAL TABS | tbl 10x100mg | SFS | D |
|-------|----------------|--------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|----------------|--------------|-----|---|
| 32954 | DOXYHEXAL TABS | tbl 20x100mg | SFS | D |
|-------|----------------|--------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------|-----|---|
| 47718 | DOXYCYCLIN AL 100 | tbl 10x100mg | APA | D |
|-------|-------------------|--------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------|-----|---|
| 47719 | DOXYCYCLIN AL 100 | tbl 20x100mg | APA | D |
| 47720 | DOXYCYCLIN AL 200 | tbl 10x200mg | APA | D |
| 97654 | DOXYBENE 100MG | cps 10x100mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 125.2 | J01AA02 | doxycyklin | parent. | 0.10 | GM | 91.28 | K |
| 125.3 | J01AA04 | lymecyklin | p.o. | 0.60 | GM | 3.92 | |
| 125.4 | J01AA06 | oxytetracyklin | p.o. | 1.00 | GM | 3.92 | |
| 125.5 | J01AA07 | tetracyklin | p.o. | 1.00 | GM | 3.92 | |
| 125.6 | J01AA08 | minocyklin | p.o. | 0.20 | GM | 7.84 | |
| 125.7 | J01AA09 | rolitetracyklin | parent. | 0.35 | GM | 94.63 | K |
| 125.8 | J01AA | doxycyklin v kombinaci s ambroxolem | p.o. | 1.00 | DF | 6.17 | |
| 125.9 | J01BA01 | chloramfenikol | p.o. | 3.00 | GM | 25.88 | |
| 125.10 | J01BA01 | chloramfenikol | parent. | 3.00 | GM | 267.93 | K |
| 125.11 | J01BA02 | thiamphenikol | parent. | 1.50 | GM | 176.31 | K |

| | |
|-----|--|
| 126 | peniciliny se širokým spektrem, perorální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 126.1 | J01CA01 | ampicilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 14.13 | |
| 126.2 | J01CA01 | ampicilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 17.20 | |
| 126.3 | J01CA04 | amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 gm v 1tabletě včetně | p.o. | 1.00 | GM | 10.10 | |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------------|-----|-----|
| 15896 | APO-AMOXI 500 | por cps dur30x500mg | CMG | IRL |
| 17628 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 10x500mg | SFS | D |
| 17629 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 20x500mg | SFS | D |
| 19503 | APO-AMOXI 500 | por cps dur30x500mg | KAT | NL |
| 32557 | OSPAMOX 500 MG | por tbl flm14x500mg | SZK | A |
| 44337 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 10x500mg | HHC | D |
| 44338 | AMOXIHEXAL 500 | tbl obd 20x500mg | HHC | D |
| 66364 | OSPAMOX 250MG | cps 12x250mg | SZK | A |
| 66368 | OSPAMOX 500 MG | por tbl flm12x500mg | SZK | A |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 126.4 | J01CA04 | amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 gm v 1tabletě | p.o. | 1.00 | GM | 9.06 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|-----|---|
| 17623 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 10x1000mg | SFS | D |
| 17624 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 20x1000mg | SFS | D |
| 17625 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 50x1000mg | SFS | D |
| 17630 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 10x750mg | SFS | D |
| 17631 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 20x750mg | SFS | D |
| 17632 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 50x750mg | SFS | D |
| 32558 | OSPAMOX 750 MG | por tbl flm14x750mg | SZK | A |
| 32559 | OSPAMOX 1000 MG | por tbl flm14x1000mg | SZK | A |
| 44339 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 10x750mg | HHC | D |
| 44340 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 20x750mg | HHC | D |
| 44341 | AMOXIHEXAL 750 | tbl obd 50x750mg | HHC | D |

| | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|-----|---|
| 44342 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 10x1000mg | HHC | D |
| 44343 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 20x1000mg | HHC | D |
| 44344 | AMOXIHEXAL 1000 | tbl obd 50x1000mg | HHC | D |
| 65929 | AMOXICILLIN AL 1000 | tbl obd 10x1000mg | APA | D |
| 65958 | AMOXICILLIN AL 1000 | tbl obd 20x1000mg | APA | D |
| 66369 | OSPAMOX 750 MG | por tbl flm12x750mg | SZK | A |
| 66370 | OSPAMOX 1000 MG | por tblflm12x1000mg | SZK | A |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 126.5 | J01CA04 | amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech) | p.o. | 1.00 | GM | 11.67 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-----|----|
| 17620 | AMOXIHEXAL | plv sus 1x100ml | SFS | D |
| 17622 | AMOXIHEXAL FORTE | plv sus 1x100ml | SFS | D |
| 44345 | AMOXIHEXAL | plv sus 1x100ml | AAG | D |
| 44347 | AMOXIHEXAL FORTE | plv sus 1x100ml | AAG | D |
| 62050 | DUOMOX 500 | tbl 20x500mg | YEU | NL |
| 66366 | OSPAMOX 250MG/5ML | gra sus 1x60ml | SZK | A |
| 66367 | OSPAMOX 375MG/5ML | gra sus 1x60ml | SZK | A |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 126.6 | J01CA04 | amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech) | p.o. | 1.00 | GM | 10.00 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------|-------------------|-----|---|
| 17626 | AMOXIHEXAL 1000 TABS | tbl sol 12x1000mg | SFS | D |
| 17627 | AMOXIHEXAL 1000 TABS | tbl sol 24x1000mg | SFS | D |
| 17633 | AMOXIHEXAL 750 TABS | tbl sol 12x750mg | SFS | D |
| 17634 | AMOXIHEXAL 750 TABS | tbl sol 24x750mg | SFS | D |
| 44333 | AMOXIHEXAL 750 TABS | tbl sol 12x750mg | HHC | D |
| 44334 | AMOXIHEXAL 750 TABS | tbl sol 24x750mg | HHC | D |
| 44335 | AMOXIHEXAL 1000 TABS | tbl sol 12x1000mg | HHC | D |
| 44336 | AMOXIHEXAL 1000 TABS | tbl sol 24x1000mg | HHC | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 126.7 | J01CA06 | bakampicilin | p.o. | 1.20 | GM | 16.62 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 127 | peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 127.1 | J01CA01 | ampicilin | parent. | 2.00 | GM | 43.35 | K |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------------|-----|----|
| 86197 | AMPICILIN 0.5 BIOTIKA | inj sic 50x500mg | BTA | SK |
|-------|-----------------------|------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|-------|
| 127.2 | J01CA09 | azlocilin | parent. | 12.00 | GM | 637.48 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|----------|-------|
| 127.3 | J01CA12 | piperacilin | parent. | 14.00 | GM | 1 297.98 | U/ATB |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|----------|-------|
| 127.4 | J01CA13 | tikarcilin | parent. | 15.00 | GM | 1 980.92 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 127.5 | J01CR01 | ampicilin a enzymový inhibitor | parent. | 2.00 | GM | 145.95 | U/ATB |
|-------|---------|--------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 127.6 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 1.00 | GM | 97.91 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|-------|----|----------|-------|
| 127.7 | J01CR03 | tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 15.00 | GM | 1 613.32 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|-------|----|----------|-------|

| | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----|----|
| 93170 | TIMENTIN 3.2 GM | inj sic 4x3.2gm | SKW | GB |
|-------|-----------------|-----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|----------|-------|
| 127.8 | J01CR05 | piperacilin a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 14.00 | GM | 1 782.82 | U/ATB |
|-------|---------|--|---------|-------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|------|----|-------|---|
| 127.9 | J01CR50 | kombinace penicilinů | parent. | 3.00 | DF | 71.80 | U |
|-------|---------|----------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 128 | peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|--|
| 128.1 | J01CE02 | fenoxymethylpenicilin (od 500 KU včetně p.o. do 900 KU včetně v jedné tabletě) | | 2.00 | GM | 17.95 | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|--|

45996 OSPEN 500 por tblflm30x500ku SZK A
 92435 V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA por tbl nob30x800ku BTA SK
 92806 V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMA tbl 30x500mg-blstr ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|
| 128.2 | J01CE02 | fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU p.o. v jedné tabletě) | | 2.00 | GM | 19.75 | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|

92434 V-PENICILIN 0.4 MEGA BIOTIKA por tbl nob30x400ku BTA SK
 92805 V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA tbl 30x250mg-blstr ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|--|
| 128.3 | J01CE02 | fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU p.o. v jedné tabletě) | | 2.00 | GM | 16.85 | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|--|

01881 PENBENE 1 000 000 tbl obd 21x1mu MCK D
 05960 V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA tbl 20x750mg-bli ZEH SK
 44708 V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA tbl 30x750mg-bli ZEH SK
 45997 OSPEN 1000 por tblflm30x1000ku SZK A
 45998 OSPEN 1500 por tblflm30x1500ku SZK A
 49513 PENBENE 1 000 000 tbl obd 30x1mu MCK D
 57778 PENBENE 1 500 000 tbl obd 21 MCK D
 65356 PENBENE 1 000 000 tbl obd 12x1mu MCK D
 66359 OSPEN 1000 por tblflm12x1000ku SZK A
 66360 OSPEN 1500 por tblflm12x1500ku SZK A
 92436 V-PENICILIN 1.2 MEGA BIOTIKA por tbl nob30x1.2mu BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|
| 128.4 | J01CE02 | fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy p.o. do 250 KU v 5 ml včetně) | | 2.00 | GM | 69.99 | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|
| 128.5 | J01CE02 | fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy p.o. nad 250 KU v 5 ml) | | 2.00 | GM | 26.30 | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|--|------|----|-------|--|
| 128.6 | J01CE06 | penameciliin p.o. | | 1.05 | GM | 14.19 | |
|-------|---------|-------------------|--|------|----|-------|--|

56442 PENCLEN tbl 30x350mg-bli ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|--|------|----|-------|--|
| 128.7 | J01CE10 | benzathin fenoxymethylpenicilin p.o. | | 2.00 | GM | 25.91 | |
|-------|---------|--------------------------------------|--|------|----|-------|--|

49549 OSPEN 400 sir 1x150ml SZK A
 76213 OSPEN 750 KRKA por sus 1x60ml/9gm KRK SLO

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 129 | peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|--------|---|
| 129.1 | J01CE01 | benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli parent.) | | 3.60 | GM | 121.29 | K |
|-------|---------|--|--|------|----|--------|---|

01093 PENICILIN G 1.0 DRAS.SOL BIOT. inj sic 10x1mu BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|---|
| 129.2 | J01CE01 | benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli) parent. | | 3.60 | GM | 49.06 | K |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|---|

93405 PENICILIN G 5.0 DRAS.SOL BIOT. inj sic 10x5mu BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 129.3 | J01CE08 | benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně) | parent. | 2.00 | MU | 70.63 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 129.4 | J01CE08 | benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli) | parent. | 2.00 | MU | 26.93 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

01764 RETARPEN 2.4 M.U.I. inj sic 50x2.4mu SZK A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 129.5 | J01CE09 | prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně) | parent. | 2.00 | MU | 79.58 | K |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 129.6 | J01CE09 | prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce včetně) | parent. | 2.00 | MU | 38.84 | K |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

01102 PROKAIN PENICILIN G 1.5 BIOTIKA inj sic 10x1.5mu BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 129.7 | J01CE30 | kombinace | parent. | 0.50 | DF | 10.31 | K |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

02723 PENDEPON COMPOSITUM inj sic 10x1.5mu BTA SK

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 130 | peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.1 | J01CF02 | cloxacilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 28.74 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.2 | J01CF02 | cloxacilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 39.98 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.3 | J01CF04 | oxacilin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 28.74 | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.4 | J01CF04 | oxacilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 39.98 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 130.5 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 28.65 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 130.6 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 1 g v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | GM | 18.56 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 130.7 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | GM | 26.12 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 130.8 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg do 1 g v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 24.51 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 130.9 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně) | p.o. | 1.00 | GM | 37.62 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 130.10 | J01CR02 | amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml) | p.o. | 1.00 | GM | 28.50 | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|

44793 AUGMENTIN DUO por plv sus 1x140ml SKW GB

84792 AUGMENTIN DUO por plv sus 1x70ml SKW GB

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.11 | J01CR04 | sultamicilin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.50 | GM | 73.32 | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|

17149 UNASYN por tbl flm 12x375mg PFI I

72881 UNASYN tbl obd 12x375mg PFI TR

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 130.12 | J01CR04 | sultamicilin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.50 | GM | 76.85 | |
|--------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|------|-----|--------|-------|
| 131 | jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání | | | | | | |
| 131.1 | J01DB01 | cefalexin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 38.13 | |
| 66357 | OSPEXIN 1000MG | | tbl obd 12x1000mg | SZK | A | | |
| 131.2 | J01DB01 | cefalexin (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 39.53 | |
| 66354 | OSPEXIN 250MG/5ML | | gra sus 1x60ml | SZK | A | | |
| 66355 | OSPEXIN 375MG/5ML | | gra sus 1x60ml | SZK | A | | |
| 131.3 | J01DC02 | cefuroxim axetil (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 87.73 | |
| 18499 | XORIMAX 125 MG POTAH.TABLETY | | portblflm10x125mg | SZK | A | | |
| 18523 | XORIMAX 250 MG POTAH.TABLETY | | portblflm10x250mg | SZK | A | | |
| 18547 | XORIMAX 500 MG POTAH.TABLETY | | portblflm10x500mg | SZK | A | | |
| 131.4 | J01DC02 | cefuroxim axetil (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 134.70 | |
| 131.5 | J01DC04 | cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 57.45 | |
| 16450 | VERCEF 250 MG | | cps 3x7=21 bli | IRI | IRL | | |
| 53153 | VERCEF 250MG | | cps 7x3(blistr) | RDD | IND | | |
| 131.6 | J01DC04 | cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 53.80 | |
| 131.7 | J01DC04 | cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 84.00 | |
| 131.8 | J01DC04 | cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml) | p.o. | 1.50 | GM | 70.20 | |
| 131.9 | J01DB05 | cefadroxil (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 38.13 | |
| 131.10 | J01DB05 | cefadroxil (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 40.92 | |
| 131.11 | J01DD08 | cefixim | p.o. | 0.40 | GM | 91.00 | ATB |
| 131.12 | J01DD10 | cefelacetam | p.o. | 1.00 | GM | 91.00 | ATB |
| 131.13 | J01DD13 | cefpodoxim | p.o. | 0.40 | GM | 87.73 | ATB |
| 131.14 | J01DD14 | ceftibuten | p.o. | 0.40 | GM | 87.73 | ATB |
| 131.15 | J01DC10 | cefpotazil (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 87.73 | |
| 131.16 | J01DC10 | cefpotazil (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 134.70 | |
| 132 | jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 132.1 | J01CF04 | oxacilin | parent. | 2.00 | GM | 95.80 | K |
| 132.2 | J01DD62 | cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy | parent. | 2.00 | GM | 397.00 | U/ATB |
| 132.3 | J01DB03 | cefalotin | parent. | 4.00 | GM | 125.17 | U/ATB |
| 132.4 | J01DB04 | cefazolin | parent. | 3.00 | GM | 120.93 | U/ATB |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|------|--|
| 02205 | CEFAZOLINE PANPHARMA | inj sic 25x1gm | LPA | F |
| 84018 | CEFAZOLINE PANPHARMA | inj sic 50x1gm | LPA | F |
| 132.5 | J01DC01 cefoxitin | parent. | 6.00 | GM 937.79 U/ATB |
| 132.6 | J01DC02 cefuroxim | parent. | 4.00 | GM 329.10 U/ATB |
| 64831 | AXETINE 1.5GM | inj sic 10x1.5gm | MOE | CY |
| 64833 | AXETINE 1.5GM | inj sic 100x1.5gm | MOE | CY |
| 64835 | AXETINE 750 MG | inj sic 10x750mg | MOE | CY |
| 64837 | AXETINE 750 MG | inj sic 100x750mg | MOE | CY |
| 132.7 | J01DC04 cefamandol | parent. | 6.00 | GM 575.27 U/ATB |
| 132.8 | J01DD01 cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM 477.44 U/ATB |
| 15669 | CEFTAX 1000 | inj sic 1x1000mg | HIK | P |
| 49193 | CEFTAX 1000 | inj plv sol 10x1000mg | HIK | P |
| 83050 | SEFOTAK 1 G | inj plv sol 1x1gm | ICZ | CZ |
| 132.9 | J01DD01 cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM 440.56 U/ATB |
| 132.10 | J01DD02 ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM 1 736.18 U/ATB |
| 132.11 | J01DD02 ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli | parent. | 6.00 | GM 1 679.42 U/ATB |
| 76353 | FORTUM 1 G | inj plv sol 1x1gm | GWE | I |
| 76354 | FORTUM 2 G | inj plv sol 1x2gm | GWE | I |
| 132.12 | J01DD03 cefsulodin | parent. | 6.00 | GM 615.68 U/ATB |
| 132.13 | J01DD04 ceftriaxon | parent. | 2.00 | GM 508.60 ambulanrně: K/P ústavně: U/ATB |
| Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči předepisuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog k: | | | | |
| a) | iniciální léčbě bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let, | | | |
| b) | léčbě Lymské boreliozy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením), | | | |
| c) | léčbě nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu). | | | |
| 58756 | CEFTRIAXON TORREX 2 G | inj plv sol 1x2gm | TRX | A |
| 132.14 | J01DD07 ceftizoxim | parent. | 4.00 | GM 615.68 U/ATB |
| 132.15 | J01DE01 cefepim | parent. | 4.00 | GM 1 445.00 U/ATB |
| 132.16 | J01DB08 cefapirin | parent. | 4.00 | GM 194.73 U/ATB |
| 132.17 | J01DD12 cefoperazon | parent. | 6.00 | GM 1 297.00 U/ATB |
| 132.18 | J01DE02 cefpirom | parent. | 4.00 | GM 1 638.40 U/ATB |
| 132.19 | J01DF01 aztreonam | parent. | 4.00 | GM 1 645.60 U/ATB |
| 132.20 | J01DH ertapenem | parent. | 1.00 | GM 1 885.39 U/ATB |
| 132.21 | J01DH02 meropenem | parent. | 2.00 | GM 2 194.52 U/ATB |
| 132.22 | J01DH51 imipenem a inhibitor enzymu | parent. | 2.00 | GM 2 238.99 U/ATB |
| 133 | sulfonamidy a trimetoprim | | | |

133.1 J01EA01 trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě) p.o. 0.40 GM 11.60

133.2 J01EA01 trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě) p.o. 0.40 GM 8.94

133.3 J01EB05 sulfafurazol p.o. 4.00 GM 13.64

133.4 JO1EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim parent. 1.92 GM 127.04 K

133.5 J01EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě) p.o. 1.92 GM 6.40

75022 COTRIMOXAZOL AL FORTE tbl 10x960mg APA D
75023 COTRIMOXAZOL AL FORTE tbl 20x960mg APA D

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|--|------|----|-------|--|
| 133.6 | J01EE01 | sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | | 1.92 | GM | 17.06 | |
|-------|---------|---|------|--|------|----|-------|--|

133.7 J01EE01 sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté líkové formy) p.o. 1.92 GM 22.39

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 133.8 | J01EE03 | sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 6.94 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 133.9 | J01EE03 | sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 23.07 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 133.10 | J01EE04 | sulfamoxol a trimethoprim (pevné lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 6.94 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 133.11 | J01EE04 | sulfamoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 23.07 | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 133.12 | J01EE05 | sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy) | p.o. | 1.92 | GM | 6.94 | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|

134 makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivými

134-1 JQ1FA telithromycin p.o. 800.00 MG 96.80 U/ATB

134.2 J01FA01 erythromycin parent. 1.00 GM 717.50 K

134.3 J01FA01 erythromycin (pevné lékové formy) p.o. 1.00 GM 19.09

134.4 J01FA01 Erythromycin (tekuté lékové formy) p.o. 1.00 GM 33.69

55585 MEROMYCIN plv sus 1x100ml MCK D

134.5 J01FA02 spiramycin p.o. 3.00 GM 42.75

134.6 J01FA02 spiramycin parent. 4.50 MU 653.19 K

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|---------------------|------|-----|----------|-------|
| 17129 | ROVAMYCINE PLV.PRO INF.1.5 MIU | | plv inf 1x1.5mu | | AVM | F | |
| 134.7 | J01FA05 | oleandomycin | p.o. | 1.00 | GM | 14.59 | |
| 134.8 | J01FA06 | roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 38.67 | |
| 134.9 | J01FA06 | roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 31.60 | |
| 10855 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG | | por tbl flm10x150mg | | MCK | D | |
| 10857 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MG | | por tbl flm14x150mg | | MCK | D | |
| 10875 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG | | por tbl flm10x300mg | | MCK | D | |
| 134.10 | J01FA07 | josamycin (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | GM | 30.08 | |
| 134.11 | J01FA07 | josamycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 40.45 | |
| 134.12 | J01FA09 | klarithromycin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 36.00 | |
| 134.13 | J01FA09 | klarithromycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 59.85 | |
| 134.14 | J01FA09 | klaritromycin | parent. | 1.00 | GM | 658.62 | K |
| 134.15 | J01FA10 | azithromycin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 50.40 | |
| 134.16 | J01FA10 | azithromycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 89.77 | |
| 134.17 | J01FA10 | azitromycin | parent. | 0.50 | GM | 426.89 | K |
| 134.18 | J01FA13 | dirythromycin | p.o. | 0.50 | GM | 42.75 | |
| 134.19 | J01FG02 | quinupristin v kombinaci s dalfopristinem | parent | 1.00 | DF | 2 492.00 | U/ATB |
| 134.20 | J01RA | kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol) | p.o. | 5.00 | DF | 32.16 | |
| 135 | linkosamidová antibiotika | | | | | | |
| 135.1 | J01FF01 | klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.80 | GM | 457.90 | U/ATB |
| 135.2 | J01FF01 | klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli) | parent. | 1.80 | GM | 419.90 | U/ATB |
| 135.3 | J01FF01 | klindamycin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 42.15 | |
| 135.4 | J01FF01 | klindamycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.20 | GM | 129.70 | |
| 135.5 | J01FF02 | linkomycin | parent. | 1.80 | GM | 49.17 | U/ATB |
| 135.6 | J01FF02 | linkomycin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.80 | GM | 29.33 | ATB |
| 91997 | NELOREN | | cps 16x500mg | | LEK | SLO | |
| 135.7 | J01FF02 | linkomycin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.80 | GM | 160.62 | ATB |
| 136 | aminoglykosidová antibiotika | | | | | | |
| 136.1 | J01GA01 | streptomycin | parent. | 1.00 | GM | 117.10 | |

13797 STREPTOMYCIN 1GM

plv sol 10x1gm/lahv

BAK BG

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|
| 136.2 | J01GB01 | tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.24 | GM | 43.84 | U/ATB |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|-----------|------|----|----------|---|
| 136.3 | J01GB01 | tobramycin (léková forma – inhalační roztok) | inhalační | 0.60 | GM | 2 975.00 | P |
|-------|---------|--|-----------|------|----|----------|---|

Tobramycin v inhalační formě je indikován u pacientů s cystickou fibrózou infikovaných *Pseudomonas aeruginosa*, starších 6-ti let.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 136.4 | J01GB01 | tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.24 | GM | 23.02 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|
| 136.5 | J01GB03 | gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.24 | GM | 45.18 | U/ATB |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|-------|
| 136.6 | J01GB03 | gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci) | imp. | 1.00 | DF | 152.06 | U/ATB |
|-------|---------|--|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|--------|----|----------|-------|
| 136.7 | J01GB03 | gentamicin (lékové formy pěny) | lok. | 130.00 | MG | 2 411.98 | U/ATB |
|-------|---------|--------------------------------|------|--------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 136.8 | J01GB03 | gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.24 | GM | 23.61 | U/ATB |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|
| 136.9 | J01GB05 | neomycin | parent. | 1.00 | GM | 122.34 | U/ATB |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 136.10 | J01GB06 | amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | GM | 666.90 | U/ATB |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 136.11 | J01GB06 | amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | GM | 358.80 | U/ATB |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 136.12 | J01GB07 | netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.35 | GM | 519.93 | U/ATB |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 136.13 | J01GB07 | netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.35 | GM | 304.57 | U/ATB |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 136.14 | J01GB11 | isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | GM | 620.27 | U/ATB |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 136.15 | J01GB11 | isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | GM | 516.90 | U/ATB |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 137 | | chinolonová chemoterapeutika | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|---|
| 137.1 | J01MA | trovafloxacin | p.o. | 0.20 | GM | 24.50 | P |
|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|---|

K léčbě trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.2 | J01MA | trovafloxacin | parent. | 0.20 | GM | 212.23 | U/ATB |
|-------|-------|---------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 137.3 | J01MA01 | ofloxacin | p.o. | 0.40 | GM | 19.00 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

12349 ZANOCIN 200MG

tbl obd 10x200mg

RXY IND

17412 ZANOCIN 200MG

tbl obd 10x200mg

IRI IRL

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.4 | J01MA01 | ofloxacin | parent. | 0.40 | GM | 212.23 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|--|
| 137.5 | J01MA02 | ciprofloxacin | p.o. | 1.00 | GM | 19.00 | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|--|

15653 CIPLOX 250

tbl obd 10x250mg

SDD CZ

15654 CIPLOX 250

tbl obd 50x250mg

SDD CZ

15658 CIPLOX 500

tbl obd 10x500mg

SDD CZ

15659 CIPLOX 500

tbl obd 50x500mg

SDD CZ

| | | | | |
|-------|--------------|------------------|-----|-----|
| 44985 | CIPLOX 500 | tbl obd 10x500mg | CIA | IND |
| 44986 | CIPLOX 500 | tbl obd 50x500mg | CIA | IND |
| 44988 | CIPLOX 250 | tbl obd 10x250mg | CIA | IND |
| 44989 | CIPLOX 250 | tbl obd 50x250mg | CIA | IND |
| 94453 | CIPRINOL 250 | tbl obd 10x250mg | KRK | SLO |
| 96039 | CIPRINOL 500 | tbl obd 10x500mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.6 | J01MA02 | ciprofloxacin – infúze | parent. | 0.50 | GM | 212.23 | U/ATB |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | |
|-------|----------------------|--------------------|-----|-----|
| 15651 | CIPLOX | inf 1x100ml(plast) | SDD | CZ |
| 56830 | CIPLOX | inf 1x100ml(plast) | CIA | IND |
| 59830 | CIPRINOL 200MG/100ML | inf 1x100ml/200mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.7 | J01MA02 | ciprofloxacin – injekce | parent. | 0.50 | GM | 186.84 | U/ATB |
|-------|---------|-------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | |
|-------|---------------------|------------------|-----|-----|
| 96040 | CIPRINOL 100MG/10ML | inf 5x10ml/100mg | KRK | SLO |
|-------|---------------------|------------------|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 137.8 | J01MA03 | pefloxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-------|
| 137.9 | J01MA03 | pefloxacin | parent. | 0.80 | GM | 93.26 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 137.10 | J01MA04 | enoxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 137.11 | J01MA06 | norfloxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|-----|-----|
| 01660 | NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400MG | por tblflm 20x400mg | MCK | D |
| 42549 | NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400MG | por tblflm 14x400mg | MCK | D |
| 44090 | GYRABLOCK 400 | por tblflm500x400mg | MOE | CY |
| 44091 | GYRABLOCK 400 | portblflm1000x400mg | MOE | CY |
| 93465 | NOLICIN | tbl obd 20x400mg | KRK | SLO |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 137.12 | J01MA07 | lomefloxacin | p.o. | 0.80 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 137.13 | J01MA08 | fleroxacin | p.o. | 0.40 | GM | 19.00 | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|-------|
| 137.14 | J01MA08 | fleroxacin | parent. | 0.40 | GM | 212.23 | U/ATB |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|
| 137.15 | J01MA09 | sparfloxacin | p.o. | 0.20 | GM | 19.00 | P |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|

K léčbě sparfloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--------|------|----|--------|-------|
| 137.16 | J01MA12 | levofloxacin | parent | 0.25 | GM | 212.13 | U/ATB |
|--------|---------|--------------|--------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 137.17 | J01MA12 | levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 0.25 | GM | 75.00 | U/ATB |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 137.18 | J01MA12 | levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.25 | GM | 60.00 | U/ATB |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|
| 137.19 | J01MA14 | moxifloxacin | p.o. | 0.40 | GM | 60.00 | U/ATB |
|--------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 138 | ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-------|
| 138.1 | J01XA01 | vankomycin | parent. | 2.00 | GM | 1 149.00 | U/ATB |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|
| 138.2 | J01XA02 | teikoplanin | parent. | 0.40 | GM | 2 243.50 | U/ATB |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|
| 138.3 | J01XB01 | kolistin | p.o. | 3.00 | MU | 42.82 | U/ATB |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|
| 138.4 | J01XB01 | kolistin | parent. | 3.00 | MU | 109.34 | U/ATB |
|-------|---------|----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|-------|
| 138.5 | J01XB02 | polymyxin | parent. | 0.15 | GM | 103.09 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|----------|-------|
| 138.6 | J01XX08 | linezolid | p.o. | 1.20 | GM | 4 811.98 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|------|------|----|----------|-------|

03902 ZYVOXID por tbl flm10x600mg PMB B

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|------|----|----------|-------|
| 138.7 | J01XX08 | linezolid | parent | 1.20 | GM | 4 741.52 | U/ATB |
|-------|---------|-----------|--------|------|----|----------|-------|

03708 ZYVOXID inf sol 10x300ml FRK N

139 imidazolová chemoteraputika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 139.1 | G01AX05 | nifuratel | p.o. | 0.60 | GM | 12.50 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 139.2 | J01XD01 | metronidazol | p.o. | 2.00 | GM | 13.33 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

02427 ENTIZOL tbl 20x250mg ZPF PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|------|--|
| 139.3 | J01XD01 | metronidazol | p.rect. | 2.00 | GM | 8.36 | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|---|
| 139.4 | J01XD01 | metronidazol | parent. | 1.50 | GM | 170.90 | U |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|---|

81678 METRONIDAZOL-SERAG inf sol 1x100ml SWS D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 139.5 | J01XD02 | tinidazol | p.o. | 2.00 | GM | 13.80 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 139.6 | J01XD03 | ornidazol | p.o. | 1.50 | GM | 22.00 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 139.7 | J01XD03 | ornidazol | parent. | 1.00 | GM | 50.44 | U |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|------|--|
| 139.8 | J01XE01 | nitrofurantoin | p.o. | 0.20 | GM | 6.57 | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|------|--|

140 antimykotika pro systémové užití

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 140.1 | D01BA01 | griseofulvin | p.o. | 0.50 | GM | 9.97 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 140.2 | D01BA02 | terbinafin | p.o. | 0.25 | GM | 31.50 | L/DER |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|
| 140.3 | J02AA01 | amfotericin | parent. | 35.00 | MG | 279.36 | U |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|----------|-------|
| 140.4 | J02AA01 | amfotericin na tukových nosičích | parent. | 35.00 | MG | 1 517.80 | U/ATB |
|-------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 140.5 | J02AB01 | mikonazol | parent. | 1.00 | GM | 469.63 | U |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 140.6 | J02AB02 | ketokonazol | p.o. | 0.20 | GM | 15.00 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----|
| 140.7 | J02AC01 | flukonazol | parent. | 0.20 | GM | 550.00 | U/P |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----|

Parenterální flukonazol je indikován v indikaci léčby těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

58431 DIFLAZON inf sol 1x100ml KRK SLO

65989 MYCOMAX INF inf 1x100ml/200mg ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---|------|----|--------|---|
| 140.8 | J02AC01 | flukonazol – ostatní pevné lékové formy | p.o. jiné než 150 mg v jedné tabletě | 0.20 | GM | 249.07 | P |
|-------|---------|---|---|------|----|--------|---|

16638 MYKOHEXAL 100 por cpsdur 28x100mg SFS D

66032 MYCOMAX 50 cps 7x50mg ZEH CZ

| | | | | |
|-------|-------------|--------------|-----|----|
| 66033 | MYCOMAX 50 | cps 28x50mg | ZEH | CZ |
| 66036 | MYCOMAX 100 | cps 28x100mg | ZEH | CZ |
| 66037 | MYCOMAX 100 | cps 7x100mg | ZEH | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 140.9 | J02AC01 | flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu | p.o. | 0.20 | GM | 349.25 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 140.10 | J02AC01 | flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě) | p.o. | 0.15 | GM | 193.65 | P |
|--------|---------|--|------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-----|-----|
| 10689 | FORCAN - 150 | por cps dur 1x150mg | CIA | IND |
| 10743 | MYCOSYST 150 MG | cps 4x150mg | GED | H |
| 16396 | FORCAN - 150 | por cps dur 1x150mg | SDD | CZ |
| 31800 | MYKOHEXAL 150 | por cps dur 1x150mg | SFS | D |
| 47439 | MYCOMAX 150 | por cps dur 3x150mg | ZEH | CZ |
| 59788 | DIFLAZON 150 | cps 1x150mg | KRK | SLO |
| 59875 | MYCOSYST 150 MG | cps 1x150mg | GED | H |
| 59876 | MYCOSYST 150 MG | cps 2x150mg | GED | H |
| 66039 | MYCOMAX 150 | por cps dur 1x150mg | ZEH | CZ |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 140.11 | J02AC01 | flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu p.o. včetně) | p.o. | 0.20 | GM | 479.01 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-----|---|
| 64950 | DIFLUCAN 50MG/5ML | plv sus 1x35ml | PFC | F |
|-------|-------------------|----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|--------|---|
| 140.12 | J02AC01 | flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu p.o. včetně) | p.o. | 0.20 | GM | 436.59 | P |
|--------|---------|--|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|
| 140.13 | J02AC02 | itraconazol | parent. | 0.20 | GM | 3 520.00 | U/ATB |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 140.14 | J02AC02 | itraconazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení) | p.o. | 0.20 | GM | 76.50 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 140.15 | J02AC02 | itraconazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení | p.o. | 0.20 | GM | 91.20 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 140.16 | J02AC02 | itraconazol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.20 | GM | 371.70 | P |
|--------|---------|-----------------------------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|----------|-------|
| 140.17 | J02AC03 | vorikonazol | p.o. | 0.40 | GM | 2 655,50 | U/ATB |
|--------|---------|-------------|------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|
| 140.18 | J02AC03 | vorikonazol | parent. | 0.40 | GM | 9 857,80 | U/ATB |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|
| 140.19 | J02AX01 | flucytosin | p.o. | 10.00 | GM | 858.22 | P |
|--------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|

Perorální flukonazol, itraconazol a flucytosin pro krátkodobou léčbu předepisuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u:

- a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích jednotkách nebo dermatolog u:

- a) systémových mykóz u imunokompromitovaných pacientů,
- b) těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofytů na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření,
- c) těžké formy nehtových mykóz (itraconazol), v indikacích, kde nelze použít terbinafin a platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- 1) postižení celé nehtové ploténky,
- 2) postižení minimálně čtyř nehtových plotenek tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem,

- 3) postižení nehtu palce dolní končetiny.

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

Profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

Itraconazol v tekutých lékových formách je indikován k léčbě orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokomprimitovaných pacientů.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|----------|-----|
| 140.20 | J02AX01 | flucytosin | parent. | 10.00 | GM | 2 710.83 | U/P |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|----------|-----|

Parenterální flucytosin je indikován v indikaci léčby těžké, život ohrožující systémové mykózy.
Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů včetně pacientů připravovaných k transplantaci.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|-----------|-------|
| 140.21 | J02AX04 | caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulce | parent. | 1.00 | DF | 17 259.00 | U/ATB |
|--------|---------|---|---------|------|----|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|-----------|-------|
| 140.22 | J02AX04 | caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulce | parent. | 1.00 | DF | 24 163.00 | U/ATB |
|--------|---------|---|---------|------|----|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 141 | ostatní antimykobakteriální látky | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 141.1 | J04AB02 | rifampicin | p.o. | 0.60 | GM | 12.76 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

48463 ARFICIN 300 MG cps 100x300mg BUO SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|--|
| 141.2 | J04AB03 | rifamycin | parent. | 0.60 | GM | 244.40 | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 141.3 | J04AB04 | rifabutin | p.o. | 0.15 | GM | 113.69 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

Léčbu rifabutinem předepisuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

91946 MYCOBUTIN 150 cps 30x150mg PHA I

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|--|
| 141.4 | J04AB30 | kapreomycin | parent. | 1.00 | GM | 553.11 | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 141.5 | J04AC01 | isoniazid | p.o. | 0.30 | GM | 2.04 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 141.6 | J04AK01 | pyrazinamid | p.o. | 1.50 | GM | 14.63 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 141.7 | J04AK02 | ethambutol | p.o. | 1.20 | GM | 12.22 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|------|-------|----|------|--|
| 141.8 | J04BA02 | dapson | p.o. | 50.00 | MG | 1.37 | |
|-------|---------|--------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 142 | systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

Léčbu famciklovirem, valaciklovirem, brivudinem a parenterálním aciklovirem předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantacích jednotkách:

- a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokompromitovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresiv, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- c) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|
| 142.1 | J05AB01 | aciklovir | parent. | 4.00 | GM | 1 438.30 | U/P |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|------|------|----|--------|--|
| 142.2 | J05AB01 | aciklovir do 200 mg včetně | p.o. | 4.00 | GM | 199.70 | |
|-------|---------|----------------------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|--|
| 142.3 | J05AB01 | aciklovir nad 200 mg | p.o. | 4.00 | GM | 175.50 | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|---|
| 142.4 | J05AB01 | aciklovir (suspense) | p.o. | 4.00 | GM | 272.00 | P |
|-------|---------|----------------------|------|------|----|--------|---|

Aciklovir suspenze je indikován u dětí v indikaci herpes zoster.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 142.5 | J05AB04 | ribavirin | p.o. | 1.00 | GM | 604.96 | X |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|----------|---|
| 142.6 | J05AB06 | ganciklovir | p.o. | 3.00 | GM | 1 862.06 | P |
|-------|---------|-------------|------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-----|
| 142.7 | J05AB06 | ganciklovir | parent. | 0.50 | GM | 1 490.26 | U/P |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|-----|

02064 CYMEVENE inf sic 1x500mg HLR CH

16547 CYMEVENE inf sic 1x500mg RCE CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|--------|---|
| 142.8 | J05AB09 | famciklovir | p.o. | 0.75 | GM | 195.00 | P |
|-------|---------|-------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|--------|---|
| 142.9 | J05AB11 | valaciclovir | p.o. | 3.00 | GM | 195.00 | P |
|-------|---------|--------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu ganciklovirem a valganciclovirem předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- b) profylaxe a léčba CMV infekci u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- c) profylaxe a léčba CMV infekci u pacientů u orgánových transplantací.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|--------|----|-----------|-----|
| 142.10 | J05AB12 | cidofovir | parent. | 375.00 | MG | 27 628.50 | U/P |
|--------|---------|-----------|---------|--------|----|-----------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|------|------|----|----------|---|
| 142.11 | J05AB14 | valganciklovir | p.o. | 0.90 | GM | 1 943.81 | P |
|--------|---------|----------------|------|------|----|----------|---|

97249 VALCYTE 450 MG por tbl film60x450mg HLR D

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|-----|----|--------|---|
| 142.12 | J05AB15 | brivudin | p.o. | 125 | MG | 195.00 | P |
|--------|---------|----------|------|-----|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|
| 142.13 | J05AD01 | foskarnet | parent. | 6.50 | GM | 3 006.25 | U/P |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|--------|-------|----|--------|---|
| 142.14 | J05AH01 | zanamivir | inhal. | 20.00 | MG | 121.00 | P |
|--------|---------|-----------|--------|-------|----|--------|---|

Zanamivir je indikován v indikaci léčby influenze A a B u pacientů, kteří z důvodu kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k přetidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|
| 142.15 | J05AH02 | oseltamivir | p.o. | 150.00 | MG | 121.00 | P |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|

Oseltamivir je indikován v indikaci léčby influenze A a B u pacientů, kteří z důvodu kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k přetidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------|------|------|----|-------|---|
| 142.16 | J05AX05 | inosin pranobex | p.o. | 1.00 | GM | 27.35 | P |
|--------|---------|-----------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu inosin pranobexem předepisuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

16591 ISOPRINOSINE tbl 50x500mg EWP CZ

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 143 | Antiretrovirotika | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|

Léčbu antiretrovirovými léčivy (atazanavir, zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indinavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin, abacavir, tenofovir disoproxil, fosamprenavir a emtricitabin) předepisuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále předepisuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|---|
| 143.1 | J05AE | inhibitory proteáz (lopinavir,ritonavir v kombinaci) | p.o. | 6.00 | DF | 507.60 | P |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------|------|-----|----|--------|---|
| 143.2 | J05AE | atazanavir | p.o. | 0.3 | GM | 399.25 | P |
|-------|-------|------------|------|-----|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 143.3 | J05AE01 | saquinavir | p.o. | 1.80 | GM | 399.25 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

25493 FORTOVASE 200 MG porcpsmol180x200mg RRG GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 143.4 | J05AE02 | indinavir | p.o. | 2.40 | GM | 399.25 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 143.5 | J05AE03 | ritonavir | p.o. | 1.20 | GM | 399.25 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|----------|-----|
| 143.6 | J05AE04 | nelfinavir | p.o. | 2.25 | GM | 399.25 | P |
| 143.7 | J05AE07 | fosamprenavir | p.o. | 1.40 | GM | 399.25 | P |
| 143.8 | J05AF01 | zidovudin | p.o. | 1.50 | GM | 685.28 | P |
| 143.9 | J05AF01 | zidovudin | parent. | 1.00 | GM | 2 613.03 | U/P |

46406 RETROVIR inf cnc5x20ml/200mg GB
 86100 RETROVIR inf cnc5x20ml/200mg GOK GB

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|--------|---|
| 143.10 | J05AF02 | didanosin | p.o. | 0.40 | GM | 236.43 | P |
| 143.11 | J05AF03 | zalcitabin | p.o. | 2.25 | MG | 235.25 | P |
| 143.12 | J05AF04 | stavudin | p.o. | 80.00 | MG | 271.90 | P |
| 143.13 | J05AF05 | lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně | p.o. | 0.30 | GM | 260.30 | P |

02087 ZEFFIX 5MG/ML sol 1x240ml/1.2g GWL GB
 27035 ZEFFIX 100 MG por tbl/film 28x100mg GLA GB
 27036 ZEFFIX 100 MG por tbl/film 84x100mg GLA GB
 27037 ZEFFIX 5MG/ML sol 1x240ml/1.2g GLA GB
 94802 ZEFFIX 5MG/ML sol 1x240ml/1.2g GWE D

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|--------|----|--------|---|
| 143.14 | J05AF05 | lamivudin nad 100 mg v jedné tableté respektive nad 5 mg v jednom mililitru | p.o. | 0.30 | GM | 243.01 | P |
| 143.15 | J05AF06 | abacavir | p.o. | 600.00 | MG | 328.76 | P |

26863 ZIAGEN por tbl film60x300mg GLA GB

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|--------|----|--------|---|
| 143.16 | J05AF07 | tenofovir disoproxil | p.o. | 245.00 | MG | 460.00 | P |
| 143.17 | J05AF08 | adefovir dipivoxil | p.o. | 10.00 | MG | 610.00 | X |
| 143.18 | J05AF09 | emtricitabin | p.o. | 200.00 | MG | 255.00 | P |
| 143.19 | J05AF30 | abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinaci | p.o. | 2.00 | DF | 788.69 | P |

26808 TRIZIVIR por tbl film 60 GLA GB
 26809 TRIZIVIR por tbl film 60 GLA GB
 30158 TRIZIVIR por tbl film 60 GOW GB

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|--------|----|---------|---|
| 143.20 | J05AF30 | jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin) | p.o. | 2.00 | DF | 522.13 | P |
| 143.21 | J05AG01 | nevirapin | p.o. | 0.40 | GM | 343.34 | P |
| 143.22 | J05AG03 | efavirenz | p.o. | 0.60 | GM | 387.90 | P |
| 143.23 | J05AX07 | enfuvirtid | parent. | 180.00 | MG | 1492.00 | P |

Enfuvirtid je hrazen u HIV pozitivních pacientů, pokud selhala antiretrovirová terapie z důvodů vzniku rezistence či závažných vedlejších příznaků.

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 144.1 | J06AA | sérum proti stafylokokovým infekcím | parent. | | | plně | K/P |
|-------|-------|-------------------------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti stafylokokovým infekcím předepisuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|--|--|------|---|
| 144.2 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková parent. vakcína) | parent. | | | plně | K |
|-------|-------|---|---------|--|--|------|---|

94269 POLYSTAFANA inj 10x0.5ml/5.4ut SVF CZ

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 145 | Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu |
|-----|--------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|--|--|------|-----|
| 145.1 | J06AA01 | sérum proti záškrtu | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|---------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti záškrtu předepisuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

| | |
|-----|--|
| 146 | Zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 146.1 | J06AA03 | sérum proti hadímu jedu | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|-------------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti hadímu jedu předepisuje lékař k léčbě uštnutí zmijí obecnou.

13790 VIPER VENOM ANTITOXIN inj 1x5ml/500ut BIM PL

| | |
|-----|--|
| 147 | Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|--|--|------|-----|
| 147.1 | J06AA04 | sérum proti botulinu | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|----------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti botulismu předepisuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

| | |
|-----|--|
| 148 | Zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 148.1 | J06AA05 | sérum proti plynaté sněti | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|---------------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti plynaté sněti předepisuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

| | |
|-----|--|
| 149 | Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|---------|--|--|------|-----|
| 149.1 | J06AA06 | sérum proti vzteklině | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|-----------------------|---------|--|--|------|-----|

Sérum proti vzteklině předepisuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

42843 FAVIRAB inj sol 1x5ml/2ku AVS F

| | |
|-----|---|
| 150 | imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 150.1 | J06BA01 | imunoglobuliny, norm. lidské k extravaskulární aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli | parent. | 1.00 | DF | 600.00 | O |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 150.2 | J06BA01 | imunoglobuliny, norm. lidské k extravaskulární aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli | parent. | 1.00 | DF | 247.24 | O |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

57669 PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16 inj 1x2ml/320mg GFO E

| | |
|-----|---|
| 151 | imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|
| 151.1 | J06BA | imunoglobuliny, norm. lidské k extravaskulární aplikaci), kombinace s histaminem | parent. | 1.00 | DF | 83.84 | O |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|

87736 HISTAGLOBIN

inj 3x12mg+sol.

BBL CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 151.2 | J06BA02 | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci | parent. | 1.00 | GM | 956.88 | B |
| 151.3 | J06BA02 | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM) | parent. | 1.00 | GM | 1 955.16 | U |
| 151.4 | J06BA02 | imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci se sníženým obsahem IgA | parent. | 1.00 | GM | 1 400.00 | B/P |

Jako lék druhé volby s přítomností prokázaných protilátek proti IgA.

152 lidské imunoglobuliny proti tetanu

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|---|
| 152.1 | J06BB02 | imunoglobulin proti tetanu | parent. | | | plně | B |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|---|

57804 PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF

inj 1x1ml/250ut-str

GFO E

57805 PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF

inj 1x2ml/500ut-str

GFO E

83607 TETABULIN S/D

injsol1x1ml/250ut+s

BXG A

153 lidské imunoglobuliny proti hepatitidě

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------|---|
| 153.1 | J06BB04 | imunoglobulin proti hepatitidě B | parent. | | | plně | K |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------|---|

48851 PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO

injsol1x0.5ml/100ut

GFO E

57419 PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO

inj 1x3ml/600ut

GFO E

57420 PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO

inj 1x5ml/1000ut

GFO E

97558 NEOHEPATECT

inf sol 1x2ml/100ut

BTP D

97559 NEOHEPATECT

inf sol1x10ml/500ut

BTP D

97560 NEOHEPATECT

inf sol1x40ml/2ku

BTP D

97897 HEPATECT

inj 1x2ml

BTP D

97898 HEPATECT

inj 1x10ml

BTP D

154 lidské imunoglobuliny proti vzteklině

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|-----|
| 154.1 | J06BB05 | imunoglobulin proti rabies | parent. | | | plně | K/P |
|-------|---------|----------------------------|---------|--|--|------|-----|

155 ostatní lidské specifické imunoglobuliny

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|
| 155.1 | J06BB01 | anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně) | parent. | 250.00 | RG | 1 407.96 | K |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|
| 155.2 | J06BB01 | anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli) | parent. | 250.00 | RG | 1 163.43 | K |
|-------|---------|---|---------|--------|----|----------|---|

57573 PARTOBULIN S/D

inj 1x1ml/250rg

BXG A

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------------|---------|------|----|-----------|-----|
| 155.3 | J06BB03 | imunoglobulin proti a pásovému oparu | neštovicím | parent. | 1.00 | KU | 32 724.00 | K/P |
|-------|---------|--------------------------------------|------------|---------|------|----|-----------|-----|

Léčbu imunoglobulinu proti neštovicím a pásovému oparu předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr u:

- a) neočkováné těhotné ženy,
- b) novorozence po kontaktu s varicellou,
- c) imunokompromitovaného pacienta po kontaktu s varicellou,
- d) varicelzní primární pneumonitis.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 155.4 | J06BB09 | imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci | parent. | 1.00 | GM | 4 745.64 | U/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr u:

- a) novorozence s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
 - b) generalizované cytomegalovirové infekce u imunokompromitovaných pacientů,
 - c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

| | | | | | | | |
|-------|------------------|---|--------------------|------|----|-----------|---|
| 94862 | CYTOTECT BIOTEST | | inf sol 1x10ml-amp | BTP | D | | |
| 94863 | CYTOTECT BIOTEST | | inf sol 1x20ml-amp | BTP | D | | |
| 94864 | CYTOTECT BIOTEST | | inf sol 1x50ml-lah | BTP | D | | |
| 155.5 | J06BB12 | protiencefalický globulin | parent. | 1.00 | ML | 300.65 | K |
| 155.6 | J06BB16 | palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně | parent | 1.00 | DF | 19 633.00 | X |
| 155.7 | J06BB16 | palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli | parent. | 1.00 | DF | 32 444.61 | X |

27636 SYNAGIS 100 MG inj pso lfq 1x100mg ABB GB
156 očkovací látky proti tetanu

| 156.1 | J07AM01 | tetanový toxoid | parent. | | plně | K | | |
|-------|---------|--|-------------------|---------|------|----|-------|-----|
| 83443 | TETAVAX | | inj 1x0.5ml-stř. | AVS | F | | | |
| 83444 | TETAVAX | | inj 20x0.5ml-stř. | AVS | F | | | |
| 83445 | TETAVAX | | inj 1x10ml-lahv. | AVS | F | | | |
| 83447 | TETAVAX | | inj 10x20ml-lahv. | AVS | F | | | |
| 83525 | TETAVAX | | inj 20x0.5ml-amp. | AVS | F | | | |
| 83526 | TETAVAX | | inj 10x10ml-lahv. | AVS | F | | | |
| 83622 | ALTEANA | | inj 10x0.5ml/40ut | SVF | CZ | | | |
| 156.2 | J07AM51 | tetanový anatoxin, s anatoxinem záškrtu | kombinace | parent. | 1.00 | DF | 11.67 | O/P |

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

157 jiné bakteriální vakcíny

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--------------------|------|----|--------|-----|
| 157.1 | J07AG01 | hemofilus influenze B, čistěný purifikovaný antigen | parent. | 1.00 | DF | 212.30 | O/P |
| 157.2 | J07AL01 | pneumoková vakcína | parent. | 1.00 | DF | 227.36 | O/P |
| 85534 | PNEUMO 23 | | inj 1x0.5ml+střík. | AVS | F | | |
| 157.3 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína) | parent. | 1.00 | DF | 206.02 | O |
| 157.4 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů) | parent. | 1.00 | DF | 26.15 | K |
| 157.5 | J07AX | jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína) | parent. | 1.00 | DF | 280.47 | O |

158 očkovací látky proti tuberkulóze

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 158.1 | J07AN01 | tuberkulosa, mykobakterium | živé | atenuované | parent. | 1.00 | DF | 223.55 | H |
|-------|---------|-------------------------------|------|------------|---------|------|----|--------|---|

58227 BCG VACCINE SSI inj sic 10x10d Áv+so SST DK

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 159 | očkovací látky proti vzteklině |
|-----|---------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|--|--|------|---|
| 159.1 | J07BG01 | inaktivovaný celý virus vztekliny | parent. | | | plně | K |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|--|--|------|---|

75379 RABIPUR inj sic 1x2.5ut+sol CBG D

90996 RABIPUR inj sic 5x2.5ut+sol CBG D

93706 VERORAB inj sic 1dav.+0.5ml AVS F

| | |
|-----|--|
| 160 | ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci |
|-----|--|

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný je hrazen po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 160.1 | J07AH03 | meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigen | parent. | 1.00 | DF | 101.83 | O/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|

76063 MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINE inj sic 1x1dav+str AVS F

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 160.2 | J07AH07 | meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný | parent. | 1.00 | DF | 420.00 | O/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|---------|------|----|--------|-----|
| 160.3 | J07BB02 | chřipka, čištěný antigen | parent. | 1.00 | DF | 140.00 | O/P |
|-------|---------|--------------------------|---------|------|----|--------|-----|

Vakcína je indikována u pacientů nad 65 let věku a u pacientů po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdece a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a to pokud nejsou očkování proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhl. MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----|
| 160.4 | J07BF03 | dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus | parent. | 1.00 | DF | 95.30 | O/P |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|-------|-----|
| 160.5 | J07BJ01 | zarděnky, živý oslabený vírus | parent. | 1.00 | DF | 74.00 | O/P |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|-------|-----|

| | |
|-----|--|
| 161 | ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 161.1 | J01MB05 | kyselina oxolinová | p.o. | 1.00 | GM | 9.00 | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|--|

| | |
|-----|---|
| 162 | cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 162.1 | L01AA01 | cyklofosfamid | p.o. | 0.10 | GM | 5.18 | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|

94174 CYCLOPHOSPHAMIDE ORION tbl obd 50x50mg ONA SF

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 162.2 | L01AA02 | chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 4.50 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 162.3 | L01AA02 | chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 3.72 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 162.4 | L01AA03 | melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 4.30 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 162.5 | L01AA03 | melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 2.88 | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|-----------|
| 162.6 | L01AB01 | busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 4.89 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 163 | cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 163.1 | L01AA01 | cyklofosfamid | parent. | 10.00 | MG | 3.52 | B |
| 84230 | ENDOXAN 500 MG | | inj plv sol 1x500mg | BXH | D | | |
| 84231 | ENDOXAN 1 G | | inj plv sol 1x1gm | BXH | D | | |
| 163.2 | L01AA03 | melfalan | parent. | 1.00 | MG | 12.61 | B/ONK,HEM |
| 163.3 | L01AA05 | chlormethin | parent. | 1.00 | MG | 34.22 | B/ONK,HEM |
| 163.4 | L01AA06 | ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 1.30 | B/ONK,HEM |
| 163.5 | L01AA06 | ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 1.23 | B/ONK,HEM |
| 49984 | HOLOXAN 2 G | | inj plv sol 1x2gm | BXH | D | | |
| 163.6 | L01AB01 | busulfán | parent. | 1.00 | MG | 180.00 | B/ONK,HEM |
| 163.7 | L01AX04 | dakarbazin | parent. | 10.00 | MG | 7.90 | B/ONK,HEM |
| 164 | antimetabolity – analoga listové kyseliny, perorální podání | | | | | | |
| 164.1 | L01BA01 | metotrexát | p.o. | 1.00 | MG | 1.52 | |
| 91922 | METHOTREXAT LACHEMA 10 | | tbl 100x10mg | PVL | CZ | | |
| 165 | antimetabolity – analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 165.1 | L01BA01 | metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 9.09 | B |
| 165.2 | L01BA01 | metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 3.12 | B |
| 11191 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML | | inj 1x2ml/50mg-lah | PHM | NL | | |
| 11192 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML | | inj 5x2ml/50mg-amp | PHM | NL | | |
| 11193 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML | | inj 1x4ml/100mg-lah | PHM | NL | | |
| 11194 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML | | inj 1x8ml/200mg-lah | PHM | NL | | |
| 11195 | METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML | | inj 1x20ml/500mg-la | PHM | NL | | |
| 64784 | METHOTREXAT EBEWE | | inf 1x5ml/500mg | EBP | A | | |
| 87564 | METHOTREXAT LACHEMA 50 | | inj sic 10x50mg | PVL | CZ | | |
| 93964 | METHOTREXAT LACHEMA 50 | | inj 10x5ml/50mg | PVL | CZ | | |
| 165.3 | L01BA01 | metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | MG | 4.89 | B |
| 165.4 | L01BA03 | raltitrexed | parent. | 1.00 | DF | 7 498.20 | X |
| 165.5 | L01BA04 | pemetrexed | parent. | 500.00 | MG | 39 327.00 | X |
| 166 | antimetabolity – analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání | | | | | | |
| 166.1 | L01BB02 | merkaptopurin | p.o. | 10.00 | MG | 6.21 | L/ONK,HEM |
| 166.2 | L01BB03 | tioguanin | p.o. | 10.00 | MG | 9.34 | L/ONK,HEM |
| 166.3 | L01BB05 | fludarabin | p.o. | 1.00 | MG | 87.20 | L/ONK,HEM |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|-------|-----------|-----------|
| 58897 | FLUDARA | | tbl obd 15x10mg | SAG | D | |
| 58898 | FLUDARA | | tbl obd 20x10mg | SAG | D | |
| 166.4 | L01BC | azaribin | p.o. | 1.00 | MG 8.50 | L/ONK,HEM |
| 166.5 | L01BC02 | fluorouracil | p.o. | 10.00 | MG 1.47 | L/ONK,HEM |
| 166.6 | L01BC03 | tegafur | p.o. | 10.00 | MG 1.17 | L/ONK,HEM |
| 10407 | FTORAFUR | | cps 100x400mg | GRX | LV | |
| 166.7 | L01BC06 | capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 1.00 | DF 35.58 | X |
| 166.8 | L01BC06 | capecitabin nad 150 mg v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | DF 117.97 | X |
| 167 | antimetabolity – analoga purinů, ostatní cesty aplikace | | | | | |
| 167.1 | L01BB04 | cladribin | parent. | 1.00 | MG 884.61 | B/ONK,HEM |
| 167.2 | L01BB05 | fludarabin | parent. | 1.00 | MG 127.60 | B/ONK,HEM |
| 59058 | FLUDARA | | inj sic 5x50mg | SHI | I | |
| 77008 | FLUDARA | | inj sic 5x50mg | SAG | D | |
| 168 | antimetabolity – analoga pyrimidinů | | | | | |
| 168.1 | L01BC01 | cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG 1.18 | B/ONK,HEM |
| 08796 | CYTOSAR 100 MG | | inj sic 1x100mg+sol | PPU | B | |
| 13874 | ALEXAN 100MG/5ML | | inf cnc sol 10x5ml | EBP | A | |
| 13875 | ALEXAN 40MG/2ML | | inf cnc sol 30x2ml | EBP | A | |
| 13876 | ALEXAN 40MG/2ML | | inf cnc sol 10x2ml | EBP | A | |
| 168.2 | L01BC01 | cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG 0.95 | B/ONK,HEM |
| 13872 | ALEXAN 500MG/10ML | | inf cnc sol 1x10ml | EBP | A | |
| 13873 | ALEXAN 1000MG/20ML | | inf cnc sol 1x20ml | EBP | A | |
| 65423 | CYTOSAR 1 G | | inj sic 1x1gm | PPU | B | |
| 85837 | CYTOSAR 500 MG | | inj sic 1x500mg+sol | PPU | B | |
| 168.3 | L01BC02 | fluorouracil | parent. | 10.00 | MG 2.58 | B/ONK,HEM |
| 11171 | FLUOROURACIL-TEVA | | inj sol 1x5ml/250mg | PHM | NL | |
| 11173 | FLUOROURACIL-TEVA | | inj sol1x10ml/500mg | PHM | NL | |
| 11175 | FLUOROURACIL-TEVA | | injsol1x20ml/1000mg | PHM | NL | |
| 11393 | LA-FU 50 MG/ML | | inj sol 1x10ml | PVL | CZ | |
| 11394 | LA-FU 50 MG/ML | | inj sol 10x10ml | PVL | CZ | |
| 12665 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | | inj 1x10ml/500mg | EBP | A | |
| 12666 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | | inj 1x20ml/1000mg | EBP | A | |
| 12667 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | | inj 1x100ml/5000mg | EBP | A | |
| 32752 | FLUORO-URACIL ICN | | inj sol 5x20ml/1gm | IAB | CH | |
| 32753 | FLUORO-URACIL ICN | | inj sol1x100ml/5gm | IAB | CH | |
| 32761 | FLUOROURACIL-TEVA | | inj sol 1x100ml/5gm | PHM | NL | |
| 56055 | 5-FLUOROURACIL EBEWE | | inj 1x5ml/250mg | EBP | A | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|------|-----------|
| 168.4 | L01BC03 | tegafur | parent. | 10.00 | MG | 2.83 | B/ONK,HEM |
| 168.5 | L01BC05 | gemcitabin | parent. | 1.00 | MG | 5.68 | X |

84335 GEMZAR 200 MG inf plv sol 1x200mg

LIL F

84336 GEMZAR 1 G inf plv sol 1x1gm

LIL F

169 alkaloidy z rodu vinca a analoga

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 169.1 | L01CA01 | vinblastin | parent. | 1.00 | MG | 26.54 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----------|
| 169.2 | L01CA02 | vinkristin | parent. | 1.00 | MG | 165.00 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----------|

11420 VINCRISTINE-TEVA inj 1x1ml/1mg PHM NL

11421 VINCRISTINE-TEVA inj 1x2ml/2mg PHM NL

11422 VINCRISTINE-TEVA inj 1x5ml/5mg PHM NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 169.3 | L01CA04 | vinorelbin | p.o. | 1.00 | MG | 108.35 | X |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 169.4 | L01CA04 | vinorelbin | parent. | 1.00 | MG | 102.85 | X |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

170 deriváty podofylotoxinu, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|-----------|
| 170.1 | L01CB01 | etoposid | p.o. | 1.00 | MG | 2.84 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|------|------|----|------|-----------|

93696 LASTET 25 cps 40x25mg NKU J

93697 LASTET 50 cps 20x50mg NKU J

93698 LASTET 100 cps 10x100mg NKU J

171 deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|-----------|
| 171.1 | L01CB01 | etoposid | parent. | 1.00 | MG | 2.91 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|-----------|

11390 ETOPOSIDE-TEVA inf cnc1x10ml/200mg PHM NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|
| 171.2 | L01CB02 | teniposid | parent. | 1.00 | MG | 6.06 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|

172 taxany

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 172.1 | L01CD01 | paclitaxel | parent. | 1.00 | MG | 133.20 | X |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

05953 PAXENE inf cnc sol 1x50ml IXP CZ

16069 ONXOL inf cnc sol 1x25ml IXP CZ

16070 ONXOL inf cnc sol 1x50ml IXP CZ

27309 PAXENE inf cnc sol 1x25ml NRT GB

28068 PAXENE inf cnc sol 1x50ml NRT GB

45155 PAXENE inf cnc sol 1x25ml IXP CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 172.2 | L01CD02 | docetaxel | parent. | 1.00 | MG | 233.50 | X |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

173 antracykliny a jejich deriváty

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|-----------|
| 173.1 | L01DA01 | daktinomycin | parent. | 1.00 | MG | 664.85 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.2 | L01DB01 | doxorubicin (do 40 mg včetně ampulí) | parent. | 1.00 | MG | 29.05 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|

32975 DOXORUBICIN-TEVA 0.2%

inj sol 1x10mg/5ml

PHM NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.3 | L01DB01 | doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 28.90 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--|---------|------|----|-------|-----------|

32977 DOXORUBICIN-TEVA 0.2%

inj sol 1x50mg/25ml

PHM NL

32978 DOXORUBICIN-TEVA 0.2%

inj sol 1x200mg/100ml

PHM NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.4 | L01DB02 | daunorubicin | parent. | 1.00 | MG | 19.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|-------|-----------|

173.5 L01DB03 epirubicin

parent.

1.00 MG

35.85 B/ONK,HEM

58289 FARMORUBICIN PFS

inj 1x25ml/50mg

PUH I

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.6 | L01DB04 | aklarubicin | parent. | 1.00 | MG | 19.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.7 | L01DB05 | zorubicin | parent. | 1.00 | MG | 19.21 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 173.8 | L01DB06 | idarubicin | p.o. | 1.00 | MG | 247.20 | X |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----------|
| 173.9 | L01DB06 | idarubicin | parent. | 1.00 | MG | 640.30 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 173.10 | L01DB07 | mitoxantron | parent. | 1.00 | MG | 53.96 | B/ONK,HEM |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|------|----|-----------|---|
| 173.11 | L01XX32 | bortezomibum | parent. | 3.50 | MG | 36 000.00 | X |
|--------|---------|--------------|---------|------|----|-----------|---|

174 ostatní cytotoxická antibiotika

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 174.1 | L01DC01 | bleomycin | parent. | 1.00 | MG | 50.09 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|-----------|

03404 BLEOCIN inj sic 1x15mg NKU J

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|
| 174.2 | L01DC03 | mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 61.40 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 174.3 | L01DC03 | mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 54.50 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|

83440 MITOMYCIN C KYOWA inj plv sol 5x20mg KYA J

175 platinová cytostatika

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|
| 175.1 | L01XA01 | cisplatin | parent. | 1.00 | MG | 7.45 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|

92302 CISPLATIN EBEWE inf cnc sol 1x100ml EBP A

96454 PLATIDIAM 25 inf cnc sol 5x50ml PVL CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|
| 175.2 | L01XA02 | karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 6.45 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|

90777 CYCLOPLATIN 50 inf plv sol 10x50mg PVL CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|
| 175.3 | L01XA02 | karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 3.65 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|------|-----------|

10830 CARBOPLATIN-TEVA inj 1x45ml/450mg PHM NL

14327 CARBOPLATIN-TEVA inj sol 1x60ml/600mg PHM NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 175.4 | L01XA03 | oxaliplatin | parent. | 1.00 | MG | 106.50 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

176 ostatní cytostatika, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|-----------|
| 176.1 | L01AD02 | lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 5.72 | L/ONK,HEM |
| 176.2 | L01AD02 | lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.00 | MG | 5.63 | L/ONK,HEM |

64652 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MG cps 20x40mg BMS I

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-----------|
| 176.3 | L01AD02 | lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 4.39 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-----------|

64653 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MG cps 20x100mg BMS I

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|-------|--------|----|-----------|---|
| 176.4 | L01AX03 | temozolomid | p. o. | 370.00 | MG | 13 369.00 | X |
|-------|---------|-------------|-------|--------|----|-----------|---|

27705 TEMODAL 20 MG por cps dur 5x20mg SBS B

27707 TEMODAL 100 MG por cps dur 5x100mg SBS B

27709 TEMODAL 250 MG por cps dur 5x250mg SBS B

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|-----------|
| 176.5 | L01XB01 | prokarbazin | p.o. | 10.00 | MG | 2.44 | L/ONK,HEM |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|------|-------------------|
| 176.6 | L01XX05 | hydroxymočovina | p.o. | 0.10 | GM | 1.80 | L/ONK,HEM, URN |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|-------------------|
| 176.7 | L01XX14 | tretinoïn | p.o. | 10.00 | MG | 98.65 | L/ONK,HEM, URN |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|--------|---|
| 176.8 | L01XX25 | bexaroten | p.o. | 75.00 | MG | 451.30 | X |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|--------|----|----------|---|
| 176.9 | L01XX28 | imatinib | p.o. | 400.00 | MG | 2 672.95 | X |
|-------|---------|----------|------|--------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|--------|----|-------|---|
| 176.10 | L01XX33 | celecoxib | p.o. | 400.00 | MG | 45.40 | P |
|--------|---------|-----------|------|--------|----|-------|---|

Celecoxib předepisuje gastroenterolog, onkolog nebo chirurg v indikaci snížení počtu adenomatosních střevních polypů u familiární adenomatosní polyposy (FAP) jako přídatnou léčbu po chirurgickém výkonu.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|---|
| 176.11 | L01XX34 | erlotinib | p.o. | 1.00 | MG | 19.10 | X |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|---|

177 ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 177.1 | L01AC01 | thiotepa | parent. | 1.00 | MG | 21.31 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|
| 177.2 | L01AD01 | karmustin | parent. | 1.00 | MG | 9.73 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|-----------|

53666 BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU) inj sic 1x100mg+sol BQB I

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|-------|----|-------|-----------|
| 177.3 | L01AD04 | streptozocin | parent. | 10.00 | MG | 14.81 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|--------------|---------|-------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 177.4 | L01AD05 | fotemustin | parent. | 1.00 | MG | 94.48 | X |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

55407 MUSTOPHORAN injpsolqf1x208mg+so THN B

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|
| 177.5 | L01XC02 | rituximab | parent. | 10.00 | MG | 1 090.87 | X |
|-------|---------|-----------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-----------|---|
| 177.6 | L01XC03 | trastuzumab | parent. | 1.00 | DF | 25 414.00 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 177.7 | L01XC04 | alemtuzumab | parent. | 1.00 | MG | 442.20 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 177.8 | L01XC06 | cetuximab | parent. | 1.00 | MG | 67.92 | X |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 177.9 | L01XC07 | bevacizumab | parent. | 1.00 | MG | 105.41 | X |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|-----|
| 177.10 | L01XD02 | verteporfin | parent. | 15.00 | MG | 44 000.00 | K/P |
|--------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|-----|

Verteporfin k fotodynamické terapii /PDT/ předepisuje oftalmolog u nemocných se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou chorioideální neovaskularizací objektivizovanou angiografickým vyšetřením.

Standardní postup PDT je indikován u klasických a čistě okultních subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán (CHNVM), u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), dále u patologické myopie, angiodních pruhů, po traumatech, u syndromu histoplasmózy, u zánětlivých a idiopatických membrán, i při komplikacích makulárních dystrofí (morbus Best).

PDT je indikována i tam, kde by další pokles ZO jediného prakticky vidoucího oka pod 0,1 měl nepříznivý dopad na kvalitu života nemocného u komplikovaných případů nemocných se subfoveální CHNVM u VPMD, patologické myopie. Velikost léze je omezena: největší průměr je 5,4 mm. Funkce oka musí být rovna nebo lepší než 0,1. Podkladem pro indikaci je podrobné biomikroskopické a angiografické vyšetření (fluorescenční, event. indocyaninová angiografie), někdy i optická koherentní tomografie (OCT).

Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného centra. PDT bude prováděna na pracovištích, která splní nutné personální i přístrojové podmínky k zajištění dostupnosti pro nemocné.

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|---------|-------|----|----------|-------------------|
| 177.11 | L01XD03 | methylaminolevulinát | lok. | 2.00 | GM | 8 600.00 | X |
| 177.12 | L01XX01 | amsakrin | parent. | 1.00 | MG | 25.80 | B/ONK,HEM |
| 177.13 | L01XX02 | asparagináza | parent. | 1.00 | MG | 2 784.54 | B/ ONK,HEM |
| 177.14 | L01XX09 | miltefosin | lok. | 60.00 | MG | 9.78 | |
| 177.15 | L01XX11 | estramustin | parent. | 1.00 | MG | 0.91 | B/ONK,HEM, URN |

58800 ESTRACYT inj sic 10x300mg+so PIR I

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---------|------|----|-----------|---|
| 177.16 | L01XX17 | topotekan | parent. | 1.00 | MG | 2 913.06 | X |
| 177.17 | L01XX19 | irinotekan | parent. | 1.00 | MG | 50.68 | X |
| 177.18 | L01XX27 | oxid arsenitý | parent. | 1.00 | DF | 12 028.00 | X |

178 hormonální léčiva s cytostatickým účinkem

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|---------------|
| 178.1 | L01XX11 | estramustin | p.o. | 10.00 | MG | 3.21 | L/ONK,HEM,URN |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|------|---------------|

58742 ESTRACYT cps 100x140mg PIK I

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|--------|----|-------|--------------------------|
| 178.2 | L02AB01 | megestrol (pevné lékové formy) | p.o. | 160.00 | MG | 39.89 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |
|-------|---------|--------------------------------|------|--------|----|-------|--------------------------|

32103 MEGAPLEX 160 MG por tblnob30x160mg PHM NL

58936 MEGACE 160 MG tbl 100x160mg HAG D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|--------|----|-------|---|
| 178.3 | L02AB01 | megestrol (tekuté lékové formy) | p.o. | 160.00 | MG | 70.97 | P |
|-------|---------|---------------------------------|------|--------|----|-------|---|

Indikován v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

53145 MEGACE SUSP. sus por 1x240ml BYE E

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|--------|--------------------------|
| 178.4 | L02AB02 | medroxypregesteron | p.o. | 1.00 | GM | 144.54 | L/ONK,HEM,URN GYN,SEX |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|--------|--------------------------|

32121 MEDROPLEX 100 MG por tblnob100x100mg PHM NL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|--------|---------------|
| 178.5 | L02AB02 | medroxypregesteron | parent. | 1.00 | GM | 639.00 | L/ONK,GYN,SEX |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|--------|---------------|

87805 DEPO-PROVERA inj sus 1x1ml-lag PMB B

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---------------|
| 178.6 | L02AB03 | gestonoron | parent. | 1.00 | MG | 1.12 | L/ONK,GYN,SEX |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|------|----|--------|---|
| 178.7 | L02AE01 | buserelin | inhal. | 1.00 | MG | 233.29 | Z |
|-------|---------|-----------|--------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|-----|
| 178.8 | L02AE01 | buserelin | parent. | 1.00 | MG | 253.00 | K/P |
| 178.9 | L02AE01 | buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 719.80 | K/P |
| 178.10 | L02AE01 | buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 576.70 | K/P |
| 178.11 | L02AE02 | leuprorelin | parent. | 1.00 | MG | 253.00 | K/P |
| 178.12 | L02AE02 | leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 294.40 | K/P |
| 178.13 | L02AE02 | leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 218.60 | K/P |
| 178.14 | L02AE03 | goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 294.40 | K/P |
| 178.15 | L02AE03 | goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 269.20 | K/P |
| 178.16 | L02AE04 | triptorelin | parent. | 1.00 | DF | 226.70 | K/P |
| 178.17 | L02AE04 | triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně) | parent. | 1.00 | MG | 1 288.90 | K/P |
| 178.18 | L02AE04 | triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x za tři měsíce) | parent. | 1.00 | MG | 1 218.50 | K/P |

Léčbu předepisuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog k: a) léčbě karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (goserelin); b) léčbě karcinomu prostaty (buserelin, leuprorelin, goserelin, triptorelin); c) léčbě myomatosy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperacní redukci nálezu (leuprorelin, goserelin, triptorelin); d) léčbě těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy (leuprorelin, goserelin, triptorelin); e) léčbě pubertas praecox (leuprorelin, triptorelin); f) indukci ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení lékařem (goserelin, triptorelin)

| 179 antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|-------|----|------|-----------------------|
| 179.1 | L02AA01 | diethylstilbestrol | p.o. | 10.00 | MG | 3.32 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
| 179.2 | L02AA01 | diethylstilbestrol | parent. | 10.00 | MG | 6.55 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
| 179.3 | L02AA02 | polyestradiol fosfát | parent. | 1.00 | MG | 3.18 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
| 179.4 | L02AA03 | ethinylestradiol | p.o. | 1.00 | MG | 4.06 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
| 179.5 | L02AA04 | fosfestrol | p.o. | 0.10 | GM | 3.32 | L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX |
| 179.6 | L02AA04 | fosfestrol | parent. | 0.10 | GM | 4.79 | B/ONK,HEM,URN,SEX |
| 179.7 | L02BA01 | tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 20.00 | MG | 5.00 | |

10703 TAMIFEN 10 por tbl nob100x10mg MOE CY

31581 TAMOPLEX 10 MG porttblnob100x10mg-l PHM NL

31586 TAMOPLEX 20 MG porttblnob100x20mg-l PHM NL

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|
| 44056 | TAMOXIFEN EBEWE 10 MG | por tbl nob30x10mg | EBP | A |
| 44057 | TAMOXIFEN EBEWE 20 MG | por tbl nob30x20mg | EBP | A |
| 67039 | TAMIFEN 10 | por tbl nob 30x10mg | MOE | CY |
| 88392 | TAMOXIFEN LACHEMA 10 | tbl 100x10mg | PVL | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 179.8 | L02BA01 | tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě) | p.o. | 20.00 | MG | 3.65 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------------------|-----|---|
| 44058 | TAMOXIFEN EBEWE 30 MG | por tbl nob30x30mg | EBP | A |
| 44059 | TAMOXIFEN EBEWE 40 MG | por tbl nob30x40mg | EBP | A |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|-------|
| 179.9 | L02BA02 | toremifén | p.o. | 60.00 | MG | 9.96 | L/ONK |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|--------|------|----|--------|---|
| 179.10 | L02BA03 | fulvestrant | parent | 8.30 | MG | 500.00 | X |
|--------|---------|-------------|--------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|-----------------------|
| 179.11 | L02BB01 | flutamid | p.o. | 0.75 | GM | 67.30 | L/ONK,URN,SEX, END |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|-----------------------|

| | | | | |
|-------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 16036 | APO-FLUTAMIDE | tbl obd 100x250mg | CMG | IRL |
| 16579 | APO-FLUTAMIDE | tbl obd 100x250mg | KAT | NL |
| 31736 | FLUTAPLEX | portblnob100x250mg | PHM | NL |
| 54521 | ANDRAXAN | tbl obd 100x250mg | MCI | CZ |
| 58741 | APO-FLUTAMIDE | tbl obd 100x250mg | APT | CND |

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|---------------|
| 179.12 | L02BB02 | nileutamid | p.o. | 0.30 | GM | 158.30 | L/ONK,URN,SEX |
|--------|---------|------------|------|------|----|--------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|------|-------|----|--------|---|
| 179.13 | L02BB03 | bicalutamid do 50 mg včetně | p.o. | 50.00 | MG | 128.00 | P |
|--------|---------|-----------------------------|------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------|-------|----|--------|---|
| 179.14 | L02BB03 | bicalutamid nad 50 mg | p.o. | 50.00 | MG | 107.14 | P |
|--------|---------|-----------------------|------|-------|----|--------|---|

Léčba bicalutamidem 50 mg je indikována u pacientů s karcinomem prostaty, u kterých léčba flutamidem vede k rozvoji závažných nežádoucích účinků.

Léčba bicalutamidem 150 mg je předepisována urologem a onkologem jako časná adjuvantní léčba u nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty po radikální prostatektomii s rizikovými faktory (Gleason skore ≥ 7 , perineurální šíření nádoru, pozitivní chirurgické okraje), nebo u nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty jako konkomitantní a adjuvantní léčba k radioterapii.

180 inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|-------|----|--------|-----------|
| 180.1 | L02BG01 | aminoglutethimid | p.o. | 1.00 | GM | 62.45 | L/ONK,END |
| 180.2 | L02BG02 | formestan | parent. | 18.00 | MG | 235.90 | X |
| 180.3 | L02BG03 | anastrozol | p.o. | 1.00 | MG | 144.40 | X |
| 180.4 | L02BG04 | letrozol | p.o. | 2.50 | MG | 144.40 | X |

| | | | | |
|-------|--------|---------------------|-----|----|
| 56509 | FEMARA | por tbl flm30x2.5mg | NPA | CH |
|-------|--------|---------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|--------|---|
| 180.5 | L02BG06 | exemestan | p.o. | 25.00 | MG | 144.40 | X |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|--------|---|

181 Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|-----------|---|
| 181.1 | L03AA02 | filgrastim | parent. | 1.00 | MG | 9 070.60 | X |
| 181.2 | L03AA13 | pegfilgrastim | parent. | 1.00 | MG | 5 620.00 | X |
| 181.3 | L03AA03 | molgramostim (do 0,3 mg/G včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 13 613.27 | X |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-----------|---|
| 181.4 | L03AA03 | molgramostim (nad 0,3 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 11 843.67 | X |
| 181.5 | L03AA10 | lenograstim | parent. | 1.00 | MG | 12 477.40 | X |
| 181.6 | L03AB01 | interferon alfa natural | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.7 | L03AB03 | interferon gamma | parent. | 1.00 | MU | 1 531.33 | X |
| 181.8 | L03AB04 | interferon alfa-2a - aplikční forma "pera" | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.9 | L03AB04 | interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |

16555 ROFERON-A 9 MIU/0.5ML

sol inj5x9mu/0.5ml

RCE CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|---|
| 181.10 | L03AB04 | interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. – jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 202.50 | X |
| 181.11 | L03AB05 | interferon alfa-2b - aplikční forma "pera" | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.12 | L03AB05 | interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.13 | L03AB05 | interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formy | parent. | 1.00 | MU | 202.50 | X |
| 181.14 | L03AB06 | interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetně | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.15 | L03AB06 | interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuli | parent. | 1.00 | MU | 202.50 | X |
| 181.16 | L03AB07 | interferon beta - 1a do 22 rg v 1 amp. včetně | parent. | 1.00 | MU | 409.37 | X |
| 181.17 | L03AB07 | interferon beta - 1a nad 22 rg do 44 rg v 1 amp. včetně | parent. | 1.00 | MU | 314.00 | X |
| 181.18 | L03AB07 | interferon beta-1a výhradně pro intramuskulární podání | parent. | 1.00 | MU | 988.70 | X |
| 181.19 | L03AB08 | interferon beta-1b | parent. | 1.00 | MU | 276.80 | X |
| 181.20 | L03AB09 | interferon alfacon – 1 | parent. | 1.00 | MU | 219.09 | X |
| 181.21 | L03AB10 | peginterferon alfa- 2b | parent. | 1.00 | RG | 72.83 | X |
| 181.22 | L03AB11 | peginterferon alfa- 2a | parent. | 1.00 | RG | 47.40 | X |
| 181.23 | L03AC01 | aldesleukin | parent. | 1.00 | MG | 7 141.00 | X |

| | |
|-----|---|
| 182 | ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 182.1 | L03AX | bac. propionibacterii acnes | parent. | 1.00 | MG | 72.83 | O/ONK |
| 182.2 | L03AX | dialyzát lidských leukocytů | parent. | 1.00 | DF | 844.00 | P |

Dialyzát lidských leukocytů předepisuje lékař odbornosti alergolog a klinický imunolog nemocným se středně těžkou a těžkou primární nebo sekundární poruchou celulární imunity, prokázanou laboratorním imunologickým vyšetřením.

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------|------|------|----|-----|-----------|
| 182.3 | L03AX | dialyzát vepřových leukocytů | p.o. | 1.00 | BA | 60% | L/ALG,IMU |
|-------|-------|------------------------------|------|------|----|-----|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 182.4 | L03AX | laktobacillus acidophilus | parent. | 3.00 | DF | 587.57 | O/GYN |
|-------|-------|---------------------------|---------|------|----|--------|-------|

86711 SOLCOTRICHOVAC inj sus 3x0.5ml IAB CH

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|-----------|
| 182.5 | L03AX | směs bakteriálních lyzátů | lok. | 1.00 | BA | 60% | I/ALG,ORL |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|--|
| 182.6 | L03AX | směs bakteriálních lyzátů | p.o. | 1.00 | BA | 60% | |
|-------|-------|---------------------------|------|------|----|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|
| 182.7 | L03AX | thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 64.86 | Z |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|
| 182.8 | L03AX | thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 45.31 | Z |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|
| 182.9 | L03AX | vaccin. staphyl. phagolys. | lok. | 1.00 | ML | 36.51 | I/ALG,ORL |
|-------|-------|----------------------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 182.10 | L03AX | vaccin. staphyl. phagolys. | parent. | 1.00 | DF | 72.98 | O |
|--------|-------|----------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------|
| 182.11 | L03AX03 | BCG vakcína | lok. | 1.00 | MG | 37.00 | O/ONK,URN |
|--------|---------|-------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------|---------|-------|----|----------|---|
| 182.12 | L03AX13 | glatirameracetat kopolymer | parent. | 20.00 | MG | 1 106.56 | X |
|--------|---------|----------------------------|---------|-------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 183 | imunosupresivní léčiva, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|
| 183.1 | L04AA01 | cyklosporin | p.o. | 250.00 | MG | 240.70 | P |
|-------|---------|-------------|------|--------|----|--------|---|

Léčba cyklosporinem je indikována:

- a) v prevenci rejekce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
 - b) v léčbě myelodysplastického syndromu, který nereaguje na standardní léčbu,
 - c) v léčbě aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
 - d) v léčbě autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 - e) v léčbě nefrotického syndromu, který nereaguje na standardní léčbu,
 - f) u těžké formy revmatoidní artridy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 - g) u těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 - h) u systémového lupus erythematoses, který nereaguje na standardní léčbu,
 - i) u těžké formy polyomyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
 - j) v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí.
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
- k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog.
- l) u těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 183.2 | L04AA05 | tacrolimus do 0,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 407.30 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 183.3 | L04AA05 | tacrolimus nad 0,5 mg v jedné tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 329.40 | P |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu tacrolimem předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci:

1. transplantace ledvin
2. transplantace srdce
3. transplantace jater

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|------|------|----|--------|---|
| 183.4 | L04AA06 | kyselina mykophenolová | p.o. | 2.00 | GM | 447.08 | P |
|-------|---------|------------------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu mykofenolovou kyselinou předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin nebo transplantace srdce nebo plic. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 183.5 | L04AA10 | sirolimus | p.o. | 6.00 | MG | 630.20 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

Sirolimus předepisují lékaři transplantačních center u transplantací ledvin jako profylaktickou imunosupresi s prednisonem a redukovanou dávkou cyklosporinu nebo bez něj nebo v případě nefrotoxicity kalcineurinových inhibtorů jako jejich náhrady.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|
| 183.6 | L04AA13 | leflunomid | p.o. | 20.00 | MG | 79.10 | P |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|---|

Léčbu leflunomidem předepisuje revmatolog u pacientů s těžkou formou:

a) revmatoidní artridy se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení a přetrávající aktivitou nemoci při dostatečné dávce sulfasalazinu nebo metotrexátu, které jsou podávány nejméně po dobu 6 měsíců,
 b) psoriatické artridy.

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 183.7 | L04AA18 | everolimus | p.o. | 1.50 | MG | 315.10 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

Everolimus předepisují lékaři transplantačních center u transplantací ledvin jako profylaktickou imunosupresi s prednisonem a redukovanou dávkou cyklosporinu nebo bez něj nebo v případě nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů jako jejich náhrada.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 183.8 | L04AX01 | azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 10.00 | MG | 1.81 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----|----|
| 14317 IMURAN 25 MG | tbl obd 100x25mg | HNN | D |
| 23322 AZAPRINE 25 MG | por tbl flm100x25mg | IXP | CZ |
| 49023 IMURAN 25 MG | tbl obd 100x25mg | GAE | PL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 183.9 | L04AX01 | azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 10.00 | MG | 1.12 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----|----|
| 23323 AZAPRINE 50 MG | por tbl flm100x50mg | IXP | CZ |
|----------------------|---------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|--------|----|--------|---|
| 183.10 | L04AX02 | thalidomidum do 50mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 100.00 | MG | 174.00 | X |
|--------|---------|---|------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|------|--------|----|--------|---|
| 183.11 | L04AX02 | thalidomidum nad 50mg v jedné tabletě | p.o. | 100.00 | MG | 124.00 | X |
|--------|---------|---------------------------------------|------|--------|----|--------|---|

184 imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|------|--|
| 184.1 | L04AA01 | cyklosporin | parent. | 1.00 | MG | 2.52 | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|------|--|

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----|----|
| 15643 SANDIMMUN | inf cnc sol 10x5ml | NAI | CZ |
| 88514 SANDIMMUN | inf cnc sol 10x5ml | NPA | CH |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-----------|-------|
| 184.2 | L04AA02 | muromonab-CD3 | parent. | 5.00 | MG | 11 129.25 | U/J10 |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|----|--------|-------|
| 184.3 | L04AA03 | antilymfocytární IG | parent. | 10.00 | MG | 103.87 | U/J10 |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|-------|
| 184.4 | L04AA04 | antithymocytární IG (infuze) | parent. | 1.00 | MG | 69.40 | U/J10 |
|-------|---------|------------------------------|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|--------|-------|
| 184.5 | L04AA04 | antithymocytární IG (injekce) | parent. | 1.00 | MG | 121.46 | U/J10 |
|-------|---------|-------------------------------|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|
| 184.6 | L04AA05 | tacrolimus | parent. | 5.00 | MG | 1 544.69 | H |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----|-----|
| 57631 PROGRAF 5 MG/ML | infncsol10x1ml/5mg | FUJ | IRL |
|-----------------------|--------------------|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--------|----|------------|-------|
| 184.7 | L04AA08 | daclizumab | parent. | 350.00 | MG | 139 608.00 | U/J10 |
|-------|---------|------------|---------|--------|----|------------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 184.8 | L04AA09 | basiliximab | parent. | 20.00 | MG | 50 354.15 | H |
|-------|---------|-------------|---------|-------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|
| 184.9 | L04AA11 | etanerceptum | parent. | 7.00 | MG | 1 391.80 | X |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|-----------|---|
| 184.10 | L04AA12 | infliximab | parent. | 375.00 | MG | 66 975.00 | X |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|---|----|-----------|---|
| 184.11 | L04AA17 | adalimumab | parent. | 2 | DF | 41 316.38 | X |
|--------|---------|------------|---------|---|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 184.12 | L04AA21 | efalizumab | parent. | 1.00 | MG | 69.48 | X |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|------|-------|
| 184.13 | L04AX01 | azathioprin | parent. | 1.00 | MG | 9.82 | U/J10 |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|------|-------|

185 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|------|------|----|------|--|
| 185.1 | M01AA | butylpyrazolidiny | p.o. | 3.00 | DF | 3.32 | |
|-------|-------|-------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|------|-------|----|------|--|
| 185.2 | M01AA05 | klofezon | p.o. | 0.60 | GM | 3.32 | |
| 185.3 | M01AB | deriváty kyseliny octové | p.o. | 70.00 | MG | 1.76 | |
| 185.4 | M01AB01 | indometacin | p.o. | 0.10 | GM | 2.47 | |
| 185.5 | M01AB02 | sulindac | p.o. | 0.40 | GM | 4.36 | |
| 185.6 | M01AB03 | tolmetin | p.o. | 0.70 | GM | 4.36 | |
| 185.7 | M01AB05 | diklofenak | p.o. | 0.10 | GM | 3.60 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 185.8 | M01AB05 | diklofenak lékové formy s rychlým p.o. nástupem účinku | | 0.10 | GM | 3.80 | |
| 185.9 | M01AB06 | alclofenak | p.o. | 1.25 | GM | 3.60 | |
| 185.10 | M01AB09 | ilonazolak | p.o. | 0.60 | GM | 3.60 | |
| 185.11 | M01AB16 | aceklofenak | p.o. | 0.20 | GM | 3.60 | |
| 185.12 | M01AB55 | diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku) | p.o. | 0.10 | GM | 29.33 | Z |

186 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------|------|-----|-------|---|
| 186.1 | M01AE01 | ibuprofen | p.o. | 1.20 | GM | 3.31 | |
| 15301 | APO-IBUPROFEN 400 MG | | tbl obd 100x400mg | CMG | IRL | | |
| 17907 | APO-IBUPROFEN 400 MG | | tbl obd 100x400mg | KAT | NL | | |
| 186.2 | M01AE01 | ibuprofen (lékové formy sirupu) | p.o. | 1.20 | GM | 19.55 | |
| 186.3 | M01AE02 | naproxen (pevné lékové formy) | p.o. | 0.50 | GM | 3.60 | |
| 186.4 | M01AE02 | naproxen (tekuté lékové formy), | p.o. | 0.50 | GM | 13.15 | |
| 186.5 | M01AE03 | ketoprofen | p.o. | 0.15 | GM | 3.60 | |
| 186.6 | M01AE07 | suprofen | p.o. | 0.40 | GM | 3.60 | |
| 186.7 | M01AE08 | pirprofen | p.o. | 0.80 | GM | 3.60 | |
| 186.8 | M01AE09 | flurbiprofen | p.o. | 0.20 | GM | 3.60 | |
| 186.9 | M01AE10 | indoprofen | p.o. | 0.60 | GM | 3.60 | |
| 186.10 | M01AE11 | kyselina tiaprofenová | p.o. | 0.60 | GM | 3.60 | |
| 186.11 | M01AE12 | oxaprozin | p.o. | 0.90 | GM | 8.25 | P |

Oxaprozin se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|------|-------|----|------|--|
| 186.12 | M01AE17 | dexketoprofen | p.o. | 75.00 | MG | 4.52 | |
| 186.13 | M01AG02 | kyselina tolfenámová | p.o. | 0.30 | GM | 4.29 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 187 | ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva pro perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 187.1 | M01AC01 | piroxikam | p.o. | 20.00 | MG | 2.00 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

14997 APO-PIROXICAM 20 cps 100x20mg CMG IRL
 17159 APO-PIROXICAM 20 cps 100x20mg KAT NL
 97710 APO-PIROXICAM 20 cps 100x20mg APT CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 187.2 | M01AC01 | piroxikam (lékové formy s rychlým nastupem účinku) | p.o. | 20.00 | MG | 3.80 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 187.3 | M01AC02 | tenoxikam | p.o. | 20.00 | MG | 2.00 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 187.4 | M01AC05 | lornoxikam | p.o. | 12.00 | MG | 2.00 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|
| 187.5 | M01AC06 | meloxikam | p.o. | 15.00 | MG | 6.50 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|------|--|

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- a) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- b) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- c) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artrida dospělých ve všech stadiích onemocnění,
- b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé irritace,
- c) primární dysmenorea.

Z prostředku veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně.

Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě jejich indikování u pacientů trpících hypertenzí, hyperlipidémii, diabetem mellitus, periferním onemocněním tepen i kůráků. Podávání COX-2 inhibitorů je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku.

Etoricoxib je navíc kontraindikován u nekompenzované hypertenze.

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--------------------|-----|----|--|--|
| 13280 | RECOXA 15 | | por tbl nob10x15mg | ZEH | CZ | | |
| 13281 | RECOXA 15 | | por tbl nob20x15mg | ZEH | CZ | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|---|
| 187.6 | M01AH01 | celecoxib | p.o. | 0.20 | GM | 22.70 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.7 | M01AH03 | valdecoxit 10 mg | p.o. | 1.00 | DF | 22.70 | P |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.8 | M01AH03 | valdecoxit 20 mg | p.o. | 1.00 | DF | 25.90 | P |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.9 | M01AH03 | valdecoxit 40 mg | p.o. | 1.00 | DF | 24.30 | P |
|-------|---------|------------------|------|------|----|-------|---|

V indikaci osteoartróza a revmatoidní artrida je předepisována denní dávka valdecoxitu do 20 mg včetně, v indikaci primární dysmenorea denní dávka valdecoxitu v prvním dni do 80 mg včetně a následující dny do 40 mg včetně.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|---|
| 187.10 | M01AH05 | etoricoxib 120 mg v 1 tbl | p.o. | 60.00 | MG | 25.90 | P |
|--------|---------|---------------------------|------|-------|----|-------|---|

Etoricoxib v sile 120 mg v 1 tbl je hrazen při akutním dnavém záchvatu.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.11 | M01AH05 | etoricoxib 60 mg v 1 tbl | p.o. | 1.00 | DF | 22.70 | P |
|--------|---------|--------------------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|------|------|----|-------|---|
| 187.12 | M01AH05 | etoricoxib 90 mg v 1 tbl | p.o. | 1.00 | DF | 25.90 | P |
|--------|---------|--------------------------|------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|---|
| 187.13 | M01AX01 | nabumeton | p.o. | 1.00 | GM | 6.50 | P |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|---|

Nabumeton se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 187.14 | M01AX04 | azapropazon | p.o. | 0.75 | GM | 6.50 | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 187.15 | M01AX13 | proquazón | p.o. | 0.90 | GM | 6.50 | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 187.16 | M01AX17 | nimesulid | p.o. | 0.20 | GM | 6.50 | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 188 | nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|------|----|-------|--|
| 188.1 | M01AA | butylpyrazolidiny | parent. | 1.00 | DF | 6.89 | |
| 188.2 | M01AB01 | indometacin | p.rect. | 0.10 | GM | 3.27 | |
| 188.3 | M01AB01 | indometacin | parent. | 0.10 | GM | 12.66 | |
| 188.4 | M01AB03 | tolmetin | p.rect. | 0.70 | GM | 10.56 | |
| 188.5 | M01AB05 | diklofenak | p.rect. | 0.10 | GM | 7.65 | |
| 188.6 | M01AB05 | diklofenak | parent. | 0.10 | GM | 9.90 | |

67548 ALMIRAL inj 100x3ml/75mg MOE CY

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 188.7 | M01AB09 | lonazolak | p.rect. | 0.60 | GM | 10.56 | |
| 188.8 | M01AC01 | piroxikam | p.rect. | 20.00 | MG | 7.65 | |
| 188.9 | M01AC01 | piroxikam | parent. | 20.00 | MG | 11.73 | |
| 188.10 | M01AC02 | tenoxikam | p.rect. | 20.00 | MG | 10.75 | |
| 188.11 | M01AC02 | tenoxikam | parent. | 20.00 | MG | 11.73 | |
| 188.12 | M01AC05 | lornoxikam | parent. | 12.00 | MG | 11.73 | |
| 188.13 | M01AC06 | meloxikam | p.rect. | 15.00 | MG | 13.00 | P |

Meloxikam se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|
| 188.14 | M01AC06 | meloxikam | parent. | 15.00 | MG | 39.00 | P |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|-------|---|

Meloxikam parenterální se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena a to v případě, že nelze použít tabletovou a čípkovou formu.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|
| 188.15 | M01AE01 | ibuprofen | p.rect. | 1.20 | GM | 9.38 | |
| 188.16 | M01AE01 | ibuprofen | parent. | 1.20 | GM | 13.73 | |
| 188.17 | M01AE02 | naproxen | p.rect. | 0.50 | GM | 10.75 | |
| 188.18 | M01AE02 | naproxen | parent. | 0.50 | GM | 13.73 | |
| 188.19 | M01AE03 | ketoprofen | p.rect. | 0.15 | GM | 8.37 | |
| 188.20 | M01AE03 | ketoprofen | parent. | 0.15 | GM | 15.45 | |

76657 KETONAL inj 10x2ml/100mg LEK SLO

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 188.21 | M01AE11 | kyselina tiaprofenová | p.rect. | 0.60 | GM | 10.75 | |
| 188.22 | M01AG | etofenamat | parent. | 1.00 | GM | 13.73 | |
| 188.23 | M01AH04 | parecoxib do 3 amp v 1 bal. včetně | parent. | 80.00 | MG | 334.00 | P |

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------|---------|-------|----|--------|-----|
| 188.24 | M01AH04 | parecoxib nad 3 amp v 1 bal. | parent. | 80.00 | MG | 334.00 | O/P |
|--------|---------|------------------------------|---------|-------|----|--------|-----|

Léčiva skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- a) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- b) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- c) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artrida dospělých ve všech stadiích onemocnění,
- b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé irritace,
- c) primární dysmenorea.

Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a neúplně kompenzovanou hypertenzí. Jejich podávání je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku.

Parecoxib je hrazen pro léčbu pooperační bolesti u pacientů s nesnášenlivostí opioidních analgetik nebo u pacientů s vředovou chorobou nebo krvácením do GIT v anamnéze.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|
| 188.25 | M01AX17 | nimesulid | p.rect. | 0.20 | GM | 13.00 | P |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|-------|---|

Nimesulid k p.rect. aplikaci je indikován k léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 189 | specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|------|-------|
| 189.1 | M01CB01 | aurothiomalát sodný | parent. | 2.40 | MG | 6.10 | L/REV |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|------|-------|

02780 TAUREDON 50 injsol10x0.5ml/50mg AKZ D

02781 TAUREDON 20 injsol10x0.5ml/20mg AKZ D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 189.2 | M01CC01 | penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.50 | GM | 27.28 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

66755 METALCAPTASE 150 tbl obd 50x150mg HEL D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 189.3 | M01CC01 | penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.50 | GM | 22.56 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

66753 METALCAPTASE 300 tbl obd 50x300mg HEL D

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|---------|------|----|-------|--|
| 189.4 | N02BA | lysin acetylsalicylát | parent. | 3.00 | GM | 40.37 | |
|-------|-------|-----------------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|---------|------|----|-------|--|
| 189.5 | N02BA | lysin salicylát | parent. | 3.00 | GM | 41.79 | |
|-------|-------|-----------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-------|--|
| 189.6 | N02BA04 | salicylát sodný | parent. | 3.00 | GM | 38.58 | |
|-------|---------|-----------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 190 | lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 190.1 | M02AA | ketofenylbutazon do 50 g masti včetně lok. v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 190.2 | M02AA | kombinace ibuprofenu a heparinoidu do lok. 50 g včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 190.3 | M02AA | protizánětlivé přípr., nesteroidní lok. k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 190.4 | M02AA05 | benzydamin | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 190.5 | M02AA06 | etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 190.6 | M02AA06 | etofenamát nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|--------|----|------|--|
| 190.7 | M02AA07 | piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.8 | M02AA07 | piroxikam nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.9 | M02AA10 | ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.10 | M02AA10 | ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.11 | M02AA10 | ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu) | lok. | 150.00 | MG | 5.50 | |
| 190.12 | M02AA13 | ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.13 | M02AA13 | ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.14 | M02AA15 | diklofenak (transdermální lékové formy) | transd. | 2.00 | DF | 5.08 | |
| 190.15 | M02AA15 | diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.16 | M02AA15 | diklofenak nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |

16580 DOLMINA GEL drm gel 1x100gm ZEH CZ
 67550 ALMIRAL GEL gel 1x250gm MOE CY

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 190.17 | M02AA17 | kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.18 | M02AA21 | tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.19 | M02AA21 | tolectin nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.20 | M02AA23 | indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.21 | M02AA23 | indomethacin nad 50 g masti v jednom balení | lok. | 1.00 | GM | 0.70 | |
| 190.22 | M02AA23 | indomethacin spray | lok. | 1.00 | ML | 0.85 | |
| 190.23 | M02AC | přípravky s deriváty kyseliny salicylové | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.24 | M02AX | jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ. | lok. | 1.00 | GM | 0.85 | |
| 190.25 | M02AX10 | různé | lok. | 1.00 | GM | 0.21 | |

83872 UNGUENTUM CAMPHOR.VASEL.10% MVM drm ung 1x1000gm MVM CZ

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------|-------|----|-------|---|
| 191 | svalová relaxancia | | | | | | |
| 191.1 | M03AA01 | alkuronium | parent. | 20.00 | MG | 70.43 | H |
| 191.2 | M03AA02 | tubokurarin | parent. | 30.00 | MG | 55.82 | H |
| 191.3 | M03AB | decamethonium | parent. | 10.00 | MG | 23.76 | H |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|--------|----|--------|---|
| 191.4 | M03AB01 | suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | MG | 63.84 | H |
| 191.5 | M03AB01 | suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | MG | 40.52 | H |
| 191.6 | M03AC02 | gallamin | parent. | 100.00 | MG | 43.11 | H |
| 191.7 | M03AC01 | pankuronium | parent. | 10.00 | MG | 113.59 | H |
| 191.8 | M03AC03 | vekuronium | parent. | 10.00 | MG | 113.59 | H |
| 191.9 | M03AC04 | atrakurium | parent. | 50.00 | MG | 98.58 | H |
| 191.10 | M03AC06 | pipekuronium | parent. | 10.00 | MG | 103.48 | H |
| 191.11 | M03AC09 | rokuroniumbromid | parent. | 50.00 | MG | 200.00 | H |
| 191.12 | M03AC10 | mivacuronium | parent. | 10.00 | MG | 123.20 | H |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------|-----|----|
| 42587 | MIVACRON | inj 5x10ml/20mg | WFD | GB |
| 42588 | MIVACRON | inj 5x10ml/20mg | GAK | I |
| 42589 | MIVACRON | inj 5x5ml/10mg | GAK | I |
| 42590 | MIVACRON | inj 5x5ml/10mg | WFD | GB |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---------|-------|----|--------|---|
| 191.13 | M03AC11 | cisatracurium | parent. | 10.00 | MG | 208.40 | H |
|--------|---------|---------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|--------------|---------------------|-----|----|
| 18771 | NIMBEX FORTE | inj sol1x30ml/150mg | GXM | I |
| 18772 | NIMBEX | inj sol 5x2.5ml/5mg | GXM | I |
| 18773 | NIMBEX | inj sol 5x10ml/20mg | GXM | I |
| 56517 | NIMBEX FORTE | inj sol1x30ml/150mg | GWE | GB |
| 99581 | NIMBEX FORTE | inj sol1x30ml/150mg | GAK | I |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|--------|---|----------|---|
| 191.14 | M03AX01 | botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně) | parent. | 100.00 | U | 8 167.68 | X |
|--------|---------|--|---------|--------|---|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|--------|---|----------|---|
| 191.15 | M03AX01 | botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli) | parent. | 100.00 | U | 2 041.92 | X |
|--------|---------|--|---------|--------|---|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|
| 191.16 | M03CA01 | dantrolen | parent. | 0.10 | GM | 7 008.60 | T |
|--------|---------|-----------|---------|------|----|----------|---|

| | |
|-----|---|
| 192 | antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|------|--|
| 192.1 | M04AA01 | allopurinol | p.o. | 0.40 | GM | 3.28 | |
| 192.2 | M04AB02 | sulfinpyrazon | p.o. | 0.30 | GM | 5.08 | |
| 192.3 | M04AB03 | benzbromaron | p.o. | 0.10 | GM | 1.86 | |
| 192.4 | M04AC01 | kolchicin | p.o. | 1.00 | MG | 5.61 | |

| | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-----|---|
| 62380 | COLCHICUM-DISPERT | tbl obd 50x500rg | SVP | D |
|-------|-------------------|------------------|-----|---|

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 193 | léčiva působící na mineralizaci kostí |
|-----|---------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|
| 193.1 | G03XC01 | raloxifen | p.o. | 60.00 | MG | 29.45 | P |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|

Raloxifen: léčbu předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog u postmenopauzálních žen s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou v 2. volbě při nesnášenlivosti bisfosfonátů. Léčba trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|----------|---|
| 193.2 | M05BA02 | kyselina kladronová | parent. | 1.50 | GM | 2 305.80 | P |
|-------|---------|---------------------|---------|------|----|----------|---|

94548 BONEFOS inf cnc 5x5ml/300mg SOT SF

| | | | | | | |
|-------|---------|---|------|----|--------|---|
| 193.3 | M05BA02 | kyselina kladronová do 400 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 1.60 | GM | 197.94 | P |
|-------|---------|---|------|----|--------|---|

94460 BONEFOS 400 MG cps 100x400mg SOT SF

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|----|--------|---|
| 193.4 | M05BA02 | kyselina kladronová nad 400 mg do 520 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 1.60 | GM | 304.54 | P |
|-------|---------|--|------|----|--------|---|

| | | | | | | |
|-------|---------|--|------|----|--------|---|
| 193.5 | M05BA02 | kyselina kladronová nad 520 mg do 800 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 1.60 | GM | 197.94 | P |
|-------|---------|--|------|----|--------|---|

Léčbu kyselinou kladronovou předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:
 a) destrukcí kostí a hyperkalcémii provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,
 b) mnohočetným myelomem.

56638 BONEFOS 800 MG tbl obd 60x800mg SOT SF

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|-------|----|----------|---|
| 193.6 | M05BA03 | kyselina pamidronová | parent. | 60.00 | MG | 3 758.01 | P |
|-------|---------|----------------------|---------|-------|----|----------|---|

Léčbu kyselinou pamidronovou předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog u pacientů s:
 a) destrukcí kostí a hyperkalcémii provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich,
 b) mnohočetným myelomem,
 c) manifestní Pagetovou chorobou.

| | | | | | | |
|-------|---------|---|-------|----|-------|---|
| 193.7 | M05BA04 | kyselina alendronová s obsahem do 10 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 10.00 | MG | 18.00 | P |
|-------|---------|---|-------|----|-------|---|

32656 LINDRON por tbl nob 28x10mg KRK SLO

| | | | | | | |
|-------|---------|--|-------|----|-------|---|
| 193.8 | M05BA04 | kyselina alendronová s obsahem nad 10 mg v jedné tabletě | 10.00 | MG | 21.00 | P |
|-------|---------|--|-------|----|-------|---|

Léčbu kyselinou alendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:
 a) pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,
 b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)
 Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|---------|------|----|----------|---|
| 193.9 | M05BA06 | kyselina ibandronová | parent. | 2.00 | MG | 2 717.00 | P |
|-------|---------|----------------------|---------|------|----|----------|---|

Léčbu kyselinou ibandronovou parent. a v p.o. tabletě o síle 50 mg, předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:
 a) destrukcí kostí a hyperkalcémii provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,
 b) mnohočetným myelomem.

26244 BONDRONAT 6 MG/6 ML inf cnc sol 1x6ml RRG GB

| | | | | | | |
|--------|---------|--|---|----|-------|---|
| 193.10 | M05BA06 | kyselina ibandronová s obsahem do 2,5 mg v jedné tabletě včetně p.o. | 1 | DF | 18.00 | P |
|--------|---------|--|---|----|-------|---|

Léčbu kyselinou ibandronovou p.o. předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:
 a) pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,
 b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT).
 Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|---|----|--------|---|
| 193.11 | M05BA06 | kyselina ibandronová s obsahem 50 mg v jedné tabletě | p.o. | 1 | DF | 197.94 | P |
|--------|---------|--|------|---|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|---|----|--------|---|
| 193.12 | M05BA06 | kyselina ibandronová s obsahem 150 mg v jedné tabletě | p.o. | 1 | DF | 630.00 | P |
|--------|---------|---|------|---|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--|------|----|-------|---|
| 193.13 | M05BA07 | kyselina risedronová do 5 mg v 1 tabletě p.o. včetně | | 5.00 | MG | 18.00 | P |
|--------|---------|---|--|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|------|----|-------|---|
| 193.14 | M05BA07 | kyselina risedronová nad 5 mg v 1 tabletě p.o. | | 5.00 | MG | 21.00 | P |
|--------|---------|--|--|------|----|-------|---|

Léčbu kyselinou risedronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:

a) pacient s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,

b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT).

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--|------|----|----------|---|
| 193.15 | M05BA08 | kyselina zoledronová do 4 mg v 1 amp. parent. | | 4.00 | MG | 8 150.00 | P |
|--------|---------|---|--|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|------|----|----------|---|
| 193.16 | M05BA08 | kyselina zoledronová nad 4 mg v 1 amp. parent. | | 4.00 | MG | 11114.30 | P |
|--------|---------|--|--|------|----|----------|---|

Léčba kyselinou zoledronovou je předepisována onkologem, hematologem, urologem a pneumologem u pacientů:

a) v 1.linií léčby osteoblastických a smíšených kostních metastáz solidních tumorů a ve 2.linií léčby osteolytických lesí mnohočetného myelomu,

b) s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním nereagujícím dostatečně na předchozí aplikaci jiných bisfosfonátů.

Léčba kyselinou zoledronovou je předepisována internistou, ortopedem, revmatologem nebo endokrinologem u pacientů s Pagetovou chorobou.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|------|------|----|-------|---|
| 193.17 | M05BX03 | stroncium-ranelát | p.o. | 2.00 | GM | 40.85 | P |
|--------|---------|-------------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu stroncium-ranelátem předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog a gynekolog u pacientek:

a) s komplikovanou osteoporosou, definovanou jako T-skore -2,5 na standardních měřených místech (bederní páteř, proximální femur, event. předloktí) metodou dvoufotonové kostní densitometrie a pokud má pacientka osteoporotickou frakturu,

b) u kterých jsou kontraindikované bisfosfonáty nebo raloxifen,

c) nesnášejících jiná antiresorpční léčiva nebo při projevech závažných nežádoucích účinků na této léčbě.

Léčba delší než 2 roky je indikována pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní density.

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|-------|----|-------|---|
| 193.18 | M05B | Kys. alendronová v kombinaci s vitamínem D3 (na kys. alendronovou) | p.o. | 10.00 | MG | 23.00 | P |
|--------|------|--|------|-------|----|-------|---|

Léčbu kyselinou alendronovou v kombinaci s vitamínem D3 předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u:

a) pacient s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,

b) žen s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 194 | ostatní léčiva používaná u nemoci muskuloskeletálního systému | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|------|------|----|-------|------------|
| 194.1 | M01AX05 | glukosamin sulfat | p.o. | 1.00 | DF | 11.43 | L/REV, ORT |
|-------|---------|-------------------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|-------|------------|
| 194.2 | M01AX21 | diacerein | p.o. | 100.00 | MG | 15.24 | L/REV, ORT |
|-------|---------|-----------|------|--------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|-------|------------|
| 194.3 | M01AX25 | chondroitin sulfat | p.o. | 1.60 | GM | 14.66 | L/REV, ORT |
|-------|---------|--------------------|------|------|----|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 194.4 | M03BA52 | carisoprodol a paracetamol v kombinaci | p.o. | 3.00 | DF | 2.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|
| 194.5 | M03BX01 | baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 50.00 | MG | 9.97 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 194.6 | M03BX01 | baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 6.31 | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|
| 194.7 | M03BX02 | tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 12.00 | MG | 21.50 | L/NEU,ORT,REV |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|
| 194.8 | M03BX02 | tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě) | p.o. | 12.00 | MG | 15.84 | L/NEU,ORT,REV |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|
| 194.9 | M03BX04 | tolperison | p.o. | 200.00 | MG | 4.38 | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|--------|----|-------|---|
| 194.10 | M03BX04 | tolperison | parent. | 200.00 | MG | 9.58 | |
| 194.11 | M03BX05 | thiocolchicosid | p.o. | 12.00 | MG | 9.97 | |
| 194.12 | M03BX05 | thiocolchicosid | parent. | 12.00 | MG | 39.10 | |
| 194.13 | M03BX07 | tetrazepam | p.o. | 0.10 | GM | 9.97 | |
| 194.14 | M09AB52 | multienzymy (obsahující pankreatin, trypsin, chymotrypsin, bromelain, papain, amylasu, lipasu, rutosid) | p.o. | 6.00 | DF | 8.80 | P |

Léčbu multienzymovými přípravky předepisuje onkolog, chirurg, internista nebo dermatolog u lymfedémů v souvislosti s radikální operací nebo s radioterapií pro malignitu, za podmínky, že ke kontrole lymfedemu nedostačuje fyzikální léčba, nebo tuto nelze aplikovat.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 194.15 | N02BB02 | metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně) | parent. | 3.00 | GM | 44.53 | O |
| 194.16 | N02BB02 | metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli) | parent. | 3.00 | GM | 18.48 | O |
| 194.17 | N02BB73 | aminophenazon v kombinaci psycholeptiky | parent. | 1.00 | DF | 8.10 | O |
| 194.18 | N02BE01 | paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně) | p.rect. | 3.00 | GM | 74.01 | |

86009 BEN-U-RON 125MG sup 5x125mg BNC D

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---|---------------|------|----|--------|---|
| 194.19 | N02BE01 | paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku) | p.rect. | 3.00 | GM | 24.81 | |
| 86014 | BEN-U-RON 500MG | | sup 10x500mg | BNC | D | | |
| 86015 | BEN-U-RON 1000MG | | sup 10x1000mg | BNC | D | | |
| 194.20 | N02BE01 | paracetamol | parent. | 3.00 | GM | 44.53 | H |
| 194.21 | N02BE05 | propacetamol | parent. | 1.00 | GM | 41.84 | O |
| 194.22 | M09AX01 | kyselina hyaluronová | parent. | 3.60 | MG | 195.52 | P |

Léčbu kyselinou hyaluronovou předepisuje ortoped nebo revmatolog:
součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|---------|--------|----|-------|---|
| 195 | lokální anestetika ze skupiny esterů | | | | | | |
| 195.1 | N01AA01 | ether pro anestézii (diethylether) | inhal. | 100.00 | GM | 15.45 | H |
| 195.2 | N01BA | estery aminobenzoové kyseliny | parent. | 100.00 | ML | 19.55 | O |
| 195.3 | N01BA02 | prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | ML | 1.37 | O |
| 195.4 | N01BA02 | prokain (nad 10 ml v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | ML | 0.49 | O |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----|----|
| 69670 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD | inj 1x250ml/500mg | ARD | CZ |
| 69671 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD | inj 1x500ml/1gm | ARD | CZ |
| 69673 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD | inj 1x250ml/1.25gm | ARD | CZ |
| 69674 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD | inj 1x500ml/2.5gm | ARD | CZ |
| 69676 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. | inj 1x250ml | ARD | CZ |
| 69677 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. | inj 1x500ml/5gm | ARD | CZ |
| 89212 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD | inj 1x200ml | ARD | CZ |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------|-----|----|
| 89214 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD | inj 1x200ml | ARD | CZ |
| 89216 | INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. | inj 1x200ml | ARD | CZ |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 196 | lokální anestetika ze skupiny amidů |
|-----|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------|------|----|------|---|
| 196.1 | N01BB | trimekain | lok. | 1.00 | GM | 1.18 | O |
|-------|-------|-----------|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 196.2 | N01BB | trimekain (koncentrace 0,5%) | parent. | 1.00 | ML | 0.73 | O |
|-------|-------|------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|------------------|-----|----|
| 69705 | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD | inj 1x250ml 0.5% | ARD | CZ |
| 69706 | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD | inj 1x500ml 0.5% | ARD | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|------|---|
| 196.3 | N01BB | trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | ML | 1.43 | O |
|-------|-------|--|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|------|---|
| 196.4 | N01BB | trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli) | parent. | 1.00 | ML | 0.40 | O |
|-------|-------|--|---------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|----|
| 69708 | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. | inj 1x250ml 1% | ARD | CZ |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|----|
| 69709 | INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. | inj 1x500ml 1% | ARD | CZ |
|-------|--------------------------------|----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|---------|------|----|------|---|
| 196.5 | N01BB | trimekain (koncentrace 2%) | parent. | 1.00 | ML | 1.22 | O |
|-------|-------|----------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------|---------|------|----|------|---|
| 196.6 | N01BB | trimekain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 2.35 | O |
|-------|-------|---------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|
| 196.7 | N01BB01 | bupivakain | parent. | 1.00 | ML | 3.52 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|----------------|-----|---|
| 06623 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25% | inj sol 1x50ml | SLH | D |
|-------|---------------------------------|----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|---|
| 06624 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25% | inj sol 10x50ml | SLH | D |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|---|
| 06625 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25% | inj sol 50x50ml | SLH | D |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----|---|
| 06634 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5% | inj sol 10x50ml | SLH | D |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----|---|
| 06635 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5% | inj sol 50x50ml | SLH | D |
|-------|--------------------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 196.8 | N01BB01 | bupivakain (lékové formy spinal) | parent. | 1.00 | ML | 31.75 | O |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|---|
| 196.9 | N01BB02 | lidokain | parent. | 1.00 | ML | 1.22 | O |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|------|------|----|------|---|
| 196.10 | N01BB02 | lidokain (obsah 11 ml) | lok. | 1.00 | ML | 3.90 | P |
|--------|---------|------------------------|------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------|------|----|------|---|
| 196.11 | N01BB02 | lidokain (obsah 6 ml) | lok. | 1.00 | ML | 5.60 | P |
|--------|---------|-----------------------|------|------|----|------|---|

Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|------|---|
| 196.12 | N01BB03 | mepivakain | parent. | 1.00 | ML | 3.52 | O |
|--------|---------|------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|------|----|------|---|
| 196.13 | N01BB08 | artikain | parent. | 1.00 | ML | 4.15 | O |
|--------|---------|----------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 196.14 | N01BB08 | artikain (lékové formy hyperbar) | parent. | 1.00 | ML | 9.86 | O |
|--------|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|------|----|-------|---|
| 196.15 | N01BB09 | levobupivacain | parent. | 1.00 | ML | 11.60 | O |
|--------|---------|----------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|
| 17962 | NAROPIN 2 MG/ML | infsol5x100ml/200mg | AZC | D |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|
| 46610 | NAROPIN 2 MG/ML | infsol5x100ml/200mg | AZC | S |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|-----------------|--------------------|-----|---|
| 56038 | NAROPIN 2 MG/ML | inj sol5x10ml/20mg | AZC | S |
|-------|-----------------|--------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 196.16 | N01BB10 | ropivacain | parent. | 1.00 | ML | 11.60 | O |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|----------------------|-----------------|-----|---|
| 03755 | CHIROCAINE 2.5 MG/ML | inj sol 10x10ml | ABB | I |
|-------|----------------------|-----------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------|---------|------|----|------|---|
| 196.17 | N01BB51 | bupivakain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 3.81 | O |
|--------|---------|----------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 197 | lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vazokonstriční látkou | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|------|---|
| 197.1 | N01BB52 | lidokain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 2.35 | O |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|------|---|
| 197.2 | N01BB58 | artikain/adrenalin | parent. | 1.00 | ML | 4.44 | O |
|-------|---------|--------------------|---------|------|----|------|---|

93109 SUPRACAIN 4% inj 10x2ml ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|--------|----|-------|---|
| 197.3 | N01BX01 | ethylchlorid | lok. | 100.00 | ML | 93.36 | O |
|-------|---------|--------------|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 198 | analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.1 | N02AA01 | morfín (100 a více mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 43.88 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

80408 VENDAL RETARD 100MG tbl obd 30x100mg LAR A

94312 MST CONTINUS 100MG tbl ret 60x100mg NPP GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.2 | N02AA01 | morfín (do 10 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 73.73 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.3 | N02AA01 | morfín (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 49.44 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

80406 VENDAL RETARD 30MG tbl obd 30x30mg LAR A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.4 | N02AA01 | morfín (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.10 | GM | 47.15 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

80407 VENDAL RETARD 60MG tbl obd 30x60mg LAR A

94311 MST CONTINUS 60MG tbl ret 60x60mg NPP GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.5 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce) | p.o. | 0.10 | GM | 53.90 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.6 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 61.60 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.7 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně) | p.o. | 0.10 | GM | 58.36 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.8 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení) | p.o. | 0.10 | GM | 39.10 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 198.9 | N02AA01 | morfín (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení) | p.o. | 0.10 | GM | 17.60 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 198.10 | N02AA03 | hydromorfon do 4 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 20.00 | MG | 98.60 | |
|--------|---------|------------------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 198.11 | N02AA03 | hydromorfon nad 4 mg do 8 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 20.00 | MG | 93.34 | |
|--------|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 198.12 | N02AA03 | hydromorfon nad 8 mg do 24 mg v 1 tbl včetně | p.o. | 20.00 | MG | 88.50 | |
|--------|---------|--|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 198.13 | N02AB02 | pethidin | p.o. | 0.40 | GM | 41.30 | |
|--------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 199 | analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|-------|----|--------|--|
| 199.1 | N02AA05 | oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně p.o. | | 75.00 | MG | 125.10 | |
|-------|---------|---|--|-------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|-------|----|--------|--|
| 199.2 | N02AA05 | oxycodon více než 20 mg do 40 mg p.o. v jedné tabletě včetně | | 75.00 | MG | 118.47 | |
|-------|---------|---|--|-------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|-------|----|--------|--|
| 199.3 | N02AA05 | oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě p.o. | | 75.00 | MG | 109.58 | |
|-------|---------|--|--|-------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|
| 199.4 | N02AA08 | dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě p.o. včetně) | | 0.15 | GM | 27.84 | |
|-------|---------|---|--|------|----|-------|--|

10123 DHC CONTINUS 60 MG portblret60x60mg b NPP GB

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|--|
| 199.5 | N02AA08 | dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě) p.o. | | 0.15 | GM | 23.95 | |
|-------|---------|--|--|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|-------|--|
| 199.6 | N02AC05 | benzitramid | p.o. | 10.00 | MG | 12.71 | |
|-------|---------|-------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 199.7 | N02AD01 | pentazocin | p.o. | 0.20 | GM | 22.39 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|--|
| 199.8 | N02AX01 | tilidin | p.o. | 0.20 | GM | 19.78 | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 199.9 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované) | p.o. | 0.30 | GM | 14.90 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 199.10 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 24.44 | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 199.11 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované) | p.o. | 0.30 | GM | 23.52 | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 199.12 | N02AX52 | tramadol hydrochlorid v kombinaci s paracetamolem | p.o. | 1.00 | DF | 5.00 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 200 | analgetika – anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 200.1 | N01AH01 | fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně) | parent. | 1.00 | MG | 137.80 | O |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

30101 FENTANYL TORREX 50MCG/ML inj 5x2ml/100rg TRX A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 200.2 | N01AH01 | fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli) | parent. | 1.00 | MG | 101.48 | O |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|------|----|--------|---|

30102 FENTANYL TORREX 50MCG/ML inj 5x10ml/500rg TRX A

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 200.3 | N01AH02 | alfentanyl | parent. | 1.50 | MG | 46.89 | H |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

87721 RAPIFEN inj sol 5x2ml/1mg JAN B

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|----------|---|
| 200.4 | N01AH03 | sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně) | parent. | 0.60 | MG | 1 342.74 | H |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|------|----|----------|---|

93701 SUFENTA inj 5x2ml/10rg JAN B

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 200.5 | N01AH03 | sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně) | parent. | 0.60 | MG | 644.02 | H |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

21043 SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML inj sol10x10ml/50rg TRX A

21044 SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML inj sol20x10ml/50rg TRX A

30779 SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML inj sol 5x10ml/50rg TRX A

85526 SUFENTA FORTE

inj 5x1ml/50rg

JAN B

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|---------|------|----|--------|---|
| 200.6 | N01AH03 | sufentanyl (nad 50 rg v ampuli) | parent. | 0.60 | MG | 718.96 | H |
|-------|---------|---------------------------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----|---|
| 21088 | SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML | inj sol 5x5ml/250rg | TRX | A |
| 21089 | SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML | inj sol 10x5ml/250rg | TRX | A |
| 21090 | SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML | inj sol 20x5ml/250rg | TRX | A |
| 21091 | SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML | inj sol 10x20ml/1mg | TRX | A |
| 21092 | SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML | inj sol 20x20ml/1mg | TRX | A |
| 30783 | SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML | inj sol 5x20ml/1mg | TRX | A |
| 93702 | SUFENTA FORTE | inj 5x5ml/250rg | JAN | B |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|---|
| 200.7 | N01AH06 | remifentanyl | parent. | 1.00 | MG | 251.19 | H |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|-------------|-------------------|-----|----|
| 17712 | ULTIVA 2 MG | inj plv sol 5x2mg | GXM | I |
| 17713 | ULTIVA 5 MG | inj plv sol 5x5mg | GXM | I |
| 86162 | ULTIVA 2 MG | inj plv sol 5x2mg | GWB | GB |
| 86163 | ULTIVA 5 MG | inj plv sol 5x5mg | GWB | GB |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 200.8 | N01AH51 | fentanyl v kombinacích | parent. | 4.00 | ML | 38.22 | H |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|---|
| 200.9 | N02AA01 | morfín (do 10 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 30.00 | MG | 15.45 | O |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|---------|-------|----|------|---|
| 200.10 | N02AA01 | morfín (nad 10 mg v jedné ampuli) | parent. | 30.00 | MG | 9.33 | O |
|--------|---------|-----------------------------------|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 200.11 | N02AB02 | pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.40 | GM | 55.68 | O |
|--------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 200.12 | N02AB02 | pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.40 | GM | 34.44 | O |
|--------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 200.13 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 692.35 | P |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 200.14 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 207.03 | P |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

17315 FENTAHEXAL 25 drm emp tdr 3x2.5mg HHO D

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 200.15 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 393.39 | P |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

17303 FENTAHEXAL 50 drm emp tdr 3x5mg HHO D

17304 FENTAHEXAL 50 drm emp tdr 5x5mg HHO D

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 200.16 | N02AB03 | fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 596.13 | P |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

Fentanyl s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---|
| 200.17 | N02AC03 | piritramid | parent. | 300.00 | MG | 94.43 | O |
|--------|---------|------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|
| 200.18 | N02AD01 | pentazocin | parent. | 0.20 | GM | 87.35 | O |
|--------|---------|------------|---------|------|----|-------|---|

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|----------|------|----|-------|--|
| 200.19 | N02AE01 | buprenorfin | subling. | 1.20 | MG | 80.00 | |
|--------|---------|-------------|----------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 200.20 | N02AE01 | buprenorfin | parent. | 1.20 | MG | 200.40 | O |
|--------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 200.21 | N02AE01 | buprenorfin (s řízeným uvolňováním 35 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 232.85 | P |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 200.22 | N02AE01 | buprenorfín (s řízeným uvolňováním 50,5 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 339.19 | P |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 200.23 | N02AE01 | buprenorfín (s řízeným uvolňováním 70 mikrogramu za hodinu) | transd. | 1.00 | DF | 440.04 | P |
|--------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

Buprenorfín s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 200.24 | N02AF01 | butorfanol | parent. | 12.00 | MG | 83.10 | O |
|--------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|-------|----|-------|---|
| 200.25 | N02AF02 | nalbufin | parent. | 80.00 | MG | 69.21 | O |
|--------|---------|----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|
| 200.26 | N02AX01 | tilidin | parent. | 0.20 | GM | 16.37 | O |
|--------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|---------|------|----|-------|--|
| 200.27 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid | p.rect. | 0.30 | GM | 41.60 | |
|--------|---------|-----------------------|---------|------|----|-------|--|

12822 TRAMADOL LANNACHER 100 MG sup 5x100mg LAR A
 32084 TRALGIT SUPP. rct sup 10x100mg ZEH SK

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 200.28 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.30 | GM | 82.30 | O |
|--------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

12477 TRAMABENE 50 INJEKCE inj 5x1ml/50mg MCK D
 32090 TRALGIT 50 INJ inj sol 5x1ml/50mg ZEH SK
 32091 TRALGIT 50 INJ inj sol 10x1ml/50mg ZEH SK
 92363 TRAMADOL LANNACHER 50 MG/1ML inj 5x1ml/50mg LAR A

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|-------|---|
| 200.29 | N02AX02 | tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.30 | GM | 43.00 | O |
|--------|---------|--|---------|------|----|-------|---|

12478 TRAMABENE 100 INJEKCE inj 5x2ml/100mg MCK D
 32087 TRALGIT 100 INJ inj sol 5x2ml/100mg ZEH SK
 32088 TRALGIT 100 INJ inj sol 10x2ml/100mg ZEH SK
 92364 TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML inj 5x2ml/100mg LAR A

201 analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 201.1 | N02BA | lysín acetyl salicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | GM | 8.65 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|
| 201.2 | N02BA | lysín acetyl salicylát (nad 100 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | GM | 6.45 | |
|-------|-------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|
| 201.3 | N02BA01 | kyselina acetyl salicylová | p.o. | 3.00 | GM | 6.30 | |
|-------|---------|----------------------------|------|------|----|------|--|

00011 ACYLPYRIN tbl 10x500mg SLO SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|
| 201.4 | N02BA02 | aloxiprin | p.o. | 3.00 | GM | 6.45 | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|------|--|
| 201.5 | N02BA03 | cholin salicylát | p.o. | 3.00 | GM | 8.65 | |
|-------|---------|------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|
| 201.6 | N02BA11 | diflunisal | p.o. | 0.75 | GM | 5.72 | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|--|

202 ostatní analgetika – antipyretika, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 202.1 | N02BE01 | paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 3.00 | GM | 8.67 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

202.2 N02BE01 paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě) p.o. 3.00 GM 4.94

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------------|-----|-----|
| 03837 | PARALEN 500 | tbl 10x500mg | ZEH | CZ |
| 15385 | APO-ACETAMINOPHEN 500 MG | tbl 100x500mg | CMG | IRL |
| 83608 | APO-ACETAMINOPHEN 500MG | tbl 100x500mg | APT | CND |

202.3 N02BE01 paracetamol (tekuté lékové formy) p.o. 3.00 GM 8.65

203 antimigrenika

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 203.1 | N02CA01 | dihydroergotamin | p.o. | 4.00 | MG | 1.23 | |
| 203.2 | N02CA01 | dihydroergotamin | parent. | 4.00 | MG | 111.52 | |
| 203.3 | N02CA01 | dihydroergotamin nosní spray | inhal. | 1.00 | MG | 50.00 | |
| 203.4 | N02CA07 | lisurid | p.o. | 75.00 | RG | 0.73 | |
| 203.5 | N02CA52 | ergotamin, kombinace | p.o. | 4.00 | DF | 9.38 | |
| 203.6 | N02CC01 | sumatriptan | parent. | 1.00 | DF | 899.35 | X |
| 203.7 | N02CC01 | sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 94.50 | |
| 203.8 | N02CC01 | sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 50.00 | MG | 70.87 | |
| 203.9 | N02CC01 | sumatriptan (nosní sprej) | inhal. | 1.00 | DF | 292.50 | P |

Léčbu inhalačním sumatriptanem a zolmitriptanem předepisuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

79382 IMIGRAN 10 MG nas spr sol 2x0.1ml GXM
93078 IMIGRAN 10 MG spr nas 2x0.1ml GWE

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|-------|------|--------|-------|--|
| 203.10 | N02CC02 | naratriptan | p.o. | 2.50 | MG | 94.50 | | |
| 203.11 | N02CC03 | zolmitriptan | p.o. | 2.50 | MG | 94.50 | | |
| 203.12 | N02CC03 | zolmitriptan (nosní sprej) | inhal. | 1.00 | DF | 292.50 | P | |
| 203.13 | N02CC04 | rizatriptan | p.o. | 10.00 | MG | 94.50 | | |
| 203.14 | N02CC06 | eletriptan | p.o. | 40.00 | MG | 94.50 | | |
| 203.15 | N02CC07 | frovatriptan | p.o. | 2.5 | MG | 94.50 | | |
| 203.16 | N02CX | lysín acetylsalicylát s metoklopramidem | v kombinaci | p.o. | 1.00 | DF | 21.66 | |
| 203.17 | N02CX | pipethiadén | p.o. | 3.00 | DF | 2.54 | | |
| 203.18 | N02CX01 | pizotifen | p.o. | 1.50 | MG | 5.87 | | |
| 203.19 | N02CX06 | oxetoron | p.o. | 0.12 | GM | 5.87 | | |
| 204 | antiepileptika ze skupiny barbiturátů | | | | | | | |
| 204.1 | N03AA | fenobarbital pseudonorefdr. | p.o. | 0.10 | GM | 2.05 | | |

204.2 N03AA02 fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě p.o. 0.10 GM 6.08

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 204.3 | N03AA02 | fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli) | parent. | 0.10 | GM | 126.25 | O |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

204.4 N03AA02 fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě) p.o. 0.10 GM 2.27

68579 PHENAEMAL 0.1 **tbl 50x100mg** PET P

204.5 N03AA02 fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli) parent. 0.10 GM 13.46 O

84449 LUMINAL ini 5x1ml/200mg PET D

204.6 N03AA03 primidon (pevné lékové formy) p.o. 1.25 GM 11.76

13731 LISKANTIN tbl 100x250mg RET D

204.7 N03AA03 primidon (tekuté lékové formy) p.o. 1.25 GM 45.51

205 antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů

205.1 N03AB02 fenvtoin p.o. 0.30 GM 2.40

62234 EPII AN D GELOT
tbl 100x100mg GER A

205.2 N03AB02 fenytoin parent. 0.30 GM 116.04 O

205.3 N03AB04 mefenytoin p.o. 0.40 GM 2.44

205 4 N03AB52 fenytoin kombinace p.o 3.00 DF 2.40

02625 SANEPILtbl 20 (blistr)ZEH SK

205.5 N03AD01 ethosuximid (pevné lékové formy) p.o. 1,25 GM 16.78

92041 PETINIMID per cps mol 100x250mg GER A

205.6 N03AD01 ethosuximid (tekuté lékové formy) p.o. 1.25 GM 22.69

02035 SUXILEP att 50gm 50% GMD D

11037 SUXLEP gtt 50cm 50% PHW D

205 7 N03AD03 mesuximid p.o. 0.90 GM 24.78

206 antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů

206 1 N03AE01 klonazepam parent 8.00 MG 230.32 O

14989 RIVOTRIU ini 5x1ml/1mg+solv RCE CZ

206.2 N03AE01 klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 p.o.
mg v jedné tabletě včetně)

14957 RIVOTRILO 0.5 MG tbl 50x0.5mg RCE CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 206.3 | N03AE01 | klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 8.00 | MG | 12.71 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 206.4 | N03AE01 | klonazepam (tekuté lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 33.60 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|--|

14000 RIVOTRIL 2.5MG/ML por gtt sol 1x10ml ROX I

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 206.5 | N03AF01 | karbamazepin (pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 12.16 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|

15305 APO-CARBAMAZEPINE tbl 100x200mg CMG IRL

17999 APO-CARBAMAZEPINE tbl 100x200mg KAT NL

62309 APO-CARBAMAZEPINE tbl 100x200mg APT CND

98080 NEUROTOP tbl 50x200mg GER A

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 206.6 | N03AF01 | karbamazepin (retardované pevné lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 16.94 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

16444 TEGRETOL CR 200 tbl ret 50x200mg NAI CZ

16445 TEGRETOL CR 400 tbl ret 30x400mg NAI CZ

92039 TEGRETOL CR 200 tbl ret 50x200mg NPA CH

93619 TEGRETOL CR 400 tbl ret 30x400mg NPA CH

96305 NEUROTOP RETARD 300 tbl ret 50x300mg GER A

96306 NEUROTOP RETARD 600 tbl ret 50x600mg GER A

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 206.7 | N03AF01 | karbamazepin (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.00 | GM | 42.52 | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 206.8 | N03AF02 | oxcarbazepin | p.o. | 1.00 | GM | 11.10 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

207 antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|----------|---|
| 207.1 | N03AG01 | natrium valproát | parent. | 1.50 | GM | 1 150.14 | K |
|-------|---------|------------------|---------|------|----|----------|---|

54238 ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSLÖ. inj sol 5x3ml/300mg DET D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 207.2 | N03AG01 | natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 28.46 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 207.3 | N03AG01 | natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 26.20 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 207.4 | N03AG01 | natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 17.22 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

08768 CONVULEX 150 por cpsdur100x150mg GER A

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 207.5 | N03AG01 | natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 14.95 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 207.6 | N03AG01 | natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 1.50 | GM | 24.33 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 207.7 | N03AG01 | natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.50 | GM | 24.35 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

58787 CONVULEX CR 500 MG tbl ret 50x500mg GER A

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 207.8 | N03AG01 | natrium valproát (tekuté lékové formy) | p.o. | 1.50 | GM | 24.97 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|-------|-----|--------|-----------|
| 08770 | CONVULEX | | gtt 100ml | | GER | A | |
| 207.9 | N03AG02 | valpromid | p.o. | 1.50 | GM | 24.32 | L/PSY,NEU |
| 207.10 | N03AG04 | vigabatrin | p.o. | 2.00 | GM | 116.75 | P |
| 207.11 | N03AG06 | tiagabín | p.o. | 30.00 | MG | 119.70 | P |

Léčbu tiagabinem a vigabatrinem předepisuje neurolog či psychiátr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

- nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),
- vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
- specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | ostatní antiepileptika | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-----------|
| 208.1 | N03AX03 | sultiam | p.o. | 0.40 | GM | 15.87 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------------------|------|-----|--------|---|
| 55852 | OSPOLOT | | tbl obd 50x200mg | | DET | D | |
| 208.2 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 175.75 | P |
| 208.3 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma od 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 124.76 | P |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--|--------------------|------|-----|--------|---|
| 41870 | LAMOTRI HEXAL 100 TAB SUS | | por tblsus30x100mg | | SFS | D | |
| 41886 | LAMOTRI HEXAL 100 TAB SUS | | por tblsus50x100mg | | SFS | D | |
| 208.4 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 500.00 | P |
| 208.5 | N03AX09 | lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 300.00 | P |

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiátr, neurolog pro děti do 15 let , které nemohou být léčeny tabletovou formou.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|
| 208.6 | N03AX09 | lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 50.59 | L/PSY,NEU |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|---------------------|------|-----|-------|-----------|
| 17761 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | | por tbl nob30x50mg | | KPT | E | |
| 18618 | PLEXOX 50 MG | | por tbl nob 30x50mg | | DET | CZ | |
| 19873 | LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MG | | por tbl nob 30x50mg | | AHF | IS | |
| 23775 | EPIRAL 50 | | por tbl nob 30x50mg | | ZEH | CZ | |
| 48952 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | | por tbl nob30x50mg | | SXP | GR | |
| 48971 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | | por tbl nob30x50mg | | SXQ | P | |
| 48990 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG | | por tbl nob30x50mg | | MCK | D | |
| 208.7 | N03AX09 | lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 56.62 | L/PSY,NEU |
| 208.8 | N03AX09 | lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 47.00 | L/PSY,NEU |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--|---------------------|--|-----|----|--|
| 17780 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | | por tblnob30x100mg | | KPT | E | |
| 18623 | PLEXOX 100 MG | | por tblnob 30x100mg | | DET | CZ | |
| 18627 | PLEXOX 100 MG | | portblnob 100x100mg | | DET | CZ | |
| 19197 | EPIMIL 100 MG | | por tbl nob30x100mg | | IXP | CZ | |
| 19888 | LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG | | por tbl nob30x100mg | | AHF | IS | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|-----|----|
| 19898 | LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MG | por tblnob100x100mg | AHF | IS |
| 23776 | EPIRAL 100 | por tbl nob30x100mg | ZEH | CZ |
| 23777 | EPIRAL 100 | por tblnob100x100mg | ZEH | CZ |
| 49209 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | SXP | GR |
| 49228 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | SXQ | P |
| 49247 | LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG | por tblnob30x100mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|-----------|
| 208.9 | N03AX10 | felbamat | p.o. | 2.40 | GM | 274.54 | L/PSY,NEU |
| 208.10 | N03AX11 | topiramat tablety (do 25 mg včetně p.o. v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 140.10 | P |
| 208.11 | N03AX11 | topiramat tablety (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 113.60 | P |
| 208.12 | N03AX11 | topiramat tobolky (do 15 mg včetně p.o. v jedné tobolce) | p.o. | 0.30 | GM | 285.00 | P |
| 208.13 | N03AX11 | topiramat tobolky (nad 15 mg do 25 mg p.o. včetně v jedné tobolce) | p.o. | 0.30 | GM | 175.75 | P |

Topiramat - léková forma tobolky: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 208.14 | N03AX11 | topiramat tablety (nad 25 mg do 50 mg p.o. včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 125.20 | P |
|--------|---------|---|------|------|----|--------|---|

Léčbu topiramatem předepisuje neurolog či psychiatrist pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),
2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Léčbu topiramatem předepisuje neurolog k profylaktické léčbě těžké migrény (více než 3 záchvaty za měsíc), nebo komplikované migrény u pacientů, kde nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (redukce počtu a intenzity záchvatů o 50%) nebo, kde pacienti netolerovali léky první volby (betablokátory, blokátory kalciových kanálů, valproát, amitriptylin).

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|------|--------|----|--------|-----------|
| 208.15 | N03AX12 | gabapentin | p.o. | 1.80 | GM | 88.00 | L/PSY,NEU |
| 208.16 | N03AX16 | pregabalin | p.o. | 300.00 | MG | 119.70 | P |
| 208.17 | N03AX14 | levetiracetam | p.o. | 2.00 | GM | 126.00 | P |

Léčbu levetiracetamem a pregabalinem předepisuje neurolog či psychiatrist pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),
2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,
3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Léčba pregabalinem je také indikována v léčbě neuropatické bolesti u pacientů, u kterých nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (tj. nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) po nejméně 4 týdny trvající léčbě látkami první volby (amitriptylin, karbamazepin, gabapentin). Kontrola účinnosti léčby pregabalinem je provedena nejpozději po 4 týdnech; pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 209 | Anticholinergní antiparkinsonika | | | | | | |
| 209.1 | N04AA | hydrochlorid diethazinia | p.o. | 0.25 | GM | 7.15 | |
| 209.2 | N04AA02 | biperiden | p.o. | 10.00 | MG | 12.22 | |
| 209.3 | N04AA02 | biperiden | parent. | 10.00 | MG | 56.89 | O |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|-------|----|--------|---------------|
| 209.4 | N04AA03 | metixen | p.o. | 40.00 | MG | 18.09 | |
| 209.5 | N04AA04 | procyclidin | p.o. | 25.00 | MG | 8.80 | |
| 03481 | KEMADRIN | | por tbl nob 100x5mg | GWE | D | | |
| 03483 | KEMADRIN | | por tbl nob 100x5mg | WFD | GB | | |
| 209.6 | N04AA08 | dexetimid | parent. | 0.12 | MG | 1.71 | O |
| 209.7 | N04AC01 | benztropin | p.o. | 2.00 | MG | 3.12 | |
| 210 | dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů | | | | | | |
| 210.1 | N04BA01 | levodopa | p.o. | 3.50 | GM | 24.64 | |
| 210.2 | N04BA02 | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 32.75 | |
| 14955 | MADOPAR HBS | | por cps dur30x125mg | RCE | CZ | | |
| 210.3 | N04BA02 | levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 26.69 | |
| 210.4 | N04BA02 | levodopa/benserazid | p.o. | 0.60 | GM | 22.00 | |
| 15050 | MADOPAR 250 | | por tbl nob 100x250mg | RCE | CZ | | |
| 210.5 | N04BA02 | levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 29.62 | |
| 210.6 | N04BA02 | levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 0.60 | GM | 19.31 | |
| 45244 | ISICOM 250 MG | | tbl 100x275mg | DET | D | | |
| 210.7 | N04BA03 | levodopa/karbidopa a entacapon (do 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 35.17 | X |
| 210.8 | N04BA03 | levodopa/karbidopa a entacapon (nad 125 mg v 1 tabletě) | p.o. | 1.00 | DF | 37.85 | X |
| 211 | antiparkinsonika z ostatních skupin | | | | | | |
| 211.1 | N04BB01 | amantadin | parent. | 0.20 | GM | 4.25 | H |
| 211.2 | N04BB01 | amantadin hydrochlorid | p.o. | 0.20 | GM | 5.52 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.3 | N04BB01 | amantadin sulfát | p.o. | 0.20 | GM | 7.33 | L/NEU,PSY,GER |
| 211.4 | N04BC03 | dihydroergokriptin | p.o. | 10.00 | MG | 15.30 | X |
| 211.5 | N04BC04 | ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 6.00 | MG | 69.18 | X |
| 211.6 | N04BC04 | ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě | p.o. | 6.00 | MG | 63.17 | X |
| 211.7 | N04BC05 | pramipexol | p.o. | 2.50 | MG | 105.25 | X |
| 211.8 | N04BD01 | selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně | p.o. | 5.00 | MG | 5.49 | L/NEU,PSY,GER |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|--|---------------------|-----|-----|
| 03073 | APO-SELEG | | por tbl nob 100x5mg | APT | CND |
| 03074 | APO-SELEG | | por tbl nob 50x5mg | APT | CND |
| 13017 | NIAR | | por tbl nob 30x5mg | AAW | D |
| 15307 | APO-SELEG | | por tbl nob 100x5mg | CMG | IRL |
| 15308 | APO-SELEG | | por tbl nob 50x5mg | CMG | IRL |
| 17408 | APO-SELEG | | por tbl nob 100x5mg | KAT | NL |
| 17409 | APO-SELEG | | por tbl nob 50x5mg | KAT | NL |
| 59279 | SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG | | por tbl nob 50x5mg | MCK | D |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|---------------|
| 211.9 | N04BD01 | selegilin nad 5 mg v 1 tabletě | p.o. | 5.00 | MG | 5.10 | L/NEU,PSY,GER |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|------|------|----|--------|---|
| 211.10 | N04BX01 | tolkapon | p.o. | 0.45 | GM | 175.08 | X |
|--------|---------|----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 211.11 | N04BX02 | entacapon | p.o. | 1.00 | GM | 145.00 | X |
|--------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 | antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--|------|----|--------|---|
| 212.1 | N04BC02 | pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně p.o. v jedné tabletě) | | 3.00 | MG | 159.40 | X |
|-------|---------|---|--|------|----|--------|---|

| | | | | | |
|-------|----------------|--|------------------------|-----|----|
| 13531 | HIZEST 0.05 MG | | por tbl nob 30x0.05mg | IXP | CZ |
| 13532 | HIZEST 0.05 MG | | porttbl nob 100x0.05mg | IXP | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 212.2 | N04BC02 | pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 131.12 | X |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | |
|-------|----------------|--|------------------------|-----|----|
| 13533 | HIZEST 0.25 MG | | por tbl nob 30x0.25mg | IXP | CZ |
| 13534 | HIZEST 0.25 MG | | porttbl nob 100x0.25mg | IXP | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|
| 212.3 | N04BC02 | pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 3.00 | MG | 119.66 | X |
|-------|---------|---|------|------|----|--------|---|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|
| 13535 | HIZEST 1 MG | | porttbl nob 30x1mg | IXP | CZ |
| 13536 | HIZEST 1 MG | | porttbl nob 100x1mg | IXP | CZ |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika – fenothiaziny, perorální podání | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 213.1 | N05AA01 | chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 12.19 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 213.2 | N05AA01 | chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 6.58 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | |
|-------|-------------------|--|----------------------|-----|---|
| 62313 | PLEGOMAZIN 100 MG | | por tbl obd 30x100mg | EGI | H |
|-------|-------------------|--|----------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 213.3 | N05AA01 | chlorpromazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 62.76 | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|-------|--|
| 213.4 | N05AA02 | levomepromazin | p.o. | 0.30 | GM | 16.94 | |
|-------|---------|----------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 213.5 | N05AA03 | promazin | p.o. | 0.30 | GM | 13.49 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 213.6 | N05AB03 | perfenazin | p.o. | 30.00 | MG | 1.83 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|-------|--|
| 213.7 | N05AB04 | prochlorperazin | p.o. | 0.10 | GM | 12.42 | |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|
| 213.8 | N05AB06 | trifluoperazin | p.o. | 20.00 | MG | 6.99 | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|
| 213.9 | N05AB08 | thioproperazin | p.o. | 75.00 | MG | 6.70 | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|------|-------|----|-------|---------------|
| 213.10 | N05AC01 | periciazin (pevné lékové formy) | p.o. | 50.00 | MG | 5.72 | L/NEU,PSY,GER |
| 213.11 | N05AC01 | periciazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 50.00 | MG | 5.19 | L/NEU,PSY,GER |
| 213.12 | N05AC02 | thioridazin | p.o. | 0.30 | GM | 10.03 | |

| | |
|-----|--|
| 214 | neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 214.1 | N05AD01 | haloperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 6.06 | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|--|

10575 APO-HALOPERIDOL 5 por tbl nob 100x5mg APT CND
 15310 APO-HALOPERIDOL 5 por tbl nob 100x5mg CMG IRL
 15311 APO-HALOPERIDOL 1 por tbl nob 100x1mg CMG IRL
 98291 APO-HALOPERIDOL tbl 100x1mg APT CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 214.2 | N05AD01 | haloperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 8.00 | MG | 10.12 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 214.3 | N05AD02 | trifluperidol (pevné lékové formy) | p.o. | 2.00 | MG | 3.91 | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 214.4 | N05AD02 | trifluperidol (tekuté lékové formy) | p.o. | 2.00 | MG | 7.72 | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 214.5 | N05AD03 | melperon | p.o. | 0.30 | GM | 24.94 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|
| 214.6 | N05AE03 | sertindol | p.o. | 1.00 | DF | 107.18 | P |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|---|

13039 SERDOLECT 4 MG por tbl flm 30x4mg LUN DK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|
| 214.7 | N05AE04 | ziprasidon | p.o. | 80.00 | MG | 107.18 | P |
|-------|---------|------------|------|-------|----|--------|---|

Ziprasidon a sertindol předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

| | |
|-----|---|
| 215 | neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|------|-------|----|-------|--|
| 215.1 | N05AF | oxyprotepin | p.o. | 20.00 | MG | 18.28 | |
|-------|-------|-------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|
| 215.2 | N05AF01 | flupentixol | p.o. | 6.00 | MG | 15.70 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|--|

88143 FLUANXOL 1 MG drg 100x1mg LUN DK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 215.3 | N05AF03 | chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 26.39 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 215.4 | N05AF03 | chlorprothixen (nad 5 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.30 | GM | 8.18 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 215.5 | N05AF03 | chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 0.30 | GM | 13.27 | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|-------|--|
| 215.6 | N05AF05 | zuklopenthixol | p.o. | 30.00 | MG | 13.27 | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|-------|--|

57823 CISORDINOL 10 MG por tbl flm 50x10mg LUN DK

57827 CISORDINOL 25 MG por tbl flm 50x25mg LUN DK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|--|
| 215.7 | N05AG02 | pimozid | p.o. | 4.00 | MG | 10.76 | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|
| 215.8 | N05AG03 | penfluridol | p.o. | 6.00 | MG | 6.01 | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|------|--|

| | |
|-----|--|
| 216 | neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy, perorální podání |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|
| 217.1 | N05AX08 | risperidon (s obsahem do 1 mg včetně) | p.o. | 5.00 | MG | 30.00 | L/PSY, NEU, GER, INT |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|

| | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|-----|----|
| 10527 | RISPEN 1 | por tbl flm 20x1mg | ZEH | CZ |
| 42525 | RISPEN 1 | por tbl flm 50x1mg | ZEH | CZ |
| 48799 | RISPERIDON-RATIOPHARM 1 MG | por tbl flm 20x1mg | AHF | IS |
| 48805 | RISPERIDON-RATIOPHARM 1 MG | por tbl flm 50x1mg | AHF | IS |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|
| 217.2 | N05AX08 | risperidon (s obsahem nad 1 mg) | p.o. | 5.00 | MG | 31.00 | L/PSY, NEU, GER, INT |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|

| | | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|-----|----|
| 10528 | RISPEN 2 | por tbl flm 20x2mg | ZEH | CZ |
| 10529 | RISPEN 3 | por tbl flm 20x3mg | ZEH | CZ |
| 10530 | RISPEN 4 | por tbl flm 20x4mg | ZEH | CZ |
| 42527 | RISPEN 2 | por tbl flm 50x2mg | ZEH | CZ |
| 42529 | RISPEN 3 | por tbl flm 50x3mg | ZEH | CZ |
| 42531 | RISPEN 4 | por tbl flm 50x4mg | ZEH | CZ |
| 48767 | RISPERIDON-RATIOPHARM 2 MG | por tbl flm 20x2mg | AHF | IS |
| 48773 | RISPERIDON-RATIOPHARM 2 MG | por tbl flm 50x2mg | AHF | IS |
| 48815 | RISPERIDON-RATIOPHARM 3 MG | por tbl flm 20x3mg | AHF | IS |
| 48821 | RISPERIDON-RATIOPHARM 3 MG | por tbl flm 50x3mg | AHF | IS |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|
| 217.3 | N05AX08 | risperidon (tekuté lékové formy) | p.o. | 5.00 | MG | 97.75 | L/PSY, NEU, GER, INT |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-------|
| 217.4 | N05AX11 | zotepin | p.o. | 0.20 | GM | 74.05 | L/PSY |
|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|---|----|--------|---|
| 217.5 | N05AX12 | aripiprazol | p.o. | 1 | DF | 128.62 | P |
|-------|---------|-------------|------|---|----|--------|---|

Aripiprazol předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při neúčinnosti či nesnášenlivosti léčby alespoň dvěma antipsychotiky 2.generace. V této indikaci bude indikována pouze 1 tableta denně v síle 10 mg nebo 15 mg nebo 30 mg.

218 Lithium

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 218.1 | N05AN01 | lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | GM | 4.72 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------|-----|----|
| 02481 | LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA | tbl 100x300mg | ZEH | SK |
|-------|---------------------------------|---------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|
| 218.2 | N05AN01 | lithium nad 0,3 g v jedné tabletě | p.o. | 1.00 | GM | 3.14 | |
|-------|---------|-----------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-----|----|
| 04385 | CONTEMNOL | tbl ret 100x500mg | ZEH | SK |
|-------|-----------|-------------------|-----|----|

219 antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace – nedepotní přípravky

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-------|---|
| 219.1 | N05AA01 | chlorpromazin | parent. | 0.10 | GM | 25.37 | O |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|-------|---|
| 219.2 | N05AA02 | levomepromazin | parent. | 0.10 | GM | 30.89 | O |
|-------|---------|----------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 219.3 | N05AD01 | haloperidol | parent. | 8.00 | MG | 16.72 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|
| 219.4 | N05AD02 | trifluperidol | parent. | 2.00 | MG | 5.52 | O |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|---|
| 219.5 | N05AD03 | melperon | parent. | 0.30 | GM | 50.10 | O |
|-------|---------|----------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|
| 219.6 | N05AD08 | droperidol | parent. | 25.00 | MG | 50.10 | O |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|
| 219.7 | N05AE04 | ziprasidon | parent. | 40.00 | MG | 177.00 | H |
|-------|---------|------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|-------|----|-------|---|
| 219.8 | N05AF | oxyprotepin | parent. | 1.00 | MG | 2.55 | O |
| 219.9 | N05AF03 | chlorprothixen | parent. | 50.00 | MG | 3.03 | O |
| 219.10 | N05AF05 | zuklopenthixol | parent. | 30.00 | MG | 94.25 | O |

93253 CISORDINOL-ACUTARD inj 10x2ml/100mg LUN DK

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---------|-------|----|--------|---|
| 219.11 | N05AH02 | klozapin | parent. | 0.30 | GM | 86.22 | H |
| 219.12 | N05AH03 | olanzapin | parent. | 10.00 | MG | 177.00 | H |

25937 ZYPREXA 10 MG inj plv sol 1x10mg ELH NL

32601 ZYPREXA INTRAMUSCULAR inj plv sol 1x10mg LPF D

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|
| 219.13 | N05AL01 | sulpirid | parent. | 0.80 | GM | 71.33 | O/PSY,NEU |
|--------|---------|----------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|
| 219.14 | N05AL03 | tiaprid | parent. | 0.40 | GM | 41.88 | O |
|--------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|

99929 TIAPRA 100MG/2ML inj sol 10x2ml ZEH SK

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 220 | antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace – depotní přípravky | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|
| 220.1 | N05AB02 | flufenazin | parent. | 1.00 | MG | 3.92 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|------|---|

03514 MODITEN DEPOT inj 5x1ml/25mg BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 220.2 | N05AD01 | haloperidol (depotní lékové formy) | parent. | 3.30 | MG | 9.82 | O |
|-------|---------|------------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 220.3 | N05AF01 | flupentixol | parent. | 4.00 | MG | 15.16 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

91830 FLUANXOL DEPOT inj 10x2ml/40mg LUN DK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 220.4 | N05AF05 | zuklopenthixol (depotní formy) | parent. | 15.00 | MG | 11.78 | O |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 220.5 | N05AG01 | fluspirilen | parent. | 0.70 | MG | 12.39 | O |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 220.6 | N05AX08 | risperidon s obsahem do 25 mg v jedné ampuli včetně | parent. | 1.80 | MG | 288.09 | P |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|
| 220.7 | N05AX08 | risperidon s obsahem nad 25 mg do 49 mg v jedné ampuli včetně | parent. | 1.80 | MG | 262.00 | P |
|-------|---------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 220.8 | N05AX08 | risperidon s obsahem 50 mg a více v 1 amp. | parent. | 1.80 | MG | 247.46 | P |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

Risperidon ve formě depotní injekce je předepisován psychiatrem a hrazen u dospělých pacientů se schizofrenií s dobrou prognózou, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky zároveň:

- a) negativní skóre v dotazníku DAI-10 a je u nich potvrzena non-adherence k léčbě,
- b) byli opakovaně hospitalizováni pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby,
- c) byli léčeni alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alespoň jedno bylo antipsychotikum atypické.

Léčba pacienta splňujícího výše uvedené je ukončena, pokud relabuje během 12 měsíců od zahájení léčby injekčním risperidonem, nebo pokud léčbu není možné řádně dávkovat pro pokračující nespolupráci pacienta.

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | anxiolytika, perorální podání | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|--|
| 221.1 | N05BA01 | diazepam | p.o. | 10.00 | MG | 0.68 | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|--|

02478 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG tbl 20x10mg ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|-------|----|------|--|
| 221.2 | N05BA02 | chlordiazepoxid | p.o. | 30.00 | MG | 0.68 | |
|-------|---------|-----------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|-------|----|------|---|
| 221.3 | N05BA03 | medazepam | p.o. | 20.00 | MG | 0.68 | |
| 221.4 | N05BA04 | oxazepam | p.o. | 50.00 | MG | 0.68 | |
| 221.5 | N05BA05 | klorazepát draselný | p.o. | 20.00 | MG | 0.68 | |
| 221.6 | N05BA06 | lorazepam | p.o. | 2.50 | MG | 0.68 | |
| 221.7 | N05BA08 | bromazepam | p.o. | 10.00 | MG | 0.68 | |
| 221.8 | N05BA09 | klobazam | p.o. | 20.00 | MG | 0.68 | |
| 221.9 | N05BA11 | prazepam | p.o. | 30.00 | MG | 0.68 | |
| 221.10 | N05BA12 | alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 2.49 | P |

Léčbu alprazolarem předepisuje psychiatrist, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

40634 NEUROL SR 1.0

por tbl pro 30x1mg

ZEH CZ

40649 NEUROL SR 2.0

por tbl pro 30x2mg

ZEH CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 221.11 | N05BA12 | alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě) | p.o. | 1.00 | MG | 0.68 | |
| 221.12 | N05BA23 | tofisopam | p.o. | 0.15 | GM | 0.68 | |
| 221.13 | N05BB01 | hydroxyzin | p.o. | 75.00 | MG | 0.68 | |
| 221.14 | N05BC01 | meprobamat | p.o. | 1.20 | GM | 0.68 | |
| 221.15 | N05BE01 | buspiron | p.o. | 30.00 | MG | 2.51 | |
| 221.16 | N05BX01 | mefenoxalon | p.o. | 1.20 | GM | 16.38 | |

222 anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace

| | | | | | | | |
|-------|------------------|----------|--------------------|-------|-----|------|--|
| 222.1 | N05BA01 | diazepam | parent. | 10.00 | MG | 6.98 | |
| 30097 | DIAZEPAM BIOTIKA | | inj sol10x2ml/10mg | BTA | SK | | |
| 96610 | APAURIN | | inj sol10x2ml/10mg | KRK | SLO | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|--------|---------------|
| 222.2 | N05BA01 | diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně) | p.rect. | 10.00 | MG | 108.16 | L/NEU,PSY,PED |
|-------|---------|--|---------|-------|----|--------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------|----|-------|---------------|
| 04326 | STESOLID 5 MG | | enm 5x2.5ml/5mg | ALO | N | | |
| 222.3 | N05BA01 | diazepam (nad 5 mg v jednom čípku) | p.rect. | 10.00 | MG | 67.14 | L/NEU,PSY,PED |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------------|------------------|--------|----|----------|---|
| 04327 | STESOLID 10 MG | | enm 5x2.5ml/10mg | ALO | N | | |
| 222.4 | N05BA05 | klorazepát draselný | parent. | 20.00 | MG | 14.66 | |
| 222.5 | N05CA01 | pentobarbital | parent. | 0.10 | GM | 23.32 | H |
| 222.6 | N05CM | dexmedetomidin | parent. | 500.00 | RG | 1 300.00 | H |

223 Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|--|
| 223.1 | N06AA01 | desipramin | p.o. | 0.10 | GM | 17.11 | |
| 223.2 | N06AA02 | imipramin | p.o. | 0.10 | GM | 9.90 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------|---------------------|--------|-----|-------|--|
| 223.3 | N06AA04 | klomipramin | p.o. | 0.10 | GM | 14.49 | |
| 08557 | ANAFRANIL 25 | | por tbl obd 30x25mg | NPA | CH | | |
| 16028 | ANAFRANIL SR 75 | | tbl ret 20x75mg | NAI | CZ | | |
| 16029 | ANAFRANIL 25 | | tbl obd 30x25mg | NAI | CZ | | |
| 93828 | ANAFRANIL SR 75 | | por tbl ret 20x75mg | NPA | CH | | |
| 223.4 | N06AA05 | opipramol | p.o. | 0.15 | GM | 12.02 | |
| 223.5 | N06AA07 | lofepramín | p.o. | 105.00 | MG | 14.66 | |
| 223.6 | N06AA08 | dibenzepin | p.o. | 0.30 | GM | 14.90 | |
| 02641 | NOVERIL 240 | | por tbl ret20x240mg | NPA | CH | | |
| 16313 | NOVERIL 240 | | por tbl ret20x240mg | NAI | CZ | | |
| 223.7 | N06AA09 | amitriptylin | p.o. | 75.00 | MG | 2.85 | |
| 87167 | AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA | | tbl obd 50x28.3mg | ZEH | SK | | |
| 223.8 | N06AA10 | nortriptylin | p.o. | 75.00 | MG | 9.02 | |
| 12343 | NORTRILEN | | tbl 50x25mg | LUN | DK | | |
| 223.9 | N06AA16 | dosulepin | p.o. | 150.00 | MG | 9.78 | |
| 04207 | PROTHIADEN 25 | | drg 30x25mg | ZEH | CZ | | |
| 223.10 | N06AA21 | maprotilin | p.o. | 100.00 | MG | 12.28 | |
| 04257 | LUDIOMIL 75 | | drg 20x75mg | NPA | CH | | |
| 16312 | LUDIOMIL 75 | | drg 20x75mg | NAI | CZ | | |
| 45757 | MAPROTIBENE 25 MG | | por tbl flm 20x25mg | MCK | D | | |
| 224 | Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání | | | | | | |
| 224.1 | N06AB03 | fluoxetin | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | |
| 15302 | APO-FLUOXETINE | | cps 30x20mg | CMG | IRL | | |
| 15303 | APO-FLUOXETINE | | cps 100x20mg | CMG | IRL | | |
| 17116 | APO-FLUOXETINE | | cps 30x20mg | KAT | NL | | |
| 17118 | APO-FLUOXETINE | | cps 100x20mg | KAT | NL | | |
| 44397 | APO-FLUOXETINE | | cps 30x20mg | APT | CND | | |
| 44398 | APO-FLUOXETINE | | cps 100x20mg | APT | CND | | |
| 48878 | FLUOXIN | | por cps dur 20x20mg | HPZ | PL | | |
| 48879 | FLUOXIN | | por cps dur 50x20mg | HPZ | PL | | |
| 48880 | FLUOXIN | | por cps dur100x20mg | HPZ | PL | | |
| 54422 | MAGRILAN | | cps 10x20mg | MOE | CY | | |
| 54423 | MAGRILAN | | cps 30x20mg | MOE | CY | | |
| 59274 | FLUMIREX | | cps 30x20mg | CHN | H | | |
| 64656 | FLUOXIN | | por cps dur 20x20mg | SFS | D | | |
| 64657 | FLUOXIN | | por cps dur 50x20mg | SFS | D | | |
| 64658 | FLUOXIN | | por cps dur100x20mg | SFS | D | | |
| 95457 | FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG | | por cps dur30x20mg | MCK | D | | |
| 95458 | FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG | | por cpsdur100x20mg | MCK | D | | |
| 98791 | DEPREX LÉČIVA | | por cps dur 30x20mg | ZEH | CZ | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|--|
| 224.2 | N06AB04 | citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 20.00 | MG | 13.50 | |
|-------|---------|--|------|-------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|-----|-----|
| 03976 | CITALEC 10 | tbl obd30x10mg-bli | ZEH | CZ |
| 15778 | ZYLORAM 10 MG TABLETY | por tbl flm 28x10mg | IRI | IRL |
| 48469 | CITA 10 MG | por tbl flm28x10mg | ARN | D |
| 48472 | CITA 10 MG | por tbl flm56x10mg | ARN | D |
| 95925 | CITALOPRAM PLIVA 10 MG | por tbl flm 28x10mg | AWD | D |
| 95926 | CITALOPRAM PLIVA 10 MG | por tbl flm 28x10mg | KRZ | PL |
| 95927 | CITALOPRAM PLIVA 10 MG | por tbl flm 28x10mg | PPL | GB |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 224.3 | N06AB04 | citalopram nad 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|------------------------|---------------------|-----|-----|
| 03978 | CITALEC 20 | tbl obd30x20mg-bli | ZEH | CZ |
| 15170 | CITALON 20 MG | por tbl flm 28x20mg | SZG | D |
| 15788 | ZYLORAM 20 MG TABLETY | por tbl flm 28x20mg | IRI | IRL |
| 16107 | ZYLORAM 40 MG TABLETY | por tbl flm 28x40mg | IRI | IRL |
| 48493 | CITA 20 MG | por tbl flm28x20mg | ARN | D |
| 48496 | CITA 20 MG | por tbl flm56x20mg | ARN | D |
| 48517 | CITA 40 MG | por tbl flm28x40mg | ARN | D |
| 95928 | CITALOPRAM PLIVA 20 MG | por tbl flm 28x20mg | AWD | D |
| 95929 | CITALOPRAM PLIVA 20 MG | por tbl flm 28x20mg | PPL | GB |
| 95930 | CITALOPRAM PLIVA 20 MG | por tbl flm 28x20mg | KRZ | PL |
| 95931 | CITALOPRAM PLIVA 40 MG | por tbl flm 28x40mg | AWD | D |
| 95932 | CITALOPRAM PLIVA 40 MG | por tbl flm 28x40mg | PPL | GB |
| 95933 | CITALOPRAM PLIVA 40 MG | por tbl flm 28x40mg | KRZ | PL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 224.4 | N06AB04 | citalopram, tekuté lékové formy | p.o. | 20.00 | MG | 13.80 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|
| 224.5 | N06AB05 | paroxetin | p.o. | 20.00 | MG | 12.00 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|-----|
| 10479 | PAROLEX 40 | por tbflfm30x40mg-b | HPZ | PL |
| 10482 | PAROLEX 20 | por tbflfm60x20mg-b | HPZ | PL |
| 10488 | PAROLEX 20 | por tbflfm30x20mg-b | HPZ | PL |
| 13854 | PAROLEX 20 | por tbflfm60x20mg-b | SFS | D |
| 13860 | PAROLEX 20 | por tbflfm30x20mg-b | SFS | D |
| 13868 | PAROLEX 40 | por tbflfm30x40mg-b | SFS | D |
| 15312 | APO-PAROX | por tbl flm 30x20mg | CMG | IRL |
| 15313 | APO-PAROX | por tbl flm100x20mg | CMG | IRL |
| 17112 | APO-PAROX | por tbl flm 30x20mg | KAT | NL |
| 17113 | APO-PAROX | por tbl flm100x20mg | KAT | NL |
| 30860 | APO-PAROX | por tbl flm 30x20mg | APT | CND |
| 30861 | APO-PAROX | por tbl flm100x20mg | APT | CND |
| 41158 | PAROLEX 20 | por tbflfm60x20mg-b | HED | DK |
| 46384 | PAROXETIN-RATIOPHARM 20 MG | por tbl flm 30x20mg | MCK | D |
| 96215 | PAROLEX 20 | por tbflfm30x20mg-b | HED | DK |
| 96217 | PAROLEX 40 | por tbflfm30x40mg-b | HED | DK |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|
| 224.6 | N06AB06 | sertralín | p.o. | 50.00 | MG | 12.00 | |
|-------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|---------------------|----------------------|-----|----|
| 02352 | SERTRALIN HEXAL 50 | porttblflm28x50mg b | HED | DK |
| 02398 | SERTRALIN HEXAL 50 | porttblflm28x50mg b | SFS | D |
| 03049 | SERTRALIN HEXAL 100 | porttblflm28x100mg-b | HED | DK |
| 03060 | SERTRALIN HEXAL 100 | porttblflm28x100mg-b | SFS | D |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|
| 15448 | SERTRALIN HEXAL 50 | portblflm28x50mg b | GEA | DK |
| 15465 | SERTRALIN HEXAL 100 | portblflm28x100mg-b | GEA | DK |
| 15817 | SERLIFT 50 MG | por tblflm 30x50mg | IRI | IRL |
| 15819 | SERLIFT 100 MG | por tbl flm30x100mg | IRI | IRL |
| 16116 | SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl flm 30x50mg | MCK | D |
| 16136 | SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl flm 30x50mg | AHK | IS |
| 16137 | SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MG | por tbl flm 30x50mg | AHF | IS |
| 16216 | SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MG | por tbl flm30x100mg | AHF | IS |
| 16217 | SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MG | por tbl flm30x100mg | AHK | IS |
| 16218 | SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MG | por tbl flm30x100mg | MCK | D |
| 17716 | SERLIFT 100 MG | por tbl flm30x100mg | VUM | SK |
| 17718 | SERLIFT 50 MG | por tblflm 30x50mg | VUM | SK |
| 17901 | APO-SERTRAL 100 | por cps dur30x100mg | KAT | NL |
| 17904 | APO-SERTRAL 50 | por cps dur 30x50mg | KAT | NL |
| 17906 | APO-SERTRAL 50 | por cps dur100x50mg | KAT | NL |
| 17909 | APO-SERTRAL 50 | por cps dur 30x50mg | CMG | IRL |
| 17911 | APO-SERTRAL 50 | por cps dur100x50mg | CMG | IRL |
| 17912 | APO-SERTRAL 100 | por cps dur30x100mg | CMG | IRL |
| 17964 | ASENTRA 50 | por tbl flm 56x50mg | KRK | SLO |
| 17965 | ASENTRA 50 | por tbl flm 84x50mg | KRK | SLO |
| 17966 | ASENTRA 100 | por tblflm 56x100mg | KRK | SLO |
| 17967 | ASENTRA 100 | por tblflm 84x100mg | KRK | SLO |
| 23778 | STIMULOTON 100 MG | por tbl flm28x100mg | EGI | H |
| 31866 | ASENTRA 50 | por tbl flm 28x50mg | KRK | SLO |
| 31867 | ASENTRA 100 | por tblflm 28x100mg | KRK | SLO |
| 32660 | STIMULOTON 50 MG | por tbl flm 30x50mg | EGI | H |
| 32743 | SERTRALIN IREX 50 MG | por tbl flm 28x50mg | OMA | IS |
| 47325 | SERTRALIN IREX 100 MG | por tblflm 28x100mg | OMA | IS |
| 59556 | SERLIFT 50 MG | por tblflm 30x50mg | RXY | IND |
| 59560 | SERLIFT 100 MG | por tbl flm30x100mg | RXY | IND |

| | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|----|-------|--|
| 224.7 | N06AB08 | fluvoxamin (do 50 mg v jedné tabletě) p.o. | 100.00 | MG | 13.50 | |
|-------|---------|---|--------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|--------|----|-------|--|
| 224.8 | N06AB08 | fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě) | p.o. | 100.00 | MG | 12.00 | |
|-------|---------|--|------|--------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|-------|----|-------|--|
| 224.9 | N06AB10 | escitalopram | p.o. | 10.00 | MG | 12.00 | |
|-------|---------|--------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 225 | Antidepresiva působící inhibičně na monoaminoxidázu a ostatní antidepresiva, perorální podání | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|----------------|
| 225.1 | N06AF01 | isocarbaxazid | p.o. | 15.00 | MG | 4.30 | L/PSY,SEX,NEU, |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|----------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|---------------|
| 225.2 | N06AF04 | tranylcypromin | p.o. | 10.00 | MG | 5.03 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|---------------|

| | | | | | | |
|-------|---------|---|------|----|-------|------------------------|
| 225.3 | N06AG02 | moklobemid do 150mg v jedné tabletě) p.o. | 0.30 | GM | 13.50 | L/PSY,SEX,NEU, INT,GER |
|-------|---------|---|------|----|-------|------------------------|

| | | | | |
|-------|----------------|---------------------|-----|-----|
| 15226 | APO-MOCLOB 150 | por tbl flm30x150mg | CMG | IRL |
| 15228 | APO-MOCLOB 150 | por tblflm100x150mg | CMG | IRL |
| 18703 | APO-MOCLOB 150 | por tbl flm30x150mg | KAT | NL |
| 18705 | APO-MOCLOB 150 | por tblflm100x150mg | KAT | NL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|------------------------|
| 225.4 | N06AG02 | moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě | p.o. | 0.30 | GM | 12.00 | L/PSY,SEX,NEU, INT,GER |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|------------------------|

| | | | | | |
|-------|----------------|--|---------------------|-----|-----|
| 15229 | APO-MOCLOB 300 | | por tbl flm30x300mg | CMG | IRL |
| 15231 | APO-MOCLOB 300 | | por tblflm100x300mg | CMG | IRL |
| 18706 | APO-MOCLOB 300 | | por tbl flm30x300mg | KAT | NL |
| 18708 | APO-MOCLOB 300 | | por tblflm100x300mg | KAT | NL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 225.5 | N06AX03 | mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 60.00 | MG | 13.50 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------------|-----|---|
| 45769 | MIABENE 10 MG | | por tbl flm 20x10mg | MCK | D |
|-------|---------------|--|---------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 225.6 | N06AX03 | mianserin nad 10 mg v jedné tabletě | p.o. | 60.00 | MG | 12.00 | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------------|-----|---|
| 45771 | MIABENE 30 MG | | por tbl flm 20x30mg | MCK | D |
|-------|---------------|--|---------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|--|
| 225.7 | N06AX05 | trazodon | p.o. | 0.30 | GM | 12.00 | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 225.8 | N06AX05 | trazodon, tablety s řízeným uvolňováním | p.o. | 0.30 | GM | 14.20 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|------|--------|----|-------|---------------|
| 225.9 | N06AX06 | nefazodon hydrochlorid | p.o. | 400.00 | MG | 18.63 | L/PSY,SEX,NEU |
|-------|---------|------------------------|------|--------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|---------------|
| 225.10 | N06AX09 | viloxazin | p.o. | 0.20 | GM | 12.80 | L/PSY,SEX,NEU |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|-------|----|-------|---------------|
| 225.11 | N06AX11 | mirtazapin | p.o. | 30.00 | MG | 13.50 | L/PSY,SEX,NEU |
|--------|---------|------------|------|-------|----|-------|---------------|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|-----|
| 16647 | MIRZATEN 45 | | por tbl flm 30x45mg | KRK | SLO |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|-----|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|-----|
| 17664 | MIRZATEN 15 | | por tbl flm 30x15mg | KRK | SLO |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|-----|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|-----|
| 17685 | MIRZATEN 30 | | por tbl flm 30x30mg | KRK | SLO |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|-----|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|
| 49805 | ESPRITAL 15 | | por tbl flm 30x15mg | ZEH | CZ |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|
| 49806 | ESPRITAL 30 | | por tbl flm 30x30mg | ZEH | CZ |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|

| | | | | | |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|
| 49807 | ESPRITAL 45 | | por tbl flm 30x45mg | ZEH | CZ |
|-------|-------------|--|---------------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|--------|----|-------|---------------|
| 225.12 | N06AX12 | bupropion | p.o. | 200.00 | MG | 14.60 | L/PSY,SEX,NEU |
|--------|---------|-----------|------|--------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|
| 225.13 | N06AX14 | tianeptin | p.o. | 37.50 | MG | 12.00 | |
|--------|---------|-----------|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|---------------|
| 225.14 | N06AX16 | venlafaxin | p.o. | 100.00 | MG | 18.00 | L/NEU,PSY,SEX |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|-------|---------------|
| 225.15 | N06AX17 | milnacipran | p.o. | 100.00 | MG | 18.00 | L/NEU,PSY,SEX |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|
| 225.16 | N06AX18 | reboxetin | p.o. | 8.00 | MG | 12.00 | |
|--------|---------|-----------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|
| 225.17 | N06AX21 | duloxetin | p.o. | 60.00 | MG | 60.00 | P |
|--------|---------|-----------|------|-------|----|-------|---|

Předepisuje neurolog k léčbě diabetické neuropatické bolesti u pacientů, kteří neměli dostatečnou terapeutickou odpověď (nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) nebo netolerovali léky první volby (amitriptylin, karbamazepin). Kontrola účinnosti léčby duloxetinem v této indikaci je provedena nejpozději po 4 týdnech a pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|------|--------|----|------|--|
| 225.18 | V11 | hyperici extractum siccum (LI 160) | p.o. | 900.00 | MG | 6.50 | |
| 225.19 | V11 | hyperici extractum siccum normatum (ostatní) | p.o. | 900.00 | MG | 2.00 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 226 | Antidepresiva, ostatní cesty aplikace | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|
| 226.1 | N05CD03 | flunitrazepam | parent. | 1.00 | MG | 6.61 | O |
|-------|---------|---------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|---|
| 226.2 | N05CD08 | midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 15.00 | MG | 74.03 | O |
| 226.3 | N05CD08 | midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli) | parent. | 15.00 | MG | 51.03 | O |
| 226.4 | N06AA01 | desipramin | parent. | 0.10 | GM | 96.44 | O |
| 226.5 | N06AA02 | imipramin | parent. | 0.10 | GM | 48.39 | O |
| 226.6 | N06AA04 | klomipramin | parent. | 0.10 | GM | 95.76 | O |

02884 ANAFRANIL inj 10x2ml/25mg NPA CH
 15618 ANAFRANIL inj sol 10x2ml/25mg NAI CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------|--------|----|--------|-----------|
| 226.7 | N06AA08 | dibenzepin | parent. | 0.30 | GM | 96.44 | O |
| 226.8 | N06AA09 | amitriptylin | parent. | 75.00 | MG | 30.79 | O |
| 226.9 | N06AA21 | maprotilin | parent. | 100.00 | MG | 108.64 | O |
| 226.10 | N06AB04 | citalopram | parent. | 20.00 | MG | 228.29 | O/PSY,SEX |

60113 SEROPRAM inf cnc sol 10x1ml LUN DK

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------|---------------------|--------|----|--------|--------------------|
| 227 | stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence | | | | | | |
| 227.1 | N06BA04 | methylphenidat | p.o. | 30.00 | MG | 9.00 | L/NEU,PSY,PED, SEX |
| 15622 | RITALIN | | por tbl nob 30x10mg | NAI | CZ | | |
| 83328 | RITALIN | | tbl 30x10mg | NPA | CH | | |
| 227.2 | N06BA07 | modafinil | p.o. | 300.00 | MG | 320.00 | P |

Léčba modafinilem je předepisována ošetřujícím lékařem specializovaného pracoviště pro poruchy spánku, resp. spánkové laboratoře a hrazena u pacientů:

- a) u kterých je kontraindikována (glaukom, arytmie, závažná hypertenze) léčba methylphenidatem,
- b) u nichž není možné dosáhnout dostatečné kompenzace ani vysokými dávkami methylphenidatu (až 60mg denně), tj.: denní usínání je vyřazuje z jinak možného zapojení do pracovního procesu.

Pokud po 3 měsících není dosaženo zásadní změny a uspokojivého výsledku (nemocný je schopen zapojení do pracovního procesu), není léčba modafinilem dále indikována.

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 227.3 | N06BX01 | meklofenoxat | parent. | 0.50 | GM | 83.53 | H |
| 227.4 | N06BX02 | pyritinol | parent. | 0.30 | GM | 57.25 | H |
| 227.5 | N06BX02 | pyritinol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 3.90 | |
| 227.6 | N06BX02 | pyritinol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.30 | GM | 17.80 | P |

Pyritinol, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatrist a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
- 2) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,
- 3) vaskulární demence,
- 4) kortikální myoklonus,
- 5) DMO.

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------------------------|----------------|------|----|-------|---|
| 227.7 | N06BX03 | piracetam | parent. | 6.00 | GM | 57.25 | H |
| 11337 | GERATAM 3 G | | inj 4x15ml/3gm | UCB | B | | |
| 227.8 | N06BX03 | piracetam (pevné lékové formy) | p.o. | 2.40 | GM | 3.50 | |

227.9 N06BX03 piracetam (tekuté lékové formy) p.o. 2.40 GM 17.80 P

Piracetam, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr v uvedených indikacích u dětí. U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
 - 2) stav po kraniocerebrálních traumatech - pourazové kognitivní a psychické dysfunkce,
 - 3) vaskulární demence,
 - 4) kortikální myoklonus,
 - 5) DMO.

227.10 N06BX18 vinpocetin p.o. 15.00 MG 3.90

227.11 N06BX18 vinpocetin parent. 15.00 MG 24.98 H

227.12 N06DX01 memantin p.o. 20.00 MG 100.00 P

Léčbu memantinem předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 17-6 bodů.

Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba memantinem není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjistění skóre škály MMSE pod 6 bodů škály. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|
| 227.13 | N06DX02 | extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy) | p.o. | 120.00 | MG | 4.50 | |
|--------|---------|--|------|--------|----|------|--|

228 parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání

Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (IAchE předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyšídřeným dle škály MMSE (Mini Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně.

Výjadreném dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně. Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAcHE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAcHE je indikována při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAcHE. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAcHE není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěním skóre škálky MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

228.1 N06DA02 donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně p.o. 1.00 DF 46.17 P

228.2 N07AA03 distigmin p.o. 5.00 MG 5.79

02130 UBRETID 5 MG por tbl nob 50x5mg NYC A

02360 UBRETID 5 MG por tabl nro 20x5mg NYC A

228.3 N06DA02 donepezil nad 5 mg v jedné tabletě p.o. 1.00 DF 90.00 P

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|
| 228.4 | N06DA03 | rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetně | p.o. | 2.00 | DF | 46.17 | P |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|---|

228.5 N06DA03 rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletě p.o. 2.00 DF 90.00 P

228.6 N06DA04 galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně p.o. 2.00 DF 46.17 P

228.7 N06DA04 galantamin nad 4 mg v jedné tabletě p.o. 2.00 DF 90.00 P

228.8 N07AA01 neostigmin p.o. 60.00 MG 19.75

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--|--------|----|-------|--|
| 228.9 | N07AA02 | pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě) p.o. včetně) | | 180.00 | MG | 19.33 | |
|-------|---------|--|--|--------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--|--------|----|-------|-------|
| 228.10 | N07AA02 | pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě) p.o. | | 180.00 | MG | 17.65 | L/NEU |
|--------|---------|--|--|--------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 229 | parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|
| 229.1 | N07AA01 | neostigmin | parent. | 2.00 | MG | 18.20 | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|-------|--|

00612 SYNTOSTIGMIN inj 10x1ml/0.5mg HBS SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|-------|----|--------|--|
| 229.2 | N07AA02 | pyridostigmin | parent. | 10.00 | MG | 113.20 | |
|-------|---------|---------------|---------|-------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|--|
| 229.3 | N07AA02 | distigmin | parent. | 0.25 | MG | 5.62 | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 230 | léčiva používaná při léčbě závrati a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|--|
| 230.1 | N07AA30 | ambenonium | p.o. | 60.00 | MG | 18.60 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|-------|--|

20327 MYTELASE por tbl nob 50x10mg SXQ P

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 230.2 | N07CA01 | betahistin | p.o. | 24.00 | MG | 7.88 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|
| 230.3 | N07CA02 | cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 90.00 | MG | 1.86 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 230.4 | N07CA02 | cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě) | p.o. | 90.00 | MG | 1.56 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|
| 230.5 | N07CA03 | flunarizin | p.o. | 10.00 | MG | 4.79 | |
|-------|---------|------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 230.6 | N07CA52 | cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem) | p.o. | 3.00 | DF | 4.79 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 231 | ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|---------|-------|----|------|---|
| 231.1 | A11DA | thiamin (vit. B1), prostý | parent. | 75.00 | MG | 5.50 | H |
|-------|-------|---------------------------|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|-------|----|------|---|
| 231.2 | A11DA01 | thiamin (vit. B1) | parent. | 50.00 | MG | 5.50 | H |
|-------|---------|-------------------|---------|-------|----|------|---|

92502 THIABENE inj 6x2ml/100mg MCK D

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 231.3 | A11DB | kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12) | parent. | 10.00 | ML | 93.80 | H |
|-------|-------|--|---------|-------|----|-------|---|

11485 MILGAMMA N inj 5x2ml SLH D

11486 MILGAMMA N inj 25x2ml SLH D

11487 MILGAMMA N inj 100x2ml SLH D

11488 MILGAMMA N inj 500x2ml SLH D

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|---|
| 231.4 | A11HA02 | pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6) | parent. | 0.16 | GM | 16.58 | H |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|
| 231.5 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně) | parent. | 0.20 | GM | 69.90 | H |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|------|---|
| 231.6 | A11HA03 | tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml) | parent. | 0.20 | GM | 7.58 | H |
|-------|---------|-------------------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|---------|-------|----|------|---|
| 231.7 | A11HA04 | riboflavin (vitamin B2) | parent. | 20.00 | MG | 6.11 | H |
|-------|---------|-------------------------|---------|-------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--------|----|--------|---|
| 231.8 | N01AB01 | halotan | inhal. | 100.00 | ML | 304.96 | H |
|-------|---------|---------|--------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|--------|----|----------|---|
| 231.9 | N01AB06 | isofluran | inhal. | 100.00 | ML | 1 559.92 | H |
|-------|---------|-----------|--------|--------|----|----------|---|

55405 AERRANE inh sol 1x250ml BXI B

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|--------|----|----------|---|
| 231.10 | N01AB07 | desfluran | inhal. | 100.00 | ML | 1 125.60 | H |
| 231.11 | N01AB08 | sevofluoran | inhal. | 100.00 | ML | 2 290.62 | H |
| 231.12 | N01AF01 | metohexital | parent. | 0.50 | GM | 142.63 | H |
| 231.13 | N01AF03 | thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.50 | GM | 60.41 | H |
| 231.14 | N01AF03 | thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.50 | GM | 38.85 | H |
| 231.15 | N01AX03 | ketamin (koncentrace nad 1%) | parent. | 1.00 | GM | 234.04 | O |
| 231.16 | N01AX03 | ketamin (koncentrace do 1% včetně) | parent. | 1.00 | GM | 240.19 | O |
| 231.17 | N01AX04 | propanidid | parent. | 1.00 | GM | 32.11 | O |
| 231.18 | N01AX07 | etomidát | parent. | 50.00 | MG | 162.72 | O |
| 231.19 | N01AX10 | propofol – 2% koncentrace | parent. | 10.00 | ML | 139.00 | O |
| 231.20 | N01AX10 | propofol – koncentrace do 1% včetně | parent. | 10.00 | ML | 87.00 | O |

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|-----|-----|
| 32497 | PROPOFOL 1% FRESENIUS | inj/inf eml 1x100ml | FRK | A |
| 32498 | PROPOFOL 1% FRESENIUS | inj/inf eml10x100ml | FRK | A |
| 45370 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml-am | ABB | E |
| 45371 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml | ABB | E |
| 45408 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 1x100ml | ABB | E |
| 53441 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml-am | ABN | USA |
| 53442 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 5x20ml-la | ABN | USA |
| 53444 | PROPOFOL ABBOTT | inj eml 1x100ml | ABN | USA |
| 56664 | PROPOFOL GENTHON 10 MG/ML | inj eml5x20ml/200mg | GNN | D |

231.21 N07XX01 tirilazad parent. 150.00 MG 5 226.44 X

232 Antimalarika

232.1 P01BA01 chlorochin p.o. 0.50 GM 2.79

00098 DELAGUtbl 30x250mg IHLI H

- Léčbu hydroxychlorochinem předepisuje
a) systémového lupus erythematoses,
b) revmatoidní arthritis,
c) juvenilní chronické arthritis,
d) diskoidní formy lupus erythematoses

232.3 P01BC02 meflochin p.o. 1.00 GM 308.40 P

Léčbu meflochinem předepisuje infekcionista v léčbě tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na *Plasmodium falciparum*).

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 232.4 | P01BD01 | pyrimethamin | p.o. | 75.00 | MG | 15.93 | |
| 232.5 | P01BD51 | pyrimethamin, kombinace | p.o. | 75.00 | MG | 50.83 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|-------|-----|----------|---------------|
| 233 | Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí | | | | | | |
| 233.1 | P01CX01 | pentamidin isethionát | parent. | 0.28 | GM | 1 047.13 | X |
| 233.2 | P02CA01 | mebendazol | p.o. | 0.20 | GM | 13.60 | |
| 233.3 | P02CA02 | tiabendazol | p.o. | 3.00 | GM | 125.42 | |
| 233.4 | P02CA03 | albendazol | p.o. | 0.40 | GM | 59.78 | |
| 91146 | ZENTEL | | tbl obd 2x200mg | | SKM | F | |
| 233.5 | P02CB01 | piperazin | p.o. | 2.00 | GM | 3.96 | |
| 233.6 | P02CE01 | levamizol | p.o. | 0.15 | GM | 29.55 | |
| 233.7 | P02CX01 | pyrvinium | p.o. | 0.30 | GM | 17.69 | |
| 233.8 | P02DA01 | niklosamid | p.o. | 2.00 | GM | 131.19 | |
| 233.9 | P03AB02 | Lindan (lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 2.54 | |
| 233.10 | P03AB02 | Lindan (lékové formy lotia) | lok. | 1.00 | ML | 1.08 | |
| 97547 | JACUTIN | | eml 1x200ml/600mg | | HEM | D | |
| 233.11 | P03AB02 | Lindan (lékové formy spreje) | lok. | 1.00 | ML | 1.17 | |
| 233.12 | P03AC | esdepaletherin | lok. | 1.00 | ML | 1.17 | |
| 233.13 | P03AC04 | permerthrin | lok. | 1.00 | ML | 1.17 | |
| 234 | nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů | | | | | | |
| 234.1 | R01AC01 | natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení) | lok. | 40.00 | MG | 13.09 | L/ALG,TRN,ORL |
| 42545 | CROMOSOL | | nas spr sol 1x28ml | | ICN | PL | |
| 49933 | CROMOHEXAL | | nas spr sol 1x30ml | | SFS | D | |
| 97616 | CROMOHEXAL | | nas spr sol 1x30ml | | SFS | D | |
| 234.2 | R01AC01 | natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení) | lok. | 40.00 | MG | 13.88 | L/ALG,TRN,ORL |
| 12582 | ALLERGOCROM | | spr nas 1x15ml | | URS | D | |
| 49932 | CROMOHEXAL | | nas spr sol 1x15ml | | SFS | D | |
| 53742 | ALLERGO-COMOD NOSNÍ SPREJ | | spr nas 1x15ml | | URS | D | |
| 76418 | CROMOBENE NOSNÍ SPRAY | | spr nas 1x15ml | | MCK | D | |
| 97615 | CROMOHEXAL | | nas spr sol 1x15ml | | SFS | D | |
| 234.3 | R01AC02 | levokabastin | lok. | 0.60 | MG | 10.80 | |
| 234.4 | R01AC03 | azelastin | lok. | 0.56 | MG | 10.80 | |
| 234.5 | R01AD01 | beclomethason dipropionát | lok. | 0.40 | MG | 4.09 | |
| 66006 | BECLOMET NASAL AQUA | | nas sprsus23ml/200d | | OKU | SF | |
| 234.6 | R01AD04 | flunisolid | lok. | 0.15 | MG | 6.10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 234.7 | R01AD05 | budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetně | lok. | 0.30 | MG | 6.10 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

55427 TAFEN NASAL 50 MCG nas spr sus 200dÁv LEK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 234.8 | R01AD05 | budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávce | lok. | 0.30 | MG | 5.50 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 234.9 | R01AD08 | flutikason – léková forma nosní kapky | lok. | 0.20 | MG | 6.10 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 234.10 | R01AD08 | flutikason – léková forma vodní nosní sprej | lok. | 0.20 | MG | 6.10 | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|---------------|
| 234.11 | R01AD09 | momethason | lok. | 200.00 | RG | 10.00 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|------------|------|--------|----|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------|------|--------|----|------|---------------|
| 234.12 | R01AD11 | triamcinolon acetonid | lok. | 220.00 | RG | 7.20 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|-----------------------|------|--------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|------|--------|----|------|---------------|
| 234.13 | R01AX03 | ipratropium bromid | lok. | 240.00 | RG | 8.20 | L/ALG,TRN,ORL |
|--------|---------|--------------------|------|--------|----|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 235 | inhaláční sympathomimetika včetně kombinací | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 235.1 | R03AC02 | bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované) | inhal. | 0.80 | MG | 7.23 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 235.2 | R03AC02 | bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 | MG | 3.37 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 235.3 | R03AC02 | freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované) | inhal. | 0.80 | MG | 7.23 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 235.4 | R03AC02 | freonový salbutamol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 | MG | 3.37 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|--------|--------|------|----|------|
| 235.5 | R03AC02 | salbutamol (lékové formy k inhalaci) | prášku | inhal. | 0.80 | MG | 7.23 |
|-------|---------|--------------------------------------|--------|--------|------|----|------|

83047 VENTODISKS 400 inhplvdos15x8dÁvek GWE F

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|--------|-------|----|-------|--|
| 235.6 | R03AC02 | salbutamol (lékové formy roztoku) | inhal. | 10.00 | MG | 12.86 | |
|-------|---------|-----------------------------------|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|--------|------|----|------|--|
| 235.7 | R03AC03 | terbutalin (lékové formy aerosolu) | inhal. | 2.00 | MG | 3.52 | |
|-------|---------|------------------------------------|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 235.8 | R03AC03 | terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 2.00 | MG | 7.23 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|----------|--------|------|----|------|
| 235.9 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy bezfreonové) | aerosolu | inhal. | 0.60 | MG | 3.86 |
|-------|---------|--------------------------------------|----------|--------|------|----|------|

64881 BEROTEC N 100 MCG inh sol pss 200dÁv BGP D

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|--------|------|----|------|--|
| 235.10 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.60 | MG | 2.74 | |
|--------|---------|-----------------------------------|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 235.11 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 0.60 | MG | 7.23 | |
|--------|---------|--|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|--------|------|----|-------|--|
| 235.12 | R03AC04 | fenoterol (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | MG | 24.64 | |
|--------|---------|----------------------------------|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|--------|------|----|------|--|
| 235.13 | R03AC06 | hexoprenalin (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.50 | MG | 2.74 | |
|--------|---------|--------------------------------------|--------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|--------|------|----|-------|---|
| 235.14 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.10 | MG | 20.63 | P |
|--------|---------|------------------------------------|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|-------|----|-------|---|
| 235.15 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.10 | MG | 25.85 | P |
| 235.16 | R03AC12 | salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávce | inhal. | 0.10 | MG | 23.60 | P |
| 235.17 | R03AC13 | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 24.00 | RG | 25.85 | P |
| 235.18 | R03AC13 | formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávce | inhal. | 24.00 | RG | 23.60 | P |

15708 FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG inh cps 60x12rg+apl MCK D

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------------------|--------|-------|----|-------|---|
| 235.19 | R03AC13 | formoterol (lékové formy aerosolu) | inhal. | 24.00 | RG | 20.63 | P |
|--------|---------|------------------------------------|--------|-------|----|-------|---|

Léčbu inhalacním salmeterolem a formoterolem předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalacního kortikosteroidu ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Léčbu inhalacním salmeterolem a formoterolem předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od středního stadia (stadium II) u symptomatických nemocných léčených inhalacními bronchodilatanciemi s krátkodobým účinkem a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|-----------|
| 235.20 | R03AK03 | bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 6.00 | DF | 6.30 | |
| 235.21 | R03AK03 | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 3.00 | DF | 13.65 | |
| 235.22 | R03AK03 | fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | ML | 21.66 | |
| 235.23 | R03AK03 | fenoterol kombinace s kromoglykátem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.00 | DF | 1.31 | L/ALG,TRN |
| 235.24 | R03AK03 | freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu) | inhal. | 6.00 | DF | 5.07 | |
| 235.25 | R03AK04 | salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia | inhal. | 6.00 | DF | 7.70 | L/ALG,TRN |
| 235.26 | R03AK04 | salbutamol v kombinaci s kromoglykátem | inhal. | 8.00 | DF | 12.32 | L/ALG,TRN |
| 235.27 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100 | inhal. | 2.00 | DF | 29.96 | P |
| 235.28 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250 | inhal. | 2.00 | DF | 40.82 | P |
| 235.29 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500 | inhal. | 2.00 | DF | 58.04 | P |

Léčbu inhalacní fixní kombinací (salmeterol/flutikason) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale (jako lék 2. volby), od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalacního kortikosteroidu a dobré spolupráci pacienta.

Léčbu inhalacní fixní kombinací (salmeterol/flutikason v dávce 50/500µg) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinaci do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.30 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu, 25/50) | inhal. | 4.00 | DF | 29.47 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.31 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/125 | inhal. | 4.00 | DF | 30.40 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.32 | R03AK06 | salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/250 | inhal. | 4.00 | DF | 40.16 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

Léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol a flutikason předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3), tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu a při dobré spolupráci pacienta.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.33 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6 | inhal. | 2.00 | DF | 20.47 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|
| 235.34 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6 | inhal. | 2.00 | DF | 26.45 | P |
|--------|---------|---|--------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|
| 235.35 | R03AK07 | formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12 | inhal. | 2.00 | DF | 47.40 | P |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|---|

Léčbu inhalační fixní kombinací (budesonid/formoterol) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidu a dobré spolupráci pacienta.

Léčbu inhalační fixní kombinací (budesonid/formoterol) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 236 | inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 236.1 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) bezfreonové) do 50 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 12.70 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

47374 ECOBEC 50 MCG inh sol pss 200d Áv IXP CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 236.2 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 5.07 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

47743 CLENIL SPRAY 250 MCG inh sol pss 1x50mg CHS I

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 236.3 | R03BA01 | beklomethason (aplikáční forma aerosolu) bezfreonové JET) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 8.90 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

236.4 R03BA01 beklomethason (lékové formy aerosolu)
bezfreonové) nad 50 rg do 100 rg včetně v jedné dávce

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 236.4 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) bezfreonové) nad 50 rg do 100 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 6.22 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|------|--|

47742 CLENIL SPRAY 100 MCG inh sol pss 1x20mg CHS I

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 236.5 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) freonové) do 100 rg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 6.35 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

236.6 R03BA01 beklomethason (lékové formy aerosolu)
freonové) nad 100 rg v jedné dávce

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|
| 236.6 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) freonové) nad 100 rg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 5.20 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|------|--|

236.7 R03BA01 beklomethason (lékové formy aerosolu)
vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 236.7 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 21.44 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--------|------|----|-------|---------------|
| 236.8 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem aktivované bezfreonové do 200 µg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 20.32 | |
| 236.9 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem aktivované bezfreonové nad 200 µg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 16.48 | |
| 236.10 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem aktivované freonové do 200 µg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 11.96 | |
| 236.11 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem aktivované freonové do 200 µg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 12.64 | |
| 236.12 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem aktivované freonové nad 200 µg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky | inhal. | 0.80 | MG | 9.68 | |
| 236.13 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem bezfreonové aktivované nad 200 µg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 17.44 | |
| 236.14 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy aerosolu) vdechem freonové aktivované nad 200 µg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník | inhal. | 0.80 | MG | 10.24 | |
| 236.15 | R03BA02 | budesonid (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.80 | MG | 10.50 | |
| 236.16 | R03BA02 | budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml | inhal. | 0.80 | MG | 20.77 | |
| 236.17 | R03BA02 | budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml. | inhal. | 0.80 | MG | 16.81 | |
| 236.18 | R03BA03 | flunisolid (lékové formy aerosolu) | inhal. | 1.00 | MG | 10.50 | |
| 236.19 | R03BA05 | flutikason (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.60 | MG | 10.50 | |
| 236.20 | R03BA08 | ciclesonid | inhal. | 160 | RG | 10.80 | |
| 236.21 | R03BB01 | bromid ipratropia (bezfreonové lékové formy) | inhal. | 0.12 | MG | 5.40 | |
| 236.22 | R03BB01 | bromid ipratropia (lékové formy aerosolu) | inhal. | 0.12 | MG | 4.84 | |
| 236.23 | R03BB01 | bromid ipratropia (lékové formy roztoku) | inhal. | 4.00 | ML | 33.34 | L/ALG,TRN,ORL |
| 237 | inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, ostatní lékové formy | | | | | | |
| 237.1 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 20.77 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.2 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 14.40 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.3 | R03BA01 | beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce | inhal. | 0.80 | MG | 17.60 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.4 | R03BA02 | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně) | inhal. | 0.80 | MG | 20.77 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.5 | R03BA02 | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně) | inhal. | 0.80 | MG | 17.60 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

17706 PULMAX 200 MCG inh plv 100x200rg NWI IRL
 17707 PULMAX 200 MCG inh plv 200x200rg NWI IRL

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.6 | R03BA02 | budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce) | inhal. | 0.80 | MG | 14.40 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

17709 PULMAX 400 MCG inh plv 100x400rg NWI IRL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.7 | R03BA03 | flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 1.00 | MG | 20.77 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.8 | R03BA05 | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce) | inhal. | 0.60 | MG | 30.00 | |
|-------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|
| 237.9 | R03BA05 | flutikason (lék. formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce) | inhal. | 0.60 | MG | 26.75 | |
|-------|---------|---|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|--|
| 237.10 | R03BA05 | flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce) | inhal. | 0.60 | MG | 22.30 | |
|--------|---------|--|--------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|--------|------|----|------|--|
| 237.11 | R03BB01 | bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 0.12 | MG | 2.21 | |
|--------|---------|--|--------|------|----|------|--|

75847 ATROVENT INHALETTEN cps inh 100x0.2mg BGP D

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|--------|-------|----|-------|---|
| 237.12 | R03BB04 | tiotropium | inhal. | 18.00 | RG | 50.00 | P |
|--------|---------|------------|--------|-------|----|-------|---|

Léčbu tiotropiem předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN stadia II., III. a IV. (podle dřívější verze GOLD stadium IIb a III), kteří dodržují léčebný režim včetně zákazu kouření.

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 238 | ostatní inhalační antiastmatika | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|
| 238.1 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu vdechem aktivované) | inhal. | 40.00 | MG | 21.65 | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------|-------|----|-------|--|
| 238.2 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu) | inhal. | 40.00 | MG | 17.50 | |
|-------|---------|---|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|
| 238.3 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci) | inhal. | 80.00 | MG | 21.65 | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|--|
| 238.4 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflaci) | lok. | 40.00 | MG | 19.11 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|
| 238.5 | R03BC01 | natrium kromoglykát (lékové formy roztoku) | inhal. | 80.00 | MG | 13.49 | |
|-------|---------|--|--------|-------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|--------|------|----|-------|-----------|
| 238.6 | R03BC03 | nedokromil | inhal. | 8.00 | MG | 25.14 | L/ALG,TRN |
|-------|---------|------------|--------|------|----|-------|-----------|

56242 TILADE MINT aer 2x(112x2mg/dÁv) FPR GB

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|-------|-----|-------|---|
| 239 | antiastmatika, perorální podání | | | | | | |
| 239.1 | R03CA02 | efedrin | p.o. | 50.00 | MG | 1.42 | |
| 239.2 | R03CB03 | orciprenalin | p.o. | 60.00 | MG | 6.55 | |
| 239.3 | R03CC02 | salbutamol (pevné lékové formy) | p.o. | 12.00 | MG | 6.19 | |
| 91085 | SALBUTAMOL WZF POLFA 4 MG | | por tbl nob 30x4mg | WZF | PL | | |
| 239.4 | R03CC02 | salbutamol (tekuté lékové formy) | p.o. | 12.00 | MG | 13.10 | |
| 239.5 | R03CC03 | terbutalin | p.o. | 15.00 | MG | 6.19 | |
| 239.6 | R03CC05 | hexoprenalin | p.o. | 1.50 | MG | 6.19 | |
| 239.7 | R03CC08 | prokaterol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.10 | MG | 6.15 | |
| 94493 | LONTERMIN | | tbl 20x0.05mg | LEK | SLO | | |
| 239.8 | R03CC08 | prokaterol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.10 | MG | 15.45 | |
| 239.9 | R03CC13 | klenbuterol (pevné lékové formy) | p.o. | 0.04 | MG | 6.36 | |
| 239.10 | R03CC13 | klenbuterol (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.04 | MG | 21.26 | |
| 240 | antiastmatika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 240.1 | R03CA02 | efedrin | parent. | 50.00 | MG | 5.27 | O |
| 00447 | EPHEDRIN BIOTIKA | | inj 10x1ml/50mg | HBS | SK | | |
| 240.2 | R03CB03 | orciprenalin | parent. | 0.50 | MG | 7.28 | O |
| 240.3 | R03CC03 | terbutalin | parent. | 0.50 | MG | 19.84 | O |
| 240.4 | R03CC05 | hexoprenalin | parent. | 5.00 | RG | 19.84 | O |
| 241 | ostatní antiastmatika, perorální podání | | | | | | |
| 241.1 | R03DA04 | teofyllin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě) | p.o. | 0.40 | GM | 4.36 | |
| 76650 | AFONILUM SR 250 MG | | por cps pro50x250mg | AAW | D | | |
| 241.2 | R03DA04 | teofyllin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě) | p.o. | 0.40 | GM | 4.04 | |
| 241.3 | R03DA04 | teofyllin (retardované lékové formy první skupiny) | p.o. | 0.40 | GM | 2.38 | |
| 98064 | SPOPHYLLIN RETARD 250MG | | tbl ret 50x250mg | ZEH | SK | | |
| 241.4 | R03DA05 | aminofyllin | p.o. | 0.60 | GM | 4.40 | |
| 241.5 | R03DA05 | aminofyllin (retardované lékové formy do 150 mg včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 9.92 | |
| 241.6 | R03DA05 | aminofyllin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně) | p.o. | 0.60 | GM | 4.79 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|---|
| 241.7 | R03DA05 | aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg) | p.o. | 0.60 | GM | 4.73 | |
| 241.8 | R03DC01 | zafirlukast | p.o. | 40 | MG | 41.50 | P |
| 241.9 | R03DC03 | montelukast | p.o. | 1.00 | DF | 45.00 | P |

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalacními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prolouženým účinkem, teofylinem s prolouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripcí antileukotrienu indikována.

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- a) nové diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátežovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy,
b) námahou indukované astma,
c) aspirinové astma,
d) astma s prokázanou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další preskripcí montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedené specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:

- a) nové diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátežovými příznaky dosud neléčené inhalaciemi kortikosteroidy,
b) námahou indukované astma,
c) aspirinové astma.

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další preskripce montelukastem indikována.

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------|------|-----|-------|---|
| 242 | ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 242.1 | R03DA05 | aminofylin | p.rect. | 0.60 | GM | 6.35 | |
| 242.2 | R03DA05 | aminofylin | parent. | 0.60 | GM | 29.23 | O |
| 93129 | AMINOPHYLLINUM LEK | | inj 10x10ml/250mg | | LEK | SLO | |
| 96371 | AMINOPHYLLINUM LEK | | inj 50x10ml/250mg | | LEK | SLO | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------|-------|----|------|--|
| 243 | Expektorancia kromě kombinací, perorální podání | | | | | | |
| 243.1 | R05CB01 | acetylcystein | p.o. | 0.50 | GM | 2.25 | |
| 243.2 | R05CB02 | bromhexin | p.o. | 24.00 | MG | 2.08 | |
| 243.3 | R05CB03 | karbocystein | p.o. | 1.50 | GM | 3.60 | |
| 243.4 | R05CB06 | ambroxol | p.o. | 0.15 | GM | 4.50 | |

43950 AMBROXOL AL 30 tbl 20x30mg APA D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|
| 243.5 | R05CB15 | lerdostein | p.o. | 600.00 | MG | 3.12 | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------|------|----|-------|--|
| 244 | Expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace | | | | | | |
| 244.1 | R05CB01 | acetylcystein | inhal. | 1.60 | GM | 12.07 | |
| 244.2 | R05CB01 | acetylcystein | parent. | 0.50 | GM | 16.76 | |

88941 ACC INJEKT

injsol100x3ml/300mg

HEX D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 244.3 | R05CB02 | bromhexin | inhal. | 24.00 | MG | 3.47 | |
| 244.4 | R05CB02 | bromhexin | parent. | 24.00 | MG | 40.37 | |
| 244.5 | R05CB06 | ambroxol | parent. | 0.15 | GM | 226.02 | |
| 244.6 | R05CB06 | ambroxol (koncentrat k infuzi) | parent. | 1.00 | DF | 336.70 | H |
| 244.7 | R05CB13 | alfadornáza | inhal. | 2.50 | MG | 983.85 | P |

Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
- b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|--------|----|------|--|
| 244.8 | R05CB15 | erdostein | inhal. | 450.00 | MG | 8.31 | |
|-------|---------|-----------|--------|--------|----|------|--|

245 antitusika ze skupiny derivátů opioidů

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 245.1 | R05DA01 | ethylmorphin do 15 mg včetně | p.o. | 50.00 | MG | 6.02 | |
|-------|---------|------------------------------|------|-------|----|------|--|

44590 DIOLAN 15MG tbl 10x15mg(blistr) ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|------|-------|----|------|--|
| 245.2 | R05DA01 | ethylmorphin nad 15 mg | p.o. | 50.00 | MG | 5.36 | |
|-------|---------|------------------------|------|-------|----|------|--|

44589 DIOLAN 30MG tbl 10x30mg(blistr) ZEH SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|------|------|----|-------|--|
| 245.3 | R05DA04 | kodein | p.o. | 0.10 | GM | 12.69 | |
|-------|---------|--------|------|------|----|-------|--|

56993 CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG tbl 10x30mg-blistr ZEH SK

246 ostatní antitusika

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|--|
| 246.1 | R05DA08 | folkodin | p.o. | 50.00 | MG | 3.67 | |
|-------|---------|----------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|-------|----|------|--|
| 246.2 | R05DA09 | dextromethorphan | p.o. | 90.00 | MG | 3.67 | |
|-------|---------|------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|
| 246.3 | R05DA20 | kombinace antitusik | p.o. | 3.00 | DF | 3.67 | |
|-------|---------|---------------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|
| 246.4 | R05DB03 | klobutinol | p.o. | 120.00 | MG | 6.50 | |
|-------|---------|------------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--------|----|--------|---|
| 246.5 | R05DB03 | klobutinol | parent. | 120.00 | MG | 112.03 | H |
|-------|---------|------------|---------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|--------|-------|
| 246.6 | R05DB05 | pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípkup včetně) | p.rect. | 100.00 | MG | 139.11 | L/PED |
|-------|---------|--|---------|--------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|-------|
| 246.7 | R05DB05 | pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípkup) | p.rect. | 100.00 | MG | 63.40 | L/PED |
|-------|---------|---|---------|--------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 246.8 | R05DB13 | butamirát (pevné lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 1.04 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|-------|--|
| 246.9 | R05DB13 | butamirát (tekuté lékové formy-kapky) | p.o. | 25.00 | MG | 11.70 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|-------|--|

14725 TUSSIN por gtt sol 1x25ml IXP CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 246.10 | R05DB13 | butamirát (tekuté lékové formy-sirup) | p.o. | 25.00 | MG | 3.83 | |
|--------|---------|---------------------------------------|------|-------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|------|--------|----|------|--|
| 246.11 | R05DB18 | prednoxiazin | p.o. | 300.00 | MG | 1.96 | |
|--------|---------|--------------|------|--------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|--------|----|-------|--|
| 246.12 | R05DB19 | dropropizin | p.o. | 25.00 | MG | 0.88 | |
| 246.13 | R05DB27 | levodropropizin (tekuté lékové formy kapky) | p.o. | 120.00 | MG | 4.13 | |
| 246.14 | R05DB27 | levodropropizin (tekuté lékové formy sirup) | p.o. | 120.00 | MG | 4.60 | |
| 246.15 | R05FB02 | butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 10.56 | |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 247 | nesedativní antihistaminika |
|-----|------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|------|-------|----|------|--|
| 247.1 | R06AA07 | difenylpyralin | p.o. | 10.00 | MG | 7.72 | |
| 247.2 | R06AE06 | oxatomid | p.o. | 60.00 | MG | 5.50 | |
| 247.3 | R06AE07 | cetirizin | p.o. | 10.00 | MG | 5.50 | |

02927 LETIZEN por tbl flm 50x10mg KRK SLO
 99600 ZODAC por tbl flm 90x10mg ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 247.4 | R06AE09 | levocetirizin | p.o. | 5.00 | MG | 5.50 | |
| 247.5 | R06AX13 | loratadin | p.o. | 10.00 | MG | 5.50 | |
| 247.6 | R06AX27 | desloratadin | p.o. | 5.00 | MG | 5.50 | |

| | |
|-----|---|
| 248 | sedativní antihistaminika pro perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|------|-------|----|------|--|
| 248.1 | R06AA | embramin | p.o. | 50.00 | MG | 1.32 | |
| 248.2 | R06AA02 | difenhydramin (pevné lékové formy) | p.o. | 0.20 | GM | 8.36 | |
| 247.3 | R06AA02 | difenhydramin (tekuté lékové formy) | p.o. | 0.20 | GM | 8.54 | |
| 248.4 | R06AA04 | klemastin | p.o. | 2.00 | MG | 6.56 | |
| 248.5 | R06AB03 | dimetinden (pevné lékové formy) | p.o. | 4.00 | MG | 5.50 | |
| 248.6 | R06AB03 | dimetinden (tekuté lékové formy) | p.o. | 4.00 | MG | 8.54 | |
| 248.7 | R06AB56 | dexbromfeniramin, kombinace | p.o. | 2.00 | DF | 8.50 | |
| 248.8 | R06AD02 | prometazin (pevné lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 4.04 | |
| 248.9 | R06AD02 | prometazin (tekuté lékové formy) | p.o. | 25.00 | MG | 8.54 | |
| 248.10 | R06AD03 | thiethylperazin | p.o. | 13.00 | MG | 3.31 | |
| 248.11 | R06AK | kombinace antihistaminik | p.o. | 2.00 | DF | 1.08 | |
| 248.12 | R06AX | bisulepin | p.o. | 4.00 | MG | 4.37 | |

02479 DITHIADEN tbl 20x2mg ZEH CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|------|-------|----|------|--|
| 248.13 | R06AX01 | bamipin | p.o. | 0.10 | GM | 5.50 | |
| 248.14 | R06AX02 | cyproheptadin | p.o. | 12.00 | MG | 5.50 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|--------|----|------|--|
| 248.15 | R06AX09 | azatadin | p.o. | 2.00 | MG | 5.50 | |
| 248.16 | R06AX11 | astemizol | p.o. | 10.00 | MG | 5.50 | |
| 248.17 | R06AX12 | terfenadin | p.o. | 0.12 | GM | 5.50 | |
| 248.18 | R06AX17 | ketotifén | p.o. | 2.00 | MG | 5.50 | |
| 248.19 | R06AX18 | akrivastin | p.o. | 24.00 | MG | 5.50 | |
| 248.20 | R06AX25 | mizolastin | p.o. | 10.00 | MG | 5.50 | |
| 248.21 | R06AX26 | fexofenadin | p.o. | 120.00 | MG | 5.50 | |

| | |
|-----|---|
| 249 | antihistaminika, ostatní cesty aplikace |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|---|
| 249.1 | R06AA04 | klemastin | parent. | 2.00 | MG | 32.44 | O |
| 249.2 | R06AD02 | prometazin | parent. | 25.00 | MG | 7.48 | O |
| 249.3 | R06AD03 | thiethylperazin | p.rect. | 13.00 | MG | 21.65 | |

09847 TORECAN sup 6x6.5mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|---|
| 249.4 | R06AD03 | thiethylperazin | parent. | 13.00 | MG | 27.52 | O |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|-------|---|

91836 TORECAN inj 5x1ml/6.5mg KRK SLO

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|---------|------|----|-------|---|
| 249.5 | R06AX | bisulepin | parent. | 4.00 | MG | 26.28 | O |
| 249.6 | R06AX | medosulepin/vápník | parent. | 2.00 | DF | 30.79 | O |

| | |
|-----|--|
| 250 | ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|--------|----|-------|--|
| 250.1 | R05CA03 | guaiifenesin | parent. | 0.90 | GM | 16.57 | |
| 250.2 | R05CB05 | mesna | inhal. | 600.00 | MG | 38.39 | |

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|--------|----|-----------|---|
| 250.3 | R07AA01 | kolfosceril palmitát | parent. | 160.00 | MG | 15 458.00 | T |
| 250.4 | R07AA02 | přirozené fosfolipidy (zvířecího původu) | parent. | 160.00 | MG | 15 458.00 | T |
| 250.5 | R07AA30 | beraktant | parent. | 160.00 | MG | 15 458.00 | T |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 251 | Oftalmologika – antibiotika |
|-----|-----------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 251.1 | S01AA | neomycin/polymyxin/fenylefrin | lok. | 1.00 | ML | 19.55 | L/OPH |
| 251.2 | S01AA01 | chloramfenikol (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 2.79 | |
| 251.3 | S01AA01 | chloramfenikol (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 4.64 | |
| 251.4 | S01AA11 | gentamicin | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.5 | S01AA12 | tobramycin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 251.6 | S01AA12 | tobramycin (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 3.21 | |
| 251.7 | S01AA13 | acidum fusidicum | lok. | 1.00 | ML | 6.42 | |
| 251.8 | S01AA24 | kanamycin | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.9 | S01AA25 | azidamfenikol | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 251.10 | S01AA30 | neomycin/bacitracin | lok. | 1.00 | GM | 6.27 | |

01076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 1x5gm ZEH CZ

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 251.11 | S01AA30 | neomycin/polymyxin | lok. | 1.00 | ML | 19.55 | L/OPH |
| 251.12 | S01AX11 | ofloxacin | lok. | 1.00 | ML | 14.40 | L/OPH |
| 251.13 | S01AX13 | ciprofloxacin | lok. | 1.00 | ML | 14.40 | L/OPH |
| 251.14 | S01AX17 | lomefloxacin k lokálnímu podání | lok. | 1.00 | ML | 14.40 | L/OPH |

252 Oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 252.1 | S01AB | sulfathiazol | lok. | 1.00 | GM | 3.42 | |
| 252.2 | S01AB04 | sulfacetamid | lok. | 1.00 | ML | 6.70 | |

93577 SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMA gtt oph 12x0.5ml ZPF PL

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|------|--|
| 252.3 | S01AX | jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 2.62 | |
| 252.4 | S01AX | jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 4.46 | |

253 Oftalmologika – antivirotyka

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 253.1 | S01AD02 | trifluorothimidin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 53.23 | L/OPH |
| 253.2 | S01AD02 | trifluorothimidin (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 73.91 | L/OPH |
| 253.3 | S01AD03 | aciclovir | lok. | 1.00 | GM | 86.43 | L/OPH |

15375 ZOVIRAX oph ung 1x4.5gm GWB GB

254 Oftalmologika – kortikosteroidy

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 254.1 | S01BA01 | dexamethason (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 3.47 | |
| 254.2 | S01BA01 | dexamethason (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 3.62 | |
| 254.3 | S01BA02 | hydrokortison | lok. | 1.00 | GM | 6.04 | |
| 254.4 | S01BA03 | kortison | lok. | 1.00 | ML | 19.57 | L/OPH |

00757 CORTISON SPOFA gtt 1x3ml/15mg SPX CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 254.5 | S01BA04 | prednizolon (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 254.6 | S01BA04 | prednizolon (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 17.00 | L/OPH |
| 254.7 | S01BA07 | fluorometholon | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |

56868 FLUMETOL S gttoph1x10ml/0.02gm FTF I

| | |
|-----|---|
| 255 | Oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|-------|
| 255.1 | S01BC01 | indometacin | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | |
| 255.2 | S01BC02 | oxyfenbutazon | lok. | 1.00 | GM | 14.66 | |
| 255.3 | S01BC03 | diklofenak | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |

58230 UNICLOPHEN UNIMED PHARMA gtt oph 1x10ml 0.1% UPA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|
| 255.4 | S01BC04 | flurbiprofen | lok. | 1.00 | ML | 17.00 | L/OPH |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-------|

| | |
|-----|---|
| 256 | oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 256.1 | S01AA20 | antibiotika v kombinaci s jinými léčivy | lok. | 1.00 | ML | 3.21 | |
| 256.2 | S01AA20 | neomycin/bacitracin/hydrokortison | lok. | 1.00 | GM | 6.92 | |

01077 OPHTHALMO-FRAMYKON COMP. ung oph 1x5gm ZEH CZ

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 256.3 | S01CA | chloramfenikol/dexamethason | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH |
| 256.4 | S01CA01 | dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
| 256.5 | S01CA01 | dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH |

02547 MAXITROL ung oph 1x3.5gm ACU B

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-----------|
| 256.6 | S01CA01 | dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
| 256.7 | S01CA01 | oxytetracyklin/dexamethason | lok. | 1.00 | GM | 17.60 | L/OPH |
| 256.8 | S01CA02 | prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
| 256.9 | S01CA02 | prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH |
| 256.10 | S01CA05 | betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH |
| 256.11 | S01CA05 | betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH |
| 256.12 | S01CA05 | gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 12.00 | L/OPH,ORL |
| 256.13 | S01CA05 | gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 15.40 | L/OPH,ORL |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.14 | S01CA07 | fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 19.55 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 256.15 | S01CA07 | fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí) | lok. | 1.00 | GM | 24.44 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 257 | antiglaukomatika ze skupiny sympathomimetik a parasympathomimetik | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 257.1 | S01EA01 | epinefrin | lok. | 1.00 | ML | 26.65 | L/OPH |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 257.2 | S01EA02 | dipivefrin | lok. | 1.00 | ML | 26.65 | L/OPH |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|
| 257.3 | S01EA04 | klonidin | lok. | 1.00 | ML | 10.70 | L/OPH |
|-------|---------|----------|------|------|----|-------|-------|

13725 ARUCLONIN 1/8% gttoph1x10ml/12.5mg MNN D

13726 ARUCLONIN 1/16% gttoph1x10ml/6.25mg MNN D

49501 ARUCLONIN 1/16% gttoph1x10ml/6.25mg CHV D

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|
| 257.4 | S01EA05 | brimonidin | lok. | 1.00 | ML | 59.80 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|-------|---|

Léčbu brimonidinem předepisuje oční lékař u pacientů s glaukem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 257.5 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy gelu) | lok. | 1.00 | GM | 29.00 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 257.6 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 5.50 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 257.7 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%) | lok. | 1.00 | ML | 6.17 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

04146 PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKY gtt oph1x10ml/200mg CHV D

13401 PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKY oph gtt sol 1x10ml CUA D

13402 PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKY oph gtt sol 3x10ml CUA D

57337 PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKY gtt oph3x10ml/200mg CHV D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|
| 257.8 | S01EB01 | pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 9.70 | |
|-------|---------|--|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-------|
| 257.9 | S01EB02 | karbachol (koncentrace do 1% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 8.50 | L/OPH |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|------|------|----|------|-------|
| 257.10 | S01EB02 | karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 6.06 | L/OPH |
|--------|---------|---|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|-------|
| 257.11 | S01EB02 | karbachol (koncentrace nad 1,5%) | lok. | 1.00 | ML | 6.60 | L/OPH |
|--------|---------|----------------------------------|------|------|----|------|-------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|
| 257.12 | S01EB06 | neostigmin | lok. | 1.00 | ML | 13.88 | L/OPH |
|--------|---------|------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 258 | antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 258.1 | S01ED01 | timolol (koncentrace do 0,25% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 12.80 | |
|-------|---------|---------------------------------------|------|------|----|-------|--|

01760 TIMOLOL-POS 0.25% gtt oph 3x5ml URS D

03478 ARUTIMOL 0.25% oph gtt sol 1x5ml CUA D

03479 ARUTIMOL 0.25% oph gtt sol 3x5ml CUA D

12729 TIMOHEXAL 0.1% gtt oph 1x5ml/5mg HEX D

12730 TIMOHEXAL 0.25% gtt oph1x5ml/12.5mg HEX D

12732 TIMOHEXAL 0.1% gtt oph 3x5ml/5mg HEX D

12733 TIMOHEXAL 0.25% gtt oph3x5ml/12.5mg HEX D

| | | | | |
|-------|-------------------|---------------------|-----|----|
| 14562 | TIMOHEXAL 0.1% | oph gtt sol 1x5ml | SFS | D |
| 14563 | TIMOHEXAL 0.1% | oph gtt sol 3x5ml | SFS | D |
| 14564 | TIMOHEXAL 0.25% | oph gtt sol 1x5ml | SFS | D |
| 14565 | TIMOHEXAL 0.25% | oph gtt sol 3x5ml | SFS | D |
| 44546 | TIMO-COMOD 0.25% | gtt oph 1x10ml/25mg | URS | D |
| 70474 | ARUTIMOL 0.25% | oph gtt sol 3x5ml | CHV | D |
| 76186 | ARUTIMOL 0.25% | oph gtt sol 1x5ml | CHV | D |
| 87113 | TIMOLOL-POS 0.25% | gtt oph 1x5ml | URS | D |
| 96021 | OFTENSIN 0.25% | gtt oph 1x5ml | ZPF | PL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|
| 258.2 | S01ED01 | timolol (koncentrace nad 0,25%) | lok. | 1.00 | ML | 14.49 | |
|-------|---------|---------------------------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|----|
| 01759 | TIMOLOL-POS 0.5% | gtt oph 3x5ml | URS | D |
| 12731 | TIMOHEXAL 0.5% | gtt oph 1x5ml/25mg | HEX | D |
| 12734 | TIMOHEXAL 0.5% | gtt oph 3x5ml/25mg | HEX | D |
| 14566 | TIMOHEXAL 0.5% | oph gtt sol 1x5ml | SFS | D |
| 14567 | TIMOHEXAL 0.5% | oph gtt sol 3x5ml | SFS | D |
| 14579 | UNI TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA | oph gtt sol 1x10ml | UPA | SK |
| 19599 | UNI TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA | oph gtt sol 1x5ml | UPA | SK |
| 21450 | UNI TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA | oph gtt sol 3x5ml | UPA | SK |
| 32553 | ARUTIMOL 0.50% | oph gtt sol 1x5ml | CUA | D |
| 32556 | ARUTIMOL 0.50% | oph gtt sol 3x5ml | CUA | D |
| 44547 | TIMO-COMOD 0.5% | gtt oph 1x10ml/50mg | URS | D |
| 70475 | ARUTIMOL 0.50% | oph gtt sol 3x5ml | CHV | D |
| 76187 | ARUTIMOL 0.50% | oph gtt sol 1x5ml | CHV | D |
| 87114 | TIMOLOL-POS 0.5% | gtt oph 1x5ml | URS | D |
| 96019 | OFTENSIN 0.5% | gtt oph 1x5ml | ZPF | PL |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 258.3 | S01ED02 | betaxolol | lok. | 1.00 | ML | 20.00 | L/OPH |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-------|
| 258.4 | S01ED03 | levobunolol | lok. | 1.00 | ML | 20.00 | L/OPH |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|
| 258.5 | S01ED04 | metipranolol | lok. | 1.00 | ML | 13.20 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|
| 258.6 | S01ED05 | carteolol | lok. | 1.00 | ML | 20.00 | L/OPH |
|-------|---------|-----------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|---|
| 258.7 | S01ED51 | timolol v kombinaci s dorzolamidem | lok. | 1.00 | ML | 81.46 | P |
|-------|---------|------------------------------------|------|------|----|-------|---|

Dorsolamid/timolol je hrazen u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem, oční hypertenzí, psudoexfoliativním glaukolem nebo ostatními sekundárními glaukomy. Léčba je předepisována očním lékařem v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|--------|---|
| 258.8 | S01ED51 | timolol v kombinaci s latanoprostem | lok. | 1.00 | ML | 220.60 | P |
|-------|---------|-------------------------------------|------|------|----|--------|---|

Latanoprost/timolol v kombinaci předepisuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukolem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí, při neúčinnosti beta-blokátorů a není-li operační výkon indikován.

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 259 | ostatní antiglaukomatika | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 259.1 | S01EB51 | pilokarpin v kombinaci s timolem | lok. | 1.00 | ML | 21.07 | L/OPH |
|-------|---------|----------------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|
| 259.2 | S01EC01 | acetazolamid | p.o. | 0.75 | GM | 6.53 | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|--|-----|----|--|--|
| 00113 | DILURAN | tbl 20x250mg | | ZEH | CZ | | |
|-------|---------|--------------|--|-----|----|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|
| 259.3 | S01EC01 | acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním) | p.o. | 0.75 | GM | 29.33 | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|---|
| 259.4 | S01EC02 | diklofenamid | p.o. | 0.10 | GM | 6.26 | |
| 259.5 | S01EC03 | dorzolamid | lok. | 1.00 | ML | 59.80 | P |

Léčba dorzolamidem je předepisována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|
| 259.6 | S01EC04 | brinzolamid | lok. | 1.00 | ML | 59.80 | P |
|-------|---------|-------------|------|------|----|-------|---|

Léčba brinzolamidem včetně kombinací je předepisována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------|------|----|--------|---|
| 259.7 | S01EE01 | latanoprost | lok. | 1.00 | ML | 184.00 | P |
| 259.8 | S01EE02 | unoproston | lok. | 1.00 | ML | 94.98 | P |
| 259.9 | S01EE03 | bimatoprost | lok. | 1.00 | ML | 153.33 | P |
| 259.10 | S01EE04 | travoprost | lok. | 1.00 | ML | 184.00 | P |

Latanoprost, unoproston, bimatoprost a travoprost předepisuje oční lékař u nemocných, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí vedle beta-blokátorů, alfa agonistů a inhibitorů karboanhydrázy a není-li operační výkon indikován.

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 260 | mydriatika a cykloplegika | |
|-----|---------------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|
| 260.1 | S01FA01 | atropin (koncentrace do 0,5% včetně) | lok. | 1.00 | ML | 4.83 | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|------|----|------|--|

83770 ATROPIN-POS 0.5% oph gtt sol 1x10ml URS D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|--|
| 260.2 | S01FA01 | atropin (koncentrace nad 0,5%) | lok. | 1.00 | ML | 5.46 | |
|-------|---------|--------------------------------|------|------|----|------|--|

83771 ATROPIN-POS 1% oph gtt sol 1x10ml URS D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|-------|
| 260.3 | S01FA04 | cyklopentolát | lok. | 1.00 | ML | 26.34 | O/OPH |
|-------|---------|---------------|------|------|----|-------|-------|

45558 CYCLOGYL 1% gtt oph 1x15ml 1% ACU B

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|-------|
| 260.4 | S01FA06 | tropikamid | lok. | 1.00 | ML | 8.52 | O/OPH |
|-------|---------|------------|------|------|----|------|-------|

21155 MYDRUM oph gtt sol 1x10ml CHV D

57999 MYDRUM oph gtt sol 1x10ml CUA D

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|
| 260.5 | S01FB01 | fenylefrin (koncentrace 10% nebo více) | lok. | 1.00 | ML | 40.33 | O/OPH |
|-------|---------|--|------|------|----|-------|-------|

41338 NEOSYNEPHRIN-POS 10% oph gtt sol 1x10ml URS D

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 261 | dekongescenty a antialergika | |
|-----|------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|-----------|
| 261.1 | S01GA52 | tetryzolin/antihistaminikum | lok. | 1.00 | ML | 4.06 | L/OPH,ALG |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---------------|
| 261.2 | S01GX01 | natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 5.23 | L/OPH,ALG,ORL |
|-------|---------|---|------|------|----|------|---------------|

54241 ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) oph 10ml+nas 15ml URS D

57944 CROMOHEXAL COMBI oph10ml+nas15ml sol SFS D

83651 CROMOHEXAL COMBI oph 10ml+nas 15ml HEX D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|
| 261.3 | S01GX01 | natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek) | lok. | 1.00 | ML | 4.06 | |
|-------|---------|---|------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-----------|
| 261.4 | S01GX02 | levokabastin | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH,ALG |
|-------|---------|--------------|------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|------|------|----|--------|------------|
| 261.5 | S01GX03 | kyselina spaglumová | lok. | 1.00 | ML | 14.66 | L/OPH,ALG |
| 261.6 | S01GX05 | Iodoxamid | lok. | 1.00 | ML | 14.66 | L/OPH,ALG |
| 261.7 | S01GX06 | emedastin | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH, ALG |
| 261.8 | S01GX07 | azelastin | lok. | 1.00 | ML | 17.60 | L/OPH, ALG |
| 261.9 | S01GX08 | ketotifen | lok. | 1.00 | ML | 25.00 | L/OPH, ALG |
| 261.10 | S01GX09 | olopatadin | lok. | 1.00 | ML | 25.00 | L/OPH, ALG |
| 261.11 | S01GX10 | epinastin | lok. | 5.00 | ML | 125.00 | L/OPH, ALG |

262 anestetika lokální a jiná oftalmologika

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|------|------|----|-------|-------|
| 262.1 | S01HA | místní anestetika | lok. | 1.00 | ML | 11.83 | L/OPH |
| 262.2 | S01HA02 | oxybuprokain | lok. | 1.00 | ML | 11.52 | L/OPH |

15514 NOVESIN 0.4% oph gtt sol 1x10ml NAI CZ
 20053 BENOXI 0.4 % UNIMED PHARMA oph gtt sol 1x10ml UPA SK
 66524 NOVESIN 0.4% oph gtt sol 1x10ml NAH CH

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|------|------|----|----------|---|
| 262.3 | S01KA01 | kyselina hyaluronová | lok. | 1.00 | ML | 1 376.58 | Z |
| 262.4 | S01XA | jodid draselný a sodný | lok. | 1.00 | ML | 4.89 | |

56119 JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH oph gtt sol 1x10ml UPA SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 262.5 | S01XA | tolazolin (koncentrace 10%) | lok. | 1.00 | GM | 14.91 | L/OPH |
| 262.6 | S01XA01 | guajazulen | lok. | 1.00 | GM | 3.98 | |
| 262.7 | S01XA02 | retinol | lok. | 1.00 | GM | 2.93 | |
| 262.8 | S01XA04 | jodid draselný | lok. | 1.00 | ML | 4.89 | |

56118 JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA oph gtt sol 1x10ml UPA SK

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|------|------|----|-------|--|
| 262.9 | S01XA11 | nandrolon | lok. | 1.00 | ML | 11.20 | |
| 262.10 | S01XA20 | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky | lok. | 1.00 | ML | 3.03 | |
| 262.11 | S01XA20 | umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu) | lok. | 1.00 | GM | 3.03 | |
| 262.12 | S02DA30 | kombinace fenazon a lidokain | lok. | 1.00 | GM | 3.80 | |

263 ostatní léčiva používaná u nemoci senzorických orgánů

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|------------|
| 263.1 | S02AA11 | polymyxin B | lok. | 1.00 | ML | 2.64 | L/ORL |
| 263.2 | S02BA | kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci | lok. | 1.00 | ML | 22.92 | L/ORL, PED |

84575 OTOBACID N aur gtt sol 1x6gm AWA D

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|
| 263.3 | S02CA03 | hydrokortizon a antiinfektiva v kombinaci | lok. | 1.00 | ML | 27.37 | L/ORL |
|-------|---------|---|------|------|----|-------|-------|

13317 CIPROBAY HC OTIC

sus oto 1x10ml

ALC E

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 264 | terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|
| 264.1 | V01AA | II. generace (IC a IR do 100 j. včetně JSA, JSK, SQ, SU, STU), pro sublng. podání, úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 308.40 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|----------|-------|
| 264.2 | V01AA | II. generace (IC a IR do 300 j. včetně), pro sublng. podání, úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 1 233.04 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|------|----|----------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|
| 264.3 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), udržovací dávka | p.o. | 1.00 | DF | 498.16 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|
| 264.4 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 285.74 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|

47393 H-AL POLLENS PER OS por gttsol6x9ml-jsk SVF CZ
 54545 H-AL POLLENS PER OS por gttsol6x9ml-jsk SVF CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|
| 264.5 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,STU), pro sublng. podání, udržovací dávka | p.o. | 1.00 | DF | 616.52 | L/ALG |
|-------|-------|---|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 265 | terapeutické extrakty alergenů nestandardizované perorální podání | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------|------|------|----|--------|-------|
| 265.1 | V01AA | I. generace (PNU), udržovací dávka | p.o. | 1.00 | DF | 415.47 | L/ALG |
|-------|-------|------------------------------------|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|
| 265.2 | V01AA | I. generace (PNU), úvodní dávka, hmyzí | p.o. | 1.00 | DF | 165.28 | L/ALG |
|-------|-------|--|------|------|----|--------|-------|

47405 H-AL INSECTS PER OS por gttsol6x9ml-pnu SVF CZ V01AA
 47406 H-AL INSECTS PER OS por gttsol6x9ml-pnu SVF CZ V01AA

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|
| 265.3 | V01AA | I. generace (PNU), úvodní dávka | p.o. | 1.00 | DF | 88.46 | L/ALG |
|-------|-------|---------------------------------|------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 266 | terapeutické extrakty alergenů standardizované ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|-------|
| 266.1 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, udržovací dávka | parent. | 1.00 | TDD | 5.96 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|---|
| 266.2 | V01AA | II. generace (SQ), depotní, udržovací dávka – hmyzí alergeny (včela, vosa) | parent. | 1.00 | TDD | 8.14 | P |
|-------|-------|--|---------|------|-----|------|---|

Hmyzí alergeny (včela, vosa) jsou indikovány u pacientů s alergií na hmyzí bodnutí prokázanou přítomností specifických IgE protilátek.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|----------|-------|
| 266.3 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, úvodní dávka | parent. | 1.00 | BA | 1 233.60 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|------|----|----------|-------|

50341 H-AL DEPOT(POLLENS-INIC.LÉČBA) inj sus 300jsk/3ml SVF CZ
 50342 H-AL DEPOT(POLLENS-INIC.LÉČBA) inj sus 1000jsk/1ml SVF CZ
 50343 H-AL DEPOT(POLLENS-INIC.LÉČBA) inj sus10000jsk/1ml SVF CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|----------|---|
| 266.4 | V01AA | II. generace (SQ), depotní, úvodní dávka, hmyzí alergeny (včela, vosa) | parent. | 1.00 | BA | 3 498.00 | P |
|-------|-------|--|---------|------|----|----------|---|

Hmyzí alergeny (včela, vosa) jsou indikovány u pacientů s alergií na hmyzí bodnutí prokázanou přítomností specifických IgE protilátek.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|
| 266.5 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), vodné, udržovací dávka | parent. | 1.00 | DF | 749.06 | L/ALG |
|-------|-------|---|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|------|----|--------|-------|
| 266.6 | V01AA | II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,RG), parent. vodné, úvodní dávka | | 1.00 | DF | 228.70 | L/ALG |
|-------|-------|---|--|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 267 | terapeutické extrakty alergenů nestandardizované ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 267.1 | V01AA | I. generace (PNU), depotní, udržovací dávka | parent. | 1.00 | BA | 265.93 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|
| 267.2 | V01AA | I. generace (PNU), depotní, úvodní dávka | parent. | 1.00 | DF | 38.50 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|

83558 H-AL POLLENS(JAR.SM.CAS.)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ V01AA

83560 H-AL POLLENS(SM.PODZIMNÍ)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ V01AA

83562 H-AL POLLENS(SMĚS TRAV I)DEPOT inj 250pnu-1ml SVF CZ V01AA

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|-------|
| 267.3 | V01AA | I. generace (PNU), vodné, udržovací dávka | parent. | 1.00 | DF | 442.69 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|
| 267.4 | V01AA | I. generace (PNU), vodné, úvodní dávka | parent. | 1.00 | DF | 69.48 | L/ALG |
|-------|-------|--|---------|------|----|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 268 | základní antidota a fágové lyzáty | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|---------|--|--|------|---|
| 268.1 | V03AB | obedoxim | parent. | | | Plně | K |
|-------|-------|----------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|------|---|
| 268.2 | V03AB | trimedoxim + atropin | parent. | | | Plně | K |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|--|------|---|
| 268.3 | V03AB03 | edetáty | parent. | | | Plně | K |
|-------|---------|---------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|--|--|------|---|
| 268.4 | V03AB06 | thiosulfát | parent. | | | Plně | K |
|-------|---------|------------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|---------|--|--|------|---|
| 268.5 | V03AB08 | dusitan sodný | parent. | | | Plně | K |
|-------|---------|---------------|---------|--|--|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|---|
| 268.6 | V03AB14 | protamin | parent. | 1.00 | ML | 6.01 | K |
|-------|---------|----------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|
| 268.7 | V03AB15 | naloxon | parent. | 0.40 | MG | 11.83 | K |
|-------|---------|---------|---------|------|----|-------|---|

94763 NALOXONE WZF POLFA inj 10x1ml/0.4mg WZF PL

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|---------|--------|----|-------|---|
| 268.8 | V03AB16 | ethanol (koncentrace 10%) | parent. | 100.00 | ML | 20.43 | K |
|-------|---------|---------------------------|---------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|
| 268.9 | V03AB19 | fysostigmin | parent. | 1.00 | MG | 10.31 | K |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|---|
| 268.10 | V03AB24 | digitalisový antitoxin | parent. | 80.00 | MG | 32 726.64 | K |
|--------|---------|------------------------|---------|-------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 268.11 | V03AB25 | flumazenil | parent. | 0.50 | MG | 754.48 | K |
|--------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

16551 ANEXATE inj 5x5ml/0.5mg RCE CZ

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 269 | antidota používaná při otravě organofosfáty | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|--|
| 269.1 | A03BA01 | atropin (1 mg a více v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 8.11 | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|------|----|------|--|

00394 ATROPIN BIOTIKA 1MG inj 10x1ml/1mg HBS SK

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|---------|------|----|-------|--|
| 269.2 | A03BA01 | atropin (do 1mg v 1 ampuli) | parent. | 1.50 | MG | 15.15 | |
|-------|---------|-----------------------------|---------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 270 | antidota používaná při otravě některými těžkými kovy | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|
| 270.1 | V03AC01 | deferoxamin | parent. | 1.00 | GM | 386.74 | K |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|-----|----|
| 01445 | DESFERAL | inj plv sol10x500mg | NPA | CH |
| 16470 | DESFERAL | inj plv sol10x500mg | NAI | CZ |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|
| 270.2 | V03AC02 | deferipron | p.o. | 5.25 | GM | 473.76 | P |
|-------|---------|------------|------|------|----|--------|---|

Léčivý přípravek je předepisován u nemocných s laboratorně dokumentovaným přetížením železem při prokázané alergii či intoleranci desferioxaminu nebo u nemocných, u nichž nelze zajistit parenterálním podáváním dostatečnou terapeutickou dávkou chelátoru.

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 271 | antidota používaná při otravě kyanidy |
|-----|---------------------------------------|

| | |
|-----|---|
| 272 | antidota používaná při léčbě cytostatiky perorální podání |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|------|------|----|--------|-----------|
| 272.1 | V03AF01 | mesna | p.o. | 1.20 | GM | 290.85 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-------|------|------|----|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|
| 272.2 | V03AF03 | kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně) | p.o. | 60.00 | MG | 111.91 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|

| | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|-----|---|
| 96963 | CALCIUMFOLINAT EBEWE 15MG | por cps dur 20x15mg | EBP | A |
|-------|---------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|
| 272.3 | V03AF03 | kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě) | p.o. | 60.00 | MG | 115.42 | |
|-------|---------|---|------|-------|----|--------|--|

| | | | | |
|-------|----------------------------|----------------------|-----|---|
| 96964 | CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG | por cps dur 20x100mg | EBP | A |
|-------|----------------------------|----------------------|-----|---|

| | |
|-----|---|
| 273 | antidota používaná při léčbě cytostatiky ostatní cesty aplikace |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|
| 273.1 | V03AF01 | mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.20 | GM | 29.72 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|---|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|
| 273.2 | V03AF01 | mesna (nad 200 mg v jedné ampuli) | parent. | 0.40 | GM | 48.39 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|------|----|-------|-----------|

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|---|
| 05954 | UROMITEXAN 400MG | inj sol15x4ml/400mg | BXH | D |
|-------|------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-----------|
| 273.3 | V03AF02 | dexrazoxan | parent. | 0.50 | GM | 4 329.50 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|------------|---------|------|----|----------|-----------|

| | | | | |
|-------|------------|-----------------|-----|----|
| 96542 | CARDIOXANE | inj sic 1x500mg | CNC | NL |
|-------|------------|-----------------|-----|----|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|-----------|
| 273.4 | V03AF03 | kalcium folinát | parent. | 60.00 | MG | 234.23 | B/ONK,HEM |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|-----------|

| | | | | |
|-------|-----------------|----------------|-----|----|
| 11184 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 1x5ml/50mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|----------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|
| 11185 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 1x10ml/100mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|
| 11186 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 5x10ml/100mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|
| 11187 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 1x20ml/200mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|
| 11188 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 1x30ml/300mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|
| 11189 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 1x35ml/350mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|
| 11190 | LEUCOVORIN-TEVA | inj 1x50ml/500mg | PHM | NL |
|-------|-----------------|------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|----|
| 12441 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 20 | inj sol 10x2ml/20mg | PVL | CZ |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 12442 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 50 | inj sol 5x5ml/50mg | PVL | CZ |
|-------|--------------------------|--------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|---|
| 58033 | CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG | inj sol1x10ml/100mg | EBP | A |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|----|
| 91561 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 25 | inj plv sol 10x25mg | PVL | CZ |
|-------|--------------------------|---------------------|-----|----|

| | | | | |
|-------|---------------------------|--------------------|-----|---|
| 96966 | CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG | inj sol 5x3ml/30mg | EBP | A |
|-------|---------------------------|--------------------|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|
| 273.5 | V03AF05 | amifostin | parent. | 1.70 | GM | 19 500.00 | X |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|-----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|------------|
| 273.6 | V03AF06 | natrium folinát | parent. | 60.00 | MG | 234.23 | B/ONK, HEM |
|-------|---------|-----------------|---------|-------|----|--------|------------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|
| 273.7 | V03AF07 | rasburikaza | parent. | 1.00 | DF | 2 500.00 | H |
|-------|---------|-------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 274 | testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|-------|
| 274.1 | V04CD01 | metyrapon | p.o. | 3.00 | GM | 386.77 | K/END |
|-------|---------|-----------|------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 274.2 | V04CJ02 | protirelin | parent. | 0.20 | MG | 215.75 | O |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|------|----|--------|---|
| 274.3 | V04CH01 | inulin | parent. | 5.00 | GM | 489.33 | O |
|-------|---------|--------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 275 | tuberkulinový test | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|
| 275.1 | V04CF01 | tuberkulin | parent. | 0.60 | RG | 277.44 | H |
|-------|---------|------------|---------|------|----|--------|---|

68918 TUBERCULIN PPD RT 23 SSI inj 10x1.5ml/0.6rg SST DK

68919 TUBERCULIN PPD RT 23 SSI inj 1x5ml/2rg SST DK

68920 TUBERCULIN PPD RT 23 SSI inj 10x5ml/2rg SST DK

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 276 | testy pro alergické choroby | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|
| 276.1 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička) | intrader. | 1.00 | BA | 134.61 | O/ALG |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|

47427 D-AL POLLENS inj sol 1x5ml-jsk SVF CZ

47428 D-AL POLLENS inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

47429 D-AL POLLENS inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

47430 D-AL INSECTS inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

47431 D-AL FOODS inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

47432 D-AL DUSTS inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

47433 D-AL(MIT,MYCO,DMX,BACTO) inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

47434 D-AL DUSTS inj sol 1x5ml-pnu SVF CZ

54551 D-AL POLLENS inj sol 1x5ml-jsk SVF CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|
| 276.2 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička) | PRICK test | 1.00 | BA | 522.52 | O/ALG |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|

47485 ALYOSTAL PRICK sol 1x3ml-ic 100/ml SLG F

53626 ALYOSTAL PRICK sol 1x3ml-ir 100/ml SLG F

70500 SOLUPRICK SQ sol 1x3ml AAS DK

84226 SOLUPRICK SQ sol 1x1ml/10rg AAS DK

84227 SOLUPRICK SQ sol 1x1ml/100rg AAS DK

84228 SOLUPRICK SQ sol 1x1ml/300rg AAS DK

84296 D-AL PRICK TEST sol 1x3ml-jsk SVF CZ

84304 D-AL PRICK TEST sol 1x3ml-pnu SVF CZ

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|
| 276.3 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola) | PRICK test | 1.00 | BA | 363.86 | O/ALG |
|-------|-------|---|------------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|
| 276.4 | V04CL | testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava) | intrader. | 1.00 | BA | 495.05 | O/ALG |
|-------|-------|---|-----------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 277 | ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům perorální podání | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|------|--------|----|-------|---|
| 277.1 | V03AE02 | sevelamer do 403 mg v jedné tabletě p.o. včetně | p.o. | 400.00 | MG | 20.70 | P |
|-------|---------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------------------|------|--------|----|-------|---|
| 277.2 | V03AE02 | sevelamer nad 403 mg v jedné tabletě | p.o. | 400.00 | MG | 18.60 | P |
|-------|---------|--------------------------------------|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|--------|---|
| 277.3 | V03AE03 | lanthankarbonát | p.o. | 2.25 | GM | 267.10 | P |
|-------|---------|-----------------|------|------|----|--------|---|

Léčbu sevelamerem a lanthankarbonátem předepisuje nefrolog se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou komplikací renální osteopatie na pracovištích, kde jsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody a vazba na chirurgické pracoviště provádějící parathyreoidektomie, a to pouze pacientům, kteří splňují alespoň jedno z následujících kriterií:

- a) hyperfosfatemie vyšší než 2,5mmol/l a hyperkalcémie (Ca více než 2,7mmol/l) při terapii kalciem karbonátem a to i přes použití dialyzačního roztoku s obsahem kalcia 1,25 mmol/l,
- b) nekontrolovatelná hyperfosfatemie (více než 3,2 mmol/l); či opakovaně zjištěvaná hodnota více než 2,5 mmol/l při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčbě - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a spolupráci pacienta,
- c) parathyreoidektomie - k překlenutí období od indikace do operačního výkonu,
- d) tzv. fosfokalciový produkt více než 6,0 mmol/l exp.2 při splnění podmínek uvedených výše,
- e) prokázaná extraosenní kalcifikace (periartikulární, v jiných lokalizacích).

Kontroly účinnosti podávání sevelameru jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatemie vyšší než 2,5mmol/l.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|--|
| 277.4 | V04CX | jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO ₂) | p.o. | 1.00 | DF | 20.91 | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|----|----------|---|
| 277.5 | V04CX | urea | p.o. | 1.00 | DF | 1 510.74 | H |
|-------|-------|------|------|------|----|----------|---|

54292 HELICOBACTER TEST INFATI por plv sol 1x75mg IFI D

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 278 | ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům ostatní cesty aplikace | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|------|----|----------|---|
| 278.1 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | 1.00 | ML | 2 866.09 | X |
|-------|-------|-----------------|------|------|----|----------|---|

90502 TISSUCOL KIT glu 0.5ml(3x+2xsol) BXG A

90503 TISSUCOL KIT glu 1ml(3x+2xsolv.) BXG A

90504 TISSUCOL KIT glu 2ml(3x+2xsolv.) BXG A

90505 TISSUCOL KIT glu 5ml(3x+2xsolv.) BXG A

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|------|------|----|--------|---|
| 278.2 | V03AK | tkáňová lepidla | lok. | 1.00 | C2 | 177.24 | X |
|-------|-------|-----------------|------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------|------|-------|----|--------|--|
| 278.3 | V03AX | antistafylokokový fág. lyzát | lok. | 20.00 | ML | 321.60 | |
|-------|-------|------------------------------|------|-------|----|--------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|
| 278.4 | V04CE01 | galaktóza | parent. | 1.00 | DF | 903.92 | O |
|-------|---------|-----------|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|-------|---|
| 278.5 | V04CG03 | histamin | parent. | 10.00 | MG | 10.07 | O |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|------|---|
| 278.6 | V04CG30 | kofein a benzoát sodný | parent. | 0.10 | GM | 5.47 | O |
|-------|---------|------------------------|---------|------|----|------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|
| 278.7 | V04CJ01 | thyreotropin | parent. | 1.80 | MG | 24895.00 | X |
|-------|---------|--------------|---------|------|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|--------|---|
| 278.8 | V04CK01 | sekretin | parent. | 29.00 | RG | 919.90 | O |
|-------|---------|----------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 278.9 | V04CM01 | gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně) | parent. | 0.10 | MG | 225.63 | O |
|-------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|
| 278.10 | V04CM01 | gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli) | parent. | 0.10 | MG | 680.30 | O |
|--------|---------|--|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|-----------|------|----|--------|---|
| 278.11 | V04CX | jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity) | intrader. | 1.00 | ML | 114.51 | O |
|--------|-------|--|-----------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|---------|------|----|-------|---|
| 278.12 | V04CX | jiná diagnostika (fluorescein, koncentrace) | parent. | 1.00 | ML | 34.56 | O |
|--------|-------|---|---------|------|----|-------|---|

18960 FLUORESCITE inj sol 12x5ml 10% SNU B

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|---------|------|----|--------|---|
| 278.13 | V04CX | jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace) | parent. | 1.00 | ML | 126.50 | O |
|--------|-------|---|---------|------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 278.14 | V04CX | jiná diagnostika (sulfanum ceruleum) | subkut. | 50.00 | MG | 251.00 | O |
|--------|-------|--------------------------------------|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------|------|----|-------|-----|
| 279 | výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny | | | | | | |
| 279.1 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát) | p.o. | 1.00 | GM | 5.14 | LJ4 |
| 279.2 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 11.45 | LJ4 |

54508 P-AM UNIVERSAL plv 6x500gm SHS GB

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|-----|
| 279.3 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 12 měsíců) | p.o. | 1.00 | GM | 20.86 | LJ4 |
| 279.4 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné) | p.o. | 1.00 | GM | 12.17 | LJ4 |
| 279.5 | V06CA | výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát) | p.o. | 1.00 | GM | 5.33 | LJ4 |
| 279.6 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin (práškové formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.93 | LJ4 |

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|---|
| 33002 | XPHE JUNIOR SE | por plv sus 1x500gm | MTX | D |
| 33004 | XPHE KID SE | por plv sus 1x500gm | MTX | D |
| 33006 | MILUPA PKU 2 | por plv sol 1x500gm | MLP | D |
| 33010 | MILUPA PKU 3 | por plv sol 1x500gm | MLP | D |
| 33264 | HUMANA PHELICS 2 | por plv sol 1x400gm | HUG | D |
| 33265 | HUMANA PHELICS 3 | por plv sol 1x400gm | HUG | D |
| 33266 | HUMANA PHELICS 4 | por plv sol 1x400gm | HUG | D |
| 33267 | HUMANA PHELICS 5 | por plv sol 1x400gm | HUG | D |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|---|
| 279.7 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin pro děti mladší 12 měsíců (práškové formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 20.86 | P |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|---|

Přípravky, které jsou předepisovány na specializovaném pracovišti pro léčbu dědičných poruch metabolismu, jsou u nestabilních pacientů indikovány do 18 měsíců věku.

| | | | | |
|-------|------------------|---------------------|-----|----|
| 33013 | P-AM 1 | por plv sol 1x500gm | SHS | GB |
| 33263 | HUMANA PHELICS 1 | por plv sol 1x400gm | HUG | D |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|-----|
| 279.8 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.17 | LJ4 |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|-----|
| 279.9 | V06XX | výživa bez fenylalaninu - definované směsi aminokyselin (dávkované formy na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.39 | LJ4 |
|-------|-------|---|------|------|----|-------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|-----|
| 279.10 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - cyklus močoviny (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.11 | LJ4 |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|-----|
| 279.11 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - cyklus močoviny (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 15.89 | LJ4 |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|------|----|-------|------|
| 279.12 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - aminokyseliny s rozvětvenými řetězci (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.38 | L/J4 |
| 279.13 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - aminokyseliny s rozvětvenými řetězci (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.96 | L/J4 |
| 279.14 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - methylmalonová a propionová acidémie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.38 | L/J4 |
| 279.15 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - methylmalonová a propionová acidémie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.96 | L/J4 |
| 279.16 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - leucin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.99 | L/J4 |
| 279.17 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - leucin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.82 | L/J4 |
| 279.18 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - glutarová acidémie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.90 | L/J4 |
| 279.19 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - glutarová acidémie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 15.93 | L/J4 |
| 279.20 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - homocystinurie (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.38 | L/J4 |
| 279.21 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - homocystinurie (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.96 | L/J4 |
| 279.22 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - lysin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 13.12 | L/J4 |
| 279.23 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - lysin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.82 | L/J4 |
| 279.24 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin- tyrosin (věk do 1 roku, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 12.73 | L/J4 |
| 279.25 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - tyrosin (věk nad 1 rok, na obsah aminokyselin) | p.o. | 1.00 | GM | 14.38 | L/J4 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|------|
| 279.26 | V06XX | výživa pro jiné dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - neketotická hyperglycinémie, na obsah aminokyselin | p.o. | 1.00 | GM | 40.59 | L/J4 |
|--------|-------|---|------|------|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 280 | kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|---------|-------|----|--------|---|
| 280.1 | A11JA | kombinace vitamínů | parent. | 10.00 | ML | 116.07 | H |
|-------|-------|--------------------|---------|-------|----|--------|---|

42594 VITALIPID N INFANT inf cnc sol 10x10ml FKA S

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|-------|----|-------|---|
| 280.2 | V06DA | sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 80.00 | GM | 87.40 | Z |
|-------|-------|---|------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 280.3 | V06DA | sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 500.00 | ML | 74.25 | Z |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 280.4 | V06DB | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 280.5 | V06DB | tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb. | p.o. | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------|------|--------|----|-------|---|
| 280.6 | V06DC | kombinace sacharidů | p.o. | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
|-------|-------|---------------------|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 280.7 | V06DX | kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia | p.o. | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|------|--------|----|--------|------|
| 280.8 | V06DX | MCT olej | p.o. | 100.00 | ML | 204.52 | L/J4 |
|-------|-------|----------|------|--------|----|--------|------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|--------|---|
| 280.9 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa bez tuku, zvláštní použití (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 109.25 | Z |
|-------|-------|---|------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 280.10 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa bez tuku, zvláštní použití (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 74.25 | Z |
|--------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.11 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, standartní (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.12 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, standartní (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.13 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, zvláštní použití (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.14 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, zvláštní použití (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|---|
| 280.15 | V06XX | enterální výživa - polymerní výživa, (ketogenní dieta) | p.o. | 100.00 | GM | 393.33 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.16 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, standartní (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|---|
| 280.17 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, standartní (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 153.75 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.18 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, zvláštní použití (práškové formy) | p.o. | 100.00 | GM | 44.87 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 280.19 | V06XX | enterální výživa - oligopeptidy, zvláštní použití (tekuté formy) | p.o. | 500.00 | ML | 79.38 | Z |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----|---------|------|
| 280.20 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace sacharidů (práškové formy) | | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
| 280.21 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace sacharidů (tekuté formy) | | 500.00 | ML | 79.38 | H |
| 280.22 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace hydrofilních polysacharidů (práškové formy) | | 100.00 | GM | 73.56 | Z |
| 280.23 | V06XX | enterální výživa - modulární výživa, p.o. zvláštní použití - kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny (práškové formy) | | 100.00 | GM | 21.47 | Z |
| 280.24 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - MCT olej | p.o. | 100.00 | ML | 191.19 | L/J4 |
| 280.25 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - GTO olej | p.o. | 100.00 | ML | 204.52 | L/J4 |
| 280.26 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - LORENZO olej | p.o. | 100.00 | ML | 1024.51 | L/J4 |
| 280.27 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu sacharidů | p.o. | 100.00 | GM | 426.49 | L/J4 |
| 280.28 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu tuků | p.o. | 100.00 | GM | 112.02 | L/J4 |

33172 MILUPA BASIC-F

por plv sol 1x600gm

MLP D

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|------|
| 280.29 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu bílkovin | p.o. | 100.00 | GM | 199.94 | L/J4 |
| 280.30 | V06XX | speciální doplňky výživy pro dědičné poruchy metabolismu živin - doplňky výživy pro poruchy metabolismu cholesterolu | p.o. | 100.00 | GM | 555.55 | L/J4 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 281 | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|------|
| 281.1 | V06DD | aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy | p.o. | 5.00 | DF | 90.13 | L/J7 |
|-------|-------|--|------|------|----|-------|------|

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|-----|---|
| 88115 KETOSTERIL | | tbl obd 100 | FRE | D |
| 88116 KETOSTERIL | | tbl obd 300=3x100 | FRE | D |
| 88117 KETOSTERIL | | tbl obd 1500=15x100 | FRE | D |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|------|------|----|-------|------|
| 281.2 | V06XX | arginin | p.o. | 1.00 | GM | 12.60 | L/J4 |
|-------|-------|---------|------|------|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|------|------|----|-------|------|
| 281.3 | V06XX | citrulin | p.o. | 1.00 | GM | 57.40 | L/J4 |
|-------|-------|----------|------|------|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|------|----|-------|------|
| 281.4 | V06XX | cystin | p.o. | 1.00 | GM | 35.33 | L/J4 |
|-------|-------|--------|------|------|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------|------|----|--------|------|
| 281.5 | V06XX | glutamin | p.o. | 1.00 | GM | 18.00 | L/J4 |
| 281.6 | V06XX | isoleucin | p.o. | 1.00 | GM | 60.60 | L/J4 |
| 281.7 | V06XX | karnitin | p.o. | 1.00 | GM | 183.14 | L/J4 |
| 281.8 | V06XX | valin | p.o. | 1.00 | GM | 35.08 | L/J4 |

| | |
|------------|----------------------|
| 282 | náhrady mléka |
|------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|--------|------|
| 282.1 | V06DF | náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu | p.o. | 100.00 | GM | 10.25 | L/J4 |
| 282.2 | V06 | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamín y (jednotlivé aminokyseliny) | p.o. | 100.00 | GM | 345.00 | P |

Náhrady mléka, speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin. Přípravky jsou předepisovány v případě neúspěchu terapie přípravky obsahujícími extenzivní hydrolyzaty bílkovin v následujících indikacích:

- a) těžké potravinové alergie, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru),
- b) potravinové alergie s projevy poškození střevní sliznice,
- c) multiproteinové alergie,
- d) syndrom krátkého střeva,

e) malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu.

Ve výše uvedených případech předepisuje dětem nejvýše do 3 let věku lékař se specializací v oboru dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo alergologie a klinická imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|----|------|---|
| 282.3 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamín y (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy) | p.o. | 100.00 | GM | 2.25 | P |
|-------|-------|--|------|--------|----|------|---|

Terapie intolerance laktózy, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 282.4 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamín y (mléčné bílkoviny kravského mléka) | p.o. | 100.00 | GM | 26.50 | P |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

Přípravky ordinuje dětský lékař a neonatolog, dále předepisuje praktický lékař pro děti a dorost jako kompletní výživu kojenců nedonošených a kojenců s nízkou porodní hmotností od narození do dosažení hmotnosti 3500 g.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 282.5 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzaty s nízkým obsahem laktózy) | p.o. | 100.00 | GM | 24.45 | P |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, malabsorpce, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 282.6 | V06DE | kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzaty) | p.o. | 100.00 | GM | 21.66 | P |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 282.7 | V06XX | náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka | p.o. | 100.00 | GM | 26.50 | P |
|-------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

Přípravky ordinuje dětský lékař a neonatolog, dále předepisuje praktický lékař pro děti a dorost jako kompletní výživu kojenců nedonošených a kojenců s nízkou porodní hmotností od narození do dosažení hmotnosti 3500 g.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|
| 282.8 | V06XX | náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem | p.o. | 100.00 | GM | 21.66 | P |
|-------|-------|--|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, malabsorpce, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|----|------|---|
| 282.9 | V06XX | náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a bílkoviny kravského mléka | p.o. | 100.00 | GM | 2.25 | P |
|-------|-------|--|------|--------|----|------|---|

Terapie intolerance laktózy, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----|-------|---|
| 282.10 | V06XX | náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem | p.o. | 100.00 | GM | 24.45 | P |
|--------|-------|---|------|--------|----|-------|---|

Terapie alergie na bílkovinu kravského mléka, malabsorpce, předepisuje dětský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|---|
| 282.11 | V06XX | speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin | p.o. | 100.00 | GM | 345.00 | P |
|--------|-------|--|------|--------|----|--------|---|

Náhrady mléka, speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin. Přípravky jsou předepisovány v případě neúspěchu terapie přípravky obsahujícími extenzivní hydrolyzát bílkovin v následujících indikacích:

a) těžké potravinové alergie, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru),

b) potravinové alergie s projevy poškození střevní sliznice,

c) multiproteinové alergie,

d) syndrom krátkého střeva,

e) malabsorbce při přechodu z parenterální na enterální výživu.

Ve výše uvedených případech předepisuje dětem nejvýše do 3 let věku lékař se specializací v oboru dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo alergologie a klinická imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------|----|--------|------|
| 282.12 | V06XX | speciální kojenecká výživa s hydrolyzátem sojové bílkoviny a vepřového kolagenu | p.o. | 100.00 | GM | 140.00 | L/J4 |
|--------|-------|---|------|--------|----|--------|------|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|------|
| 282.13 | V06XX | náhrady mléka s obsahem sojové bílkoviny | p.o. | 100.00 | GM | 47.21 | L/J4 |
|--------|-------|--|------|--------|----|-------|------|

33200 NUTRILON 1 SOYA por plv sol 1x400gm NUT NL

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 283 | Rozpouštědla a iřigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny váří | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|------|----|------|--|
| 283.1 | V07AB | voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 1.00 | ML | 2.69 | |
|-------|-------|--|---------|------|----|------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------|-------|----|------|--|
| 283.2 | V07AB | voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 3.32 | |
|-------|-------|---|---------|-------|----|------|--|

00387 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10ml-amp.pl. BTA SK

00388 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 50x10ml-amp.pl. BTA SK

55807 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj100x10ml-amp.pl. BTA SK

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------|--------|----|-------|--|
| 283.3 | V07AB | voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi | parent. | 100.00 | ML | 13.98 | |
|-------|-------|--|---------|--------|----|-------|--|

10559 AQUA PRO INJECTIONE BRAUN inj sol 10x250ml-pe BMM D

10560 AQUA PRO INJECTIONE BRAUN inj sol10x500ml-pe BMM D

10561 AQUA PRO INJECTIONE BRAUN injsol10x1000ml-pe BMM D

31424 STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS par lqf 1x250ml-skl FKI I

31425 STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS par lqf16x250ml-skl FKI I

31426 STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS par lqf 1x500ml-skl FKI I

31427 STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS par lqf12x500ml-skl FKI I

31428 STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS par lqf1x1000ml-skl FKI I

31429 STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS par lqf6x1000ml-skl FKI I

53363 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x250ml(sklo) IHO CZ

| | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------------|-----|----|
| 53364 | AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA | sol 1x500ml(sklo) | IHO | CZ |
| 57773 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFH | E |
| 57775 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFH | E |
| 57776 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFH | E |
| 69789 | AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA | inf 1x500ml | ARD | CZ |
| 70484 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x1000ml(vak) | BFF | I |
| 70528 | AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA | par lqf 1x500ml | MVM | CZ |
| 80486 | AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA | par lqf 1x250ml | MVM | CZ |
| 83943 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | sol 1x500ml(vak) | INK | CZ |
| 85557 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x250ml(vak) | BFF | I |
| 85558 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x500ml(vak) | BFF | I |
| 89244 | AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA | inf 1x250ml | ARD | CZ |
| 91876 | AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA | sol 1x500ml(plast) | IHO | CZ |
| 92782 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | sol 1x1000ml(vak) | INK | CZ |
| 92783 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | sol 1x2000ml(vak) | INK | CZ |
| 95564 | STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS | par lqf 1x500ml-pe | FKI | I |
| 95565 | STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS | par lqf 1x1000ml-pe | FKI | I |
| 95566 | STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS | par lqf 20x500ml-pe | FKI | I |
| 95567 | STERILE WATER F.INJ.FRESENIUS | par lqf12x1000ml-pe | FKI | I |
| 97058 | AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | sol 1x500ml(vak) | INK | CZ |
| 97726 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x250ml(sklo) | BFF | I |
| 97727 | WATER FOR INJECTIONS BIEFFE | inf 1x500ml(sklo) | BFF | I |
| 98539 | VODA NA INJEKCI VIAFLO | par lqf 35x150ml | BFH | E |
| 99208 | VODA NA INJEKCI VIAFLO | par lqf 30x250ml | BFH | E |
| 99814 | VODA NA INJEKCI VIAFLO | par lqf 20x500ml | BFH | E |
| 99826 | VODA NA INJEKCI VIAFLO | par lqf10x1000ml | BFH | E |

| | |
|-----|---|
| 284 | vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------------|---------|-------|----|-------|---|
| 284.1 | V08AA01 | kyselina diatrizoová | parent. | 10.00 | ML | 45.00 | K |
| 284.2 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 300 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 41.06 | K |
| 284.3 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 380 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 44.97 | K |
| 284.4 | V08AA03 | iodamid (koncentrace 410 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 87.40 | K |
| 284.5 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová | p.o. | 10.00 | ML | 59.19 | K |

| | | | | |
|-------|-----------------|---------------------|-----|---|
| 59496 | TELEBRIX GASTRO | sol 1x100ml/30gm i | GUT | F |
| 59497 | TELEBRIX GASTRO | sol 10x100ml/30gm i | GUT | F |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|---|
| 284.6 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 54.73 | K |
|-------|---------|---|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------|-----|---|
| 32931 | TELEBRIX 30 MEGLUMINE | inj sol 1x50ml | GUT | F |
| 32932 | TELEBRIX 30 MEGLUMINE | inj sol 1x100ml | GUT | F |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 284.7 | V08AA05 | kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více) | parent. | 10.00 | ML | 66.00 | K |
|-------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | |
|-------|-------------|-----------------|-----|---|
| 32935 | TELEBRIX 35 | inj sol 1x50ml | GUT | F |
| 32936 | TELEBRIX 35 | inj sol 1x100ml | GUT | F |
| 32937 | TELEBRIX 35 | inj sol 1x200ml | GUT | F |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|-------|-----|--------|---|--|
| 285 | vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látky | | | | | | | |
| 285.1 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 184.90 | K | |
| 285.2 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 220.90 | K | |
| 285.3 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K | |
| 285.4 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 122.70 | K | |
| 02955 | IOHEXOL 240 | | inj sol 1x100ml | | ITP | CZ | | |
| 285.5 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 256.70 | K | |
| 285.6 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.50 | K | |
| 02938 | IOHEXOL 300 | | inj sol 10x20ml | | ITP | CZ | | |
| 285.7 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K | |
| 285.8 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 207.20 | K | |
| 285.9 | V08AB02 | iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K | |
| 285.10 | V08AB03 | kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 200.58 | K | |
| 59544 | HEXBRIX 320 | | inj sol 1x50ml | | GUT | F | | |
| 59545 | HEXBRIX 320 | | inj sol 25x50ml | | GUT | F | | |
| 285.11 | V08AB03 | kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 186.90 | K | |
| 285.12 | V08AB04 | iopamidol | p.o. | 10.00 | ML | 59.19 | K | |
| 285.13 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 242.54 | K | |
| 285.14 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 299.78 | K | |
| 285.15 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.92 | K | |
| 285.16 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 169.67 | K | |
| 285.17 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 365.98 | K | |
| 285.18 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 224.93 | K | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|-----|
| 285.19 | V08AB04 | iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 181.10 | K |
| 285.20 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 122.70 | K |
| 285.21 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.40 | K |
| 285.22 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.60 | K |
| 285.23 | V08AB05 | iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 165.80 | K |
| 285.24 | V08AB06 | iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 429.71 | K/P |
| 285.25 | V08AB06 | iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 534.28 | K/P |

Iotrolan aplikuje rentgenolog při vyšetření s intrathekálním podáním.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 285.26 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 95.60 | K |
| 285.27 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 122.70 | K |
| 285.28 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 256.70 | K |
| 285.29 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.40 | K |
| 285.30 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
| 285.31 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 149.50 | K |
| 285.32 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 207.20 | K |
| 285.33 | V08AB07 | ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.42 | K |
| 285.34 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 193.90 | K |

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|-----|-----|
| 42398 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 6x500ml-skl | ABH | N |
| 42399 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 6x500ml-skl | AHC | IRL |
| 42400 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 10x100ml-pp | ABH | N |
| 42401 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 10x100ml-pp | AHC | IRL |
| 42402 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 10x200ml-pp | ABH | N |
| 42403 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 10x200ml-pp | AHC | IRL |
| 45115 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 6x200ml-skl | AHC | IRL |
| 84340 | VISIPAQUE 150 MG I/ML | inj sol 6x200ml-skl | ABH | N |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.35 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 302.90 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.36 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 253.90 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| 42406 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-skl | ABH | N |
| 42407 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-skl | AHC | IRL |
| 42410 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x100ml-pp | ABH | N |
| 42411 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x100ml-pp | AHC | IRL |
| 42412 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x150ml-pp | ABH | N |
| 42413 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x150ml-pp | AHC | IRL |
| 42414 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x175ml-pp | ABH | N |
| 42415 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x175ml-pp | AHC | IRL |
| 42416 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x200ml-pp | ABH | N |
| 42417 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x200ml-pp | AHC | IRL |
| 42418 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-pp | ABH | N |
| 42419 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-pp | AHC | IRL |
| 45120 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x100ml-sk | AHC | IRL |
| 45121 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 6x200ml-skl | AHC | IRL |
| 84343 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 10x100ml-sk | ABH | N |
| 84344 | VISIPAQUE 270 MG I/ML | | inj sol 6x200ml-skl | ABH | N |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 285.37 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 321.70 | K |
|--------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.38 | V08AB09 | iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 258.50 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--|---------------------|-----|-----|
| 42428 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-skl | ABH | N |
| 42429 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-skl | AHC | IRL |
| 42438 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 10x200ml-pp | ABH | N |
| 42439 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 10x200ml-pp | AHC | IRL |
| 42440 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-pp | ABH | N |
| 42441 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 6x500ml-pp | AHC | IRL |
| 45125 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 6x200ml-skl | AHC | IRL |
| 84348 | VISIPAQUE 320 MG I/ML | | inj sol 6x200ml-skl | ABH | N |

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|
| 285.39 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 92.70 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.40 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 109.70 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.41 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 126.00 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.42 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 185.50 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.43 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.44 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 207.20 | K |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|-------|----|--------|---|
| 285.45 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K |
| 285.46 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně) | parent. | 10.00 | ML | 228.70 | K |
| 285.47 | V08AB10 | iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 175.90 | K |
| 285.48 | V08AB11 | lobitridol (koncentrace 300 mg nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 142.65 | K |
| 285.49 | V08AB11 | lobitridol (koncentrace 350 mg nad 50 ml v ampuli) | parent. | 10.00 | ML | 159.40 | K |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 286 | vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|-------|----|--------|---|
| 286.1 | V08AC | kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 74.25 | K |
| 286.2 | V08AC | kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml) | parent. | 10.00 | ML | 37.39 | K |
| 286.3 | V08AC04 | adipiodon | parent. | 10.00 | ML | 39.35 | K |
| 286.4 | V08AD | iopydol + iopyron | parent. | 10.00 | ML | 300.70 | K |
| 286.5 | V08AD01 | ethylestery jodovaných mastných kyselin | parent. | 10.00 | ML | 476.14 | K |

59494 LIPIODOL ULTRA-FLUIDE inj sol 1x10ml GUT F

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|--------|----|-------|---|
| 287 | RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý | | | | | | |
| 287.1 | V08BA01 | RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon) | p.rect. | 100.00 | GM | 45.00 | K |
| 287.2 | V08BA01 | síran barnatý | p.o. | 100.00 | GM | 32.15 | K |
| 287.3 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy HD) | p.o. | 100.00 | GM | 36.73 | K |

62396 E-Z-HD plv sus 1x340gm EZE USA

78270 E-Z-HD plv sus 1x340gm EZE CND

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------|--------|----|--------|---|
| 287.4 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy pasty) | p.o. | 100.00 | GM | 94.58 | K |
| 287.5 | V08BA01 | síran barnatý (lékové formy pro CT) | p.o. | 7.50 | GM | 147.52 | K |

62399 E-Z-CAT sus 1x225ml EZE USA

78269 E-Z-CAT sus 1x225ml EZE CND

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---------|-------|----|----------|---|
| 288 | paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk | | | | | | |
| 288.1 | V08CA01 | dimeglumin gadopentetat | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.2 | V08CA02 | meeglumin gadoterat | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.3 | V08CA03 | gadodiamid | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.4 | V08CA04 | gadoteridol | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--|---------|-------|----|----------|---|
| 288.5 | V08CA05 | mangafodipir | parent. | 10.00 | ML | 916.70 | K |
| 288.6 | V08CA08 | dimeglumin gadobenat | parent. | 10.00 | ML | 1 472.10 | K |
| 288.7 | V08CA09 | gadobutrol | parent. | 10.00 | ML | 2 518.00 | K |
| 288.8 | V08CB03 | oxid železa, nanočástice, s obsahem do 0,9 ml včetně | parent. | 1.00 | DF | 5 945.93 | H |

02251 RESOVIST inj sol 1x0.9ml-stř SAG D

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|------|----|----------|---|
| 288.9 | V08CB03 | oxid železa, nanočástice, s obsahem nad 0,9 ml | parent. | 1.00 | DF | 6 700.00 | H |
| 288.10 | V08DA01 | mikročástice albuminu s oktafluoropanem | parent. | 1.00 | DF | 2 857.50 | H |
| 288.11 | V08DA02 | mikročástice galaktózy | parent. | 1.00 | GM | 914.00 | H |
| 288.12 | V08DA05 | sulfur hexafluorid | parent. | 5.00 | ML | 2 551.00 | H |
| 288.13 | V08CA | dinatrii gadoxetas | parent. | 1.00 | ML | 560.00 | K |

16173 PRIMOVIEW 0.25 MMOL/ML inj sol 1x10ml SAG D

| | |
|-----|--|
| 289 | Individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku |
|-----|--|

Úhrada za jednotku individuálně připravovaného radiofarmaka.

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|
| 289.1 | V09 | individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku | parent. | 1 | MBq | plně | K/NM |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|

V09 Technecestan sodný inj. (^{99m}Tc)

| | |
|-----|--|
| 290 | Individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii |
|-----|--|

Úhrada za jednotku individuálně připravovaného radiofarmaka.

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|
| 290.1 | V10 | individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii | parent. | 1 | MBq | plně | K/NM |
|-------|-----|--|---------|---|-----|------|------|

V10 Jodid sodný inj. (¹³¹I)

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---|-----|------|-----|
| 290.2 | V10 | Ibritumomab tiuxetan ⁹⁰ Y inj. | parent. | 1 | MBq | plně | K/P |
|-------|-----|---|---------|---|-----|------|-----|

Individuálně připravované radiofarmakum pro terapii Ibritumomab tiuxetan ⁹⁰Y inj. indikuje hematolog - hematoonkolog u pacientů s fungující krvetvorbou, k léčbě CD20 pozitivního folikulárního B non Hodgkinského lymfomu v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých pacientů. Terapii provádí specializované pracoviště nukleární medicíny v návaznosti na hematoonkologické centrum.

| | |
|-----|--|
| 291 | Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik) |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|
| 291.1 | V20 | kyselina salicylová v lékových formách mastí, krémů | lok. | | | | plně |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|

| | |
|-----|---|
| 292 | Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|
| 292.1 | V20 | karbethopendecinum bromid, lékové formy očních kapek nebo očních vod | lok. | | | | plně |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|
| 292.2 | V20 | karbethopendecinum bromid, lékové formy očních mastí | lok. | | | | plně |
|-------|-----|--|------|--|--|--|------|

| | |
|-----|--|
| 293 | Individuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik - anodyn (opioidů) |
|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|
| 293.1 | V20 | morfín | rect. | | | | plně |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|------|--|--|--|------|
| 293.2 | V20 | morfín | p.o. | | | | plně |
|-------|-----|--------|------|--|--|--|------|

| | |
|-----|---|
| 294 | individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|
| 294.1 | V20 | natrium tetraboricum v lékové formě vaginálních globulí | vag. | | | | plně |
|-------|-----|---|------|--|--|--|------|

| | |
|-----|---|
| 295 | individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávícího ústrojí |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|
| 295.1 | V20 | pepsin | p.o.. | | | | plně |
|-------|-----|--------|-------|--|--|--|------|

| | |
|-----|---|
| 296 | individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik |
|-----|---|

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|------|--|--|--|------|
| 296.1 | V20 | argenti diacetylottanas albuminatum | lok. | | | | plně |
|-------|-----|-------------------------------------|------|--|--|--|------|

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se plně hradí individuálně připravované léčivé přípravky s výjimkou následujících individuálně připravovaných léčivých přípravků, které jsou hrazeny ve výši 20 % jejich ceny pro konečného spotřebitele:

- a) analgetické a antipyretické směsy, včetně směsi s kodeinem a etylmorphinem,
- b) čaje,
- c) vitamíny v perorálních lékových formách,
- d) kloktadla,
- e) expektorancia a antitusika,
- f) antihemoroidalia,
- g) hypnotika, sedativa,
- h) individuálně připravované léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce,
- i) lokální antiflogistiká a derivancia,
- j) individuálně připravované léčivé přípravky, jejichž jedinou součástí jsou nehrazené hromadně vyráběné léčivé přípravky.

Je-li součástí individuálně připravovaného léčivého přípravku hromadně vyráběný léčivý přípravek, hradí se tato součást individuálně připravovaného léčivého přípravku podle úhrady stanovené touto vyhláškou v příslušné skupině léčivých látek.

| | |
|-----|-------------------------|
| 297 | erytrocytární přípravky |
|-----|-------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|--------|---|----|----------|---|
| 297.1 | V22 | Erytrocyty | parent | 1 | TU | 1 134.00 | B |
|-------|-----|------------|--------|---|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|--------|---|----|----------|---|
| 297.2 | V22 | Erytrocyty bez buffy coatu | parent | 1 | TU | 1 758.00 | B |
|-------|-----|----------------------------|--------|---|----|----------|---|

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|--------|---|----|----------|-----|
| 297.3 | V22 | Erytrocyty bez buffy coatu, ozářené | parent | 1 | TU | 1 898.00 | B/P |
|-------|-----|-------------------------------------|--------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|--------|---|----|----------|-----|
| 297.4 | V22 | Erytrocyty bez buffy coatu, promyté | parent | 1 | TU | 2 344.00 | B/P |
|-------|-----|-------------------------------------|--------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|--------|---|----|----------|-----|
| 297.5 | V22 | Erytrocyty bez buffy coatu, promyté, ozářené | parent | 1 | TU | 2 484.00 | B/P |
|-------|-----|--|--------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------|---------|---|----|----------|-----|
| 297.6 | V22 | Erytrocyty deleukotizované | parent. | 1 | TU | 2 577.00 | B/P |
|-------|-----|----------------------------|---------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------|---|----|----------|-----|
| 297.7 | V22 | Erytrocyty deleukotizované, ozářené | parent. | 1 | TU | 2 717.00 | B/P |
|-------|-----|-------------------------------------|---------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------|---|----|----------|-----|
| 297.8 | V22 | Erytrocyty deleukotizované, promyté | parent. | 1 | TU | 3 163.00 | B/P |
|-------|-----|-------------------------------------|---------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|
| 297.9 | V22 | Erytrocyty deleukotizované, promyté, ozářené | parent. | 1 | TU | 3 303.00 | B/P |
|-------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|
| 297.10 | V22 | Erytrocyty deleukotizované pro výmennou transfuzi, ozářené | parent. | 1 | TU | 3 547.00 | B/P |
|--------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|----|--------|---|
| 297.11 | V22 | Erytrocyty pro autotransfuzi, včetně plazmy | parent. | 1 | TU | 754.00 | B |
|--------|-----|---|---------|---|----|--------|---|

1) Erytrocytární přípravky deleukotizované jsou indikovány u pacientů v případě:

- a) nehemolytické postransfuzní reakce:
 - 1. při opakovaných febrilních nehemolytických reakcích, anebo
 - 2. při průkazu cytotoxických HLA protilátek.
- b) rizika alloimunizace:
 - 1. při chronických substitucích transfuzními přípravky,
 - 2. před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)
- c) rizika infekce CMV u CMV seronegativních příjemců:
 - 1. před a po orgánových transplantacích,
 - 2. u imunosuprimovaných pacientů,
 - 3. u nedonošených dětí a novorozenců,
 - 4. při intrauterinnych transfuzí,
 - 5. u těhotných žen,
 - 6. u dětí po operacích srdce a velkých cév.

2) Erytrocytární přípravky promyté jsou indikovány u pacientů v případě:

- a) paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH),
- b) deficitu IgA,
- c) přecitlivělosti na plazmatické bílkoviny.

3) Erytrocytární přípravky ozářené z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD) jsou indikovány :

- a) u imunosuprimovaných pacientů, včetně pacientů před a po transplantaci,
- b) u novorozenců a nedonošených dětí
- c) u příjemců transfuzního přípravku od geneticky příbuzného dárce

Vysvětlivky:

- *pediatrické a neúplné transfuzní jednotky (1 TU = množství z jednoho standardního odběru) se považují za 0,7 TU*

| 298 trombocytární přípravky | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--|---------|---|----|-----------|-----|
| 298.1 | V22 | Trombocyty | parent. | 1 | TD | 7 670.00 | B |
| 298.2 | V22 | Trombocyty ozářené | parent. | 1 | TD | 7 810.00 | B/P |
| 298.3 | V22 | Trombocyty promyté | parent. | 1 | TD | 8 256.00 | B/P |
| 298.4 | V22 | Trombocyty promyté, ozářené | parent. | 1 | TD | 8 396.00 | B/P |
| 298.5 | V22 | Trombocyty deleukotizované | parent. | 1 | TD | 9 056.00 | B/P |
| 298.6 | V22 | Trombocyty deleukotizované, ozářené | parent. | 1 | TD | 9 196.00 | B/P |
| 298.7 | V22 | Trombocyty deleukotizované, promyté | parent. | 1 | TD | 9 642.00 | B/P |
| 298.8 | V22 | Trombocyty deleukotizované, promyté, ozářené | parent. | 1 | TD | 9 782.00 | B/P |
| 298.9 | V22 | Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané | parent. | 1 | TD | 9 690.00 | B/P |
| 298.10 | V22 | Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané, ozářené | parent. | 1 | TD | 9 830.00 | B/P |
| 298.11 | V22 | Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané, promyté | parent. | 1 | TD | 10 276.00 | B/P |
| 298.12 | V22 | Trombocyty deleukotizované, HLA vybírané, promyté, ozářené | parent. | 1 | TD | 10 416.00 | B/P |
| 298.13 | V22 | Trombocyty pro autologní použití minim, 200x10 ⁹ | parent. | 1 | TD | 5 233.00 | B |

1) Deleukotizované trombocyty jsou indikovány v případě:

1.1) Výskytu nehemolytických potransfuzních reakcí

- a) u pacientů s opakovanými febrilními nehemolytickými reakcemi po transfuzi,
- b) při průkazu cytotoxických HLA protilátek.

1.2) Rizika alloimunizace:

- a) u pacientů chronicky substituovaných transfuzními přípravky,
- b) před a po orgánových transplantacích (transplantace kostní dřeně, srdce, ledvin, jater apod.)

1.3) Rizika infekce CMV u CMV seronegativních příjemců:

- a) před a po orgánových transplantacích,

- b) u ostatních imunosuprimovaných pacientů,
- c) u nedonošených dětí a novorozenců,
- d) u intrauterinních transfuzí,
- e) u těhotných žen,
- f) u dětí po operacích srdce a velkých cév.

- 2) Trombocytární přípravky promyté jsou indikovány v případě:
- a) feto-maternální aloimunní trombocytopenie (FMAIT),
 - b) deficitu IgA,
 - c) přecitlivělosti na plazmatické bílkoviny.

- 3) Trombocytární přípravky ozářené lze indikovat z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):
- a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,
 - b) u novorozenců a nedonošených dětí.

- 4) Trombocytární přípravky s HLA typizací jsou indikovány v případě:
- a) prevence HLA imunizace u nemocných zařazených do transplantačního programu nebo odkázaných na dlouhodobou substituci léčbu trombocyty,
 - b) vyhledávání přípravků pro nemocné refrakterní na náhodně vybírané trombocyty.

Vysvětlivky:

- při úhradě všech druhů Trombocytů se za 1 terapeutickou dávku považuje počet trombocytů $200-299 \times 10^9$. Při počtu nižším nebo vyšším se vykazuje násobek jednotky s povolenými hodnotami 0,5; 1,5; 2,0

| 299 přípravky z plazmy | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------|---|----|----------|-----|
| 299.1 | V22 | Plazma pro klinické použití | parent. | 1 | TU | 830.00 | B/P |
| 299.2 | V22 | Plazma pro klinické použití, ozářená | parent. | 1 | TU | 970.00 | B/P |
| 299.3 | V22 | Plazma ochuzená o kryoprotein | parent. | 1 | TU | 830.00 | B/P |
| 299.4 | V22 | Plazma ochuzená o kryoprotein, ozářená | parent. | 1 | TU | 970.00 | B/P |
| 299.5 | V22 | Kryoprotein | parent. | 1 | TU | 830.00 | B/P |
| 299.6 | V22 | Kryoprotein, ozářený | parent. | 1 | TD | 3 460.00 | B/P |

Podání plazmy v doporučené úvodní dávce je 10 až 20 ml/kg tělesné hmotnosti příjemce (jedna transfúzní jednotka 1T.U. odpovídá 220 ml ± 40 ml plazmy) je indikováno v případě:

- 1) krvácení nebo kombinované koagulační poruchy potvrzené screeningovými laboratorními testy při:
 - a) diseminované intravaskulární koagulaci (DIC), pokud je kontraindikováno podání koncentrátu izolovaných koagulačních faktorů,
 - b) ziskáném nedostatkem koagulačních faktorů z poruch jejich tvorby (např. při hepatopatií), pokud není indikováno podání koncentrátu izolovaných koagulačních faktorů,
 - c) těžkém, život ohrožujícím krvácení při deficitu K vitaminu event. při působení antagonistů vitamINU K, pokud je kontraindikováno podání koncentrátu izolovaných koagulačních faktorů,
 - d) masivních transfuzích nebo při hrazení masivních krevních ztrát koloidními a krystaloidními roztoky jako náhrada koagulačních faktorů (na 3 – 4 transfúzní jednotky erytrocytů 1 jednotka plazmy, na 2000 ml náhradních roztoků 1 jednotka plazmy),
 - e) nemoci z popálení na přechodu do 2. fáze,
- 2) krvácení nebo přípravě na chirurgický výkon u nemocných s vrozeným deficitem koagulačních faktorů v případě, že není dostupná léčba koncentráty příslušného koagulačního faktoru,
- 3) mikroangiopatické trombocytopenii (trombotická trombocytopenická purpura, hemolytickouremický syndrom, HELP syndrom a další podobné stavby) a to přímo, nebo jako substituce při výměnné plazmaferéze,
- 4) hemolytické chorobě novorozence, a to pro resuspenzi erytrocytů v rámci výměnné transfuze.
- 5) ozářené transfúzní přípravky z plazmy lze indikovat z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD):
 - a) u imunosuprimovaných pacientů a příjemců před a po transplantaci,
 - b) u novorozenců a nedonošených dětí.

Vysvětlivky:

- směsné přípravky (kryoprotein, event. plazma ochuzená o kryoprotein) se vykazují dle výchozího množství plazmy v ekvivalentu TU = 240 ml
 - 1 TD (terapeutická dávka) Kryoproteinu ozářeného = množství vyrobené z 1 litru plazmy

| 300 leukocytární přípravky | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------|---|----|-----------|-----|
| 300.1 | V22 | Leukocyty | parent. | 1 | TD | 14 075.00 | B/P |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------------------|---------|---|----|-----------|-----|
| 300.2 | V22 | Leukocyty ozářené | parent. | 1 | TD | 14 215.00 | B/P |
|-------|-----|-------------------|---------|---|----|-----------|-----|

Leukocytární přípravky ozářené lze indikovat z důvodu snížení rizika potransfuzní reakce štěpu proti hostiteli (TA-GVHD) :

- a. u imunosuprimovaných pacientů a u příjemců před a po transplantaci,
- b. u novorozenců a nedonošených dětí.

Vysvětlivky:

$$\text{- } 1 \text{ TD (terapeutická dávka)} = 5 \times 10^9 \text{ leukocytů}$$

Omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

Symboly použité ve vyhlášce mají tento význam :

L - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, předepisuje lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen "odborný lékař") nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Tyto léčivé přípravky jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾.

Z - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění pouze po předchozím schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny, a to

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾.

X - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. na recept schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku po předchozím souhlasu revizního lékaře zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾,
3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, ve kterém tuto péči poskytují převážně zdravotničtí pracovníci podle zvláštního právního předpisu²⁾ (dále jen "ošetřovatelské lůžko"), a při poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu.

O - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾.

¹⁾ § 23 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

²⁾ Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

K - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku v ambulantní i ústavní péči¹⁾, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,
2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péče poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

T - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku, jde-li o poskytování resuscitační a intenzivní péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče.

U - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾, s výjimkou poskytování péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

H - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení ústavní péče hrazeny ze zdravotního pojištění pouze formou lékového paušálu. Při předepsání na recept nejsou ze zdravotního pojištění hrazeny.

B - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení ambulantní a ústavní péče hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

P - léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou, jsou předepisované v souladu s omezením stanoveným pro konkrétní léčivou látku uvedeným u příslušné skupiny a jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění do výše stanovené úhrady

1. na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾,
3. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu "P" je ve stejném řádku ve sloupci "omezení" uveden některý ze symbolů "K", "T", "U", „O“ nebo "B".

Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky neoznačené žádným ze symbolů uvedených v této příloze, jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění pouze

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče¹⁾

| | |
|------------|---|
| ALG | alergologie a klinická imunologie |
| ATB | antibiotické středisko zřízené při mikrobiologickém oddělení zdravotnického zařízení (vydává doporučení k předepsání a použití antimikrobiálních léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ze skupin léčivých látek podle přílohy č.2 zákona) |
| CHI | chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie) |
| DER | dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie |
| DIA | diabetologie nebo vnitřní lékařství |
| END | endokrinologie nebo vnitřní lékařství |
| GER | geriatrie nebo vnitřní lékařství |
| GIT | gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie nebo vnitřní lékařství |
| GYN | gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie |
| HEM | hematologie a transfuzní lékařství nebo vnitřní lékařství |
| INF | infekční lékařství |
| INT | vnitřní lékařství |
| KAR | kardiologie, dětská kardiologie nebo vnitřní lékařství |
| NEU | neurologie, dětská neurologie |
| NM | nukleární medicína |
| ONK | klinická onkologie, dětská onkologie a hematoonkologie, radiační onkologie |
| OPH | oftalmologie |
| ORL | otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie, audiologie a foniatrie |
| ORT | ortopedie |
| PED | dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost |
| PSY | psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie |
| REV | revmatologie |
| SEX | sexuologie |
| STO | zubní lékařství |
| TRN | tuberkulóza a respirační nemoci, dětská pneumologie nebo vnitřní lékařství |
| URN | urologie, dětská urologie nebo vnitřní lékařství |
| | |
| AUR | Ušní podání |
| DLP | Přípravek na dialýzu |
| DRM | Kožní podání |
| EML | Emulze |
| ENC | Endocervikální podání |
| GNG | Podání na dásně |
| ILS | Intralezionální podání |
| IMP | Implantát |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| IMS | Intramuskulární podání |
| INF | Infuze |
| INH | Inhalační podání |
| INJ | Injekce |
| IVN | Intravenózní podání |
| NAS | Nosní podání |
| NAS+OPH | Nosní + oční podání |
| OPH | Oční podání |
| OPH+AUR | Oční + ušní podání |
| ORM | Orální podání |
| PAR | Pareenterální podání |
| POR | Perorální podání |
| POR+INH | Perorální + inhalační podání |
| RCT | Rektální podání |
| SDR | Subkutánní podání |
| STM | Zubní podání |
| TDR | Transdermální podání |
| TRP | Tracheopulmonální přípravek |
| VAG | Vaginální podání |
| | |
| imp. | Implantát |
| inhal. | Inhalační podání |
| intrader. | Intradermální podání |
| lok. | Lokální podání |
| p.o. | Perorální podání |
| p.rect. | Rektální podání |
| parent. | Pareenterální podání |
| PRICK test | K diagnostice |
| spr. | Sprej |
| subkut. | Subkutánní podání |
| sublng. | Sublingvální podání |
| transd. | Transdermální podání |
| vag. | Vaginální podání |
| | |
| AAP | Jehlový aplikátor |
| AMP | Ampulka |
| APL | Aplikátor |
| APZ | Aplikátor umožňující zasypávání |
| BLI | Blistr |
| BOX | Krabička |
| DBU | Dětský bezpečnostní uzávěr |
| IJT | Injekční stříkačka |
| INA | Obal umožňující zasypávání |
| ISP | Předplněná injekční stříkačka |
| JAR | Kelímek |
| LAG | Lahev |
| LGT | Lahvička s kapacím zařízením |
| MDC | Jednodávkový obal |
| MSD | Dávkovač |
| NAP | Nanášecí aplikátor |

| | |
|--------------------|---|
| NSA | Nosní aplikátor |
| PEP | Předplněné pero |
| PIP | Pipeta |
| PMM | Dávkovací pumpa |
| PSS | Tlakový obal |
| SCC | Váček |
| SPN | Obal na rozprašování |
| SPP | Mechanický rozprašovač |
| STR | Strip |
| TBC | Obal na tablety |
| TUB | Tuba |
| UGT | Uzávěr s kapátkem |
| VAK | Vak |
| VAK M312 | Vak |
| VAK M312P | Vak |
| VAK PVC | Vak |
| VAK SF150 | Vak |
| VAK SF150P | Vak |
| VIA | Injekční lahvička |
| VNM | Dávkovací ventil |
| ZVL | Zásobní vložka |
| | |
| AQA | Voda |
| BAL | Koupel |
| CNC SOL | Koncentrovaný roztok |
| CPS | Tobelka |
| CPS DUR | Tvrdá tobolka |
| CPS ENT | Enterosolventní tobolka |
| CPS ETD | Enterosolventní tvrdá tobolka |
| CPS MOL | Měkká tobolka |
| CPS PML | Měkká tobolka s prodlouženým uvolňováním |
| CPS PRO | Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním |
| CPS RDR | Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním |
| CPS RET | Tobelka s řízeným uvolňováním |
| CRM | Krém |
| CRM VAG | Vaginální krém |
| DRM PLV ADS | Kožní zásyp |
| DRM UNG | Mast |
| EML | Emulze |
| EML PSS | Emulze v tlakovém obalu |
| EMP TDR | Transdermální náplast |
| GEL | Gel |
| GKU PSO LQF | Prášek pro přípravu tkáňového lepidla s rozpouštědlem |
| GLB | Globule |
| GRA | Zrněný prášek |
| GRA EFF | Šumivý zrněný prášek |
| GRA RET | Zrněný prášek s řízeným uvolňováním |
| GRA SOL | Zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku |
| GRA SUS | Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze |
| GTT | Kapky |

| | |
|--------------------|--|
| GTT SOL | Kapky, roztok |
| GTT SUS | Kapky, suspenze |
| GUM | Guma |
| HFL SOL | Roztok pro hemofiltraci |
| IMP | Implantát |
| INJ | Injekce |
| INJ PSO LQF | Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem |
| INJ SUS | Injekční suspenze |
| INS | Insert |
| ISL SUS | Instilace, suspenze |
| LAC UGC | Lak na nehty |
| LIG IPR | Napuštěný obvazový prostředek |
| LIQ | Tekutina |
| LIQ VAP | Tekutina k přípravě inhalace parou |
| LOT | Omývadlo |
| LQF | Rozpouštědlo |
| LYO | Lyofilizát |
| PAS | Pastilka |
| PLV | Prášek |
| PLV ADS | Zásyp |
| PLV CPS | Prášek v tvrdé tobolce |
| PLV DOS | Dávkovaný prášek |
| PLV SIR | Prášek pro přípravu sirupu |
| PLV SOL | Prášek pro přípravu perorálního roztoku |
| PLV SUS | Prášek pro přípravu perorální suspenze |
| PRN SOL | Roztok na peritoneální podání |
| PSO LQF | Prášek pro přípravu roztoku s rozpouštědlem |
| PST | Pasta |
| PSU LQF | Prášek pro přípravu suspenze s rozpouštědlem |
| SIR | Sirup |
| SOL | Roztok |
| SOL PSS | Roztok v tlakovém obalu |
| SOL SLG | Sublingvální roztok |
| SPR | Sprej |
| SPR SLG | Sublingvální sprej |
| SPR SOL | Sprej ve formě roztoku |
| SPR SUS | Sprej ve formě suspenze |
| STL | Tyčinka |
| SUP | Čípek |
| SUP VAG | Vaginální čípek |
| SUS | Suspenze |
| SUS PSS | Suspenze v tlakovém obalu |
| TBL | Tableta |
| TBL BUC | Bukální tableta |
| TBL DIS | Tableta dispergovatelná v ústech |
| TBL EFF | Šumivá tableta |
| TBL ENT | Enterosolventní tableta |
| TBL FLM | Potahovaná tableta |
| TBL MND | Žvýkací tableta |
| TBL NOB | Tableta |

| | |
|----------------|---|
| TBL OBD | Obalená tableta |
| TBL PRO | Tableta s prodlouženým uvolňováním |
| TBL RET | Tableta s rízeným uvolňováním |
| TBL SLG | Sublingvální tableta |
| TBL SOL | Tableta pro přípravu perorálního roztoku |
| TBL SUS | Tableta pro přípravu perorální suspenze |
| UNG | Mast |
| UNG OPH | Oční mast |
| | |
| amp | ampule |
| BA | balení |
| C2 | centimetr čtvereční |
| DF | jedna dávka lékové formy |
| GM (g) | gram |
| IU | mezinárodní jednotka |
| KU | tisíc mezinárodních jednotek |
| MU | milion mezinárodních jednotek |
| MG (mg) | miligram |
| ML (ml) | mililitr |
| RG | mikrogram |
| | |
| J4 | specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu |
| J5 | specializované pracoviště pro léčbu defektu somatotropního hormonu |
| J7 | specializované pracoviště - dialyzační jednotka |
| J9 | poradna pro hyperlipoproteinemii a lékař se specializací v oboru vnitřní lékařství |
| J10 | specializované pracoviště - transplantační centrum |
| | |
| ATC | označení anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny |
| V06XX | označení potravin pro zvláštní lékařské účely |



8 591449 181013 05
ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částelek (první záloha na rok 2006 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, 516 205 174, 519 205 174, objednávky jednotlivých částelek (dobírky) – 516 205 207, 519 305 207, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hradil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **Břeclav:** Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 432 244; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eLVaN, Ke Stadiionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdfík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice:** Ing. Kučerák, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** TYPOS, a. s. Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEO-LUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), SEVT a. s., Slezská 126/6; **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 7:** MONITOR CZ, s. r. o., V háji 6, tel.: 272 735 797; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7–12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Přerov:** Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková – YAHO – i – centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezdečkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání k tiskárně. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslech 516 205 207, 519 305 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.